SARALA BHASHAJSHARA.

BY

Lala Gocool Pershad Ray.

NEW EDITION

সরল ভেষজসার।

শ্রী লালা গোকুল প্রসাদ রায় প্রণীত।

নূতন সংস্করণ।

MIDNAPORE

MISSION PRESS.

1886

ভূমিকা।

এক্ষণে আমাদের দেশে সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা সকলের আবশ্যক হইয়াছে। আমি সিভিল ও মিলিটারি ডিপার্টমেন্টে অম্লান ২২ বৎসর কর্ম্ম করিয়া বহু দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়াছি, যে অধিকাংশ পল্লীগ্রামে ডাক্তার না থাকায় অশিক্ষিত সামান্য ব্যক্তিগণ কেবল কতকগুলি ঔষধের নাম ও যথা কথঞ্চিৎ প্রয়োগ মাত্র শিক্ষা করিয়া চিকিৎসা করিতে সাহসী হইয়াছেন; কিন্তু ঔষধের গুণাগুণ রীতিমত জানা না থাকায় ঐ সকল চিকিৎসকের দ্বারা রোগীর যে কতদূর অনিষ্ট হয়, তাহা বলা যায় না; ফলতঃ অধিকাংশ রোগীকেই উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইতেছে। এইরূপে কত শত পল্লী একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ অধিকাংশ পল্লীগ্রামস্থ ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, এবং ঔষধ ব্যবসায়ী প্রভৃতি ঔষধের গুণাগুণ সম্যকরূপে অবগত না থাকায় ঔষধ প্রয়োগ বা প্রস্তুত করিতে গিয়া সচরাচর ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে সাধারণতঃ সকলেই চিকিৎসা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এরূপ একখানি-পুস্তকের এখনও সম্পূর্ণ অভাব আছে। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমি সেই অভাব মোচন জন্য যথোচিত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম।

এ পর্য্যন্ত চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক প্রণীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই বৃহদাকার ও অধিক মূল্যের হওয়ায় অনেকেই ক্রয় করিতে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তদুল্লিখিত বিষয় সকল সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। আমি সেই জন্য সর্ব্বসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে এরূপ সহজ ভাষায় "সরল ভৈষজসার। নামক পুস্তক খানি প্রণয়ন করিলাম। ইহাতে ঔষধ সমূহের নাম, উৎপত্তি স্থান, ক্রিয়া, প্রয়োগরূপ, আময়িক প্রয়োগ, মাত্রাবলি, প্রস্তুত করণ, অসম্মিলন, বিস ও বিষঘ্ন ঔষধ এবং কতকগুলি পীড়ার ইংরাজী হইতে বাঙ্গলা নাম এবং কতিপয় ব্যবস্থাপত্র (প্রেসক্রিপসন) প্রভৃতি যথাক্রমে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গুণ ভেদে ঔষধ সকলের শ্রেণী বিভাগ করায় বিভিন্ন-গুণ-ক্রিয়া-বিশিষ্ট এক এক প্রকার ঔষধের নাম অনেক স্থানে উল্লেখ করিতে হইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ ঔষধের সবিস্তর বর্ণনা প্রত্যেক শ্রেণীতে না করিয়া উহাদের নানাবিধ গুণের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা-প্রধান সেই শ্রেণীতে করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে ইহা সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ পরীক্ষার্থী কম্পাউণ্ডারগণের বিশেষ উপকারে আসিবে এবং প্রত্যেক গৃহস্থ এই পুস্তকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া অনেক সময় সামান্য রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবেন। এক্ষণে এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সর্ব্বসাধারণের কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

এই পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কন সম্বন্ধে আমার কম্পাউণ্ডার শ্রীযুক্ত আতঙ্ক ভঞ্জন চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই, যে এই পুস্তকে যদি কোন দোষ দৃষ্ট হয়, বিজ্ঞ মহোদয়গণ তাহা দর্শাইয়া দিলে কৃতজ্ঞতার সহিত দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন. করিয়া দিব এই পুস্তকের মূল্য ২৲ দুই টাকা মফস্বলের জন্য ডাকমাশুল ।০ চারি আনা ধার্য্য হইল
ইং. ১৮৯৩ ফেব্রুয়ারি।

মেদিনীপুর, আলিগঞ্জ। শ্রীলালা গোকুল প্রসাদ রায়।



সরল ভেষজসার।

প্রথম অধ্যায়।

পীড়া উপশমার্থে যে যে দ্রব্য প্রয়োগ বা ব্যবস্থা করা যায় তাহা সমস্তই ঔষধ মধ্যে গনণীয়। ঔষধ সকল বিবিধ উপায়ে, যথা—ধাতু, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি হইতে, প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন জল, বায়ু, তেজ, ইত্যাদিকেও ঔষধ বলা যাইতে পারে।

ঔষধ সকলের ক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, যথা;—

এষ্ট্রিঞ্জেন্ট,	Astringent,	সঙ্কোচক
ক্যাথার্টিক্স,	Cathartics,	বিরেচক
ল্যাক্সেটিব্‌স,	Laxatives,	মৃদু বিরেচক
পার্গেটিব্‌স,	Purgatives,	বিরেচক
হাইড্রোগগ্‌স,	Hydrogogues,	অতি বিরেচক

এমেটিক্স,	Emetics,	বমনকারক
ডাইউরেটিক,	Diuretics,	মূত্রকারক
ডায়াফোরেটিক্স,	Diaphoretics,	স্বেদজনক
এক্সপেকটোরেন্টস,	Expectorants,	কফ নিঃসারক
ষ্টিমিউল্যান্টস	Stimulants,	উত্তেজক
নার্কোটিক্স,	Narcotics,	মাদক, নিদ্রাকারক
টনিক্স,	Tonics,	বল কারক
ইমেনাগগ্স,	Emmenagogues,	রজোনিঃসারক
সায়েলোগগ্স,	Sialogogues,	লালনিঃসারক
এর্হিন্স,	Errhines,	হাঁচিকারক
কোল্যাগগ্স,	Cholagogues,	পিত্ত নিঃসারক
ডিমলসেণ্ট্স, এমোলিয়েন্টস, ডাইল্যুয়েন্টস,	Demulcents, Emollients, Diluents,	স্নিগ্ধকারক, সমতাকারক
এণ্টাসিড্স	Antacids,	অম্ল নাশক
এন্টিস্প্যাজমডিক্স,	Antispasmodics,	আক্ষেপ বা খেঁচনি নিবারক
এন্থেলমিণ্টিক্স,	Anthelmintics.	কৃমিনাশক
পার্টিউরিফেসেন্ট,	Parturifacients,	প্রসবকারক
লিকুইফেসেণ্ট্স,	Liquifacients,	দ্রবকারক
কষ্টিক্স, এস্কারোটিক্স,	Caustics, Escharotics,	দাহক
এপিস্প্যাসটিক্স, ভেসিক্যান্টস,	Epispastics, Vesicants,	ফোস্কাকারক
এন্টিসেপ্টিক্স,	Anticeptics,	পচন নিবারক
এরোমেটিক্স,	Aromatics,	গন্ধ দ্রব্য
সেডেটিব্স,	Sadatives,	অবসাদক
অল্টারেটিব্স,	Alteratives,	পরিবর্ত্তক
প্রোটেকটিব্স,	Protectives,	আবরক
কার্মিনেটিব্স,	Carminatives,	বায়ু নাশক
রিফ্রিজেরেণ্ট্স,	Refrigerants,	তৃষ্ণা নিবারক

এনোডাইন,	Anodyne,	বেদনা নিবারক
এন্টিপিরিওডিক,	Antiperiodic,	পালা নিবারক
ষ্টিপটিক্স,	Styptics,	রক্ত রোধক
ডিসিনফেকটেণ্ট্স	Disinfectants,	দুর্গন্ধ নিবারক
এন্টিডোটস,	Antidotes,	বিষঘ্ন
কস্মেটিক্স,	Cosmetics,	অঙ্গ রাগ, অর্থাৎ যাহাদের দ্বারা শরীর কোমল ও পরিষ্কৃত হয়
এফ্রোডিসিয়্যাক্স,	Aphrodisiacs,	কামোদ্দীপক
এনাফ্রোডিসিয়্যাক্স,	Anophrodisiacs,	কাম নাশক
এন্টিলিথিক্স, লিথন ট্রিপটিক্স,	Antilithics or Lithontripties,	অশ্মরী নাশক
এন্টালকালিজ	Antalkalies,	ক্ষার নাশক
সপিউরেটিব্স,	Suppuratives,	পূজ কারক
ডিসিক্যাণ্ট্স,	Desicants,	শুষ্ককারক
কণ্টারিটেণ্ট্স,	Counterirretants,	উগ্রতা সাধক

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শুষ্ক দ্রব্য তৌলার্থ নিম্ন লিখিত তৌল ব্যবহৃত হয়। যথা

২০ গ্রেনে* .... ১ স্ক্রুপল।
৩ স্ক্রুপল অথবা ৬০ গ্রেনে .... ১ ড্রাম।
৮ ড্রাম অথবা ৪৮০ গ্রেনে .... ১ আউন্স।
১২ আউন্স অথবা ৫৭৬০ গ্রেনে .... ১ পৌণ্ড।

দ্রব দ্রব্যের পরিমানার্থ নিম্ন লিখিত মাপ ব্যবহৃত হয়।

৬০ মিনিমে* ... ...১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ... ১ আউন্স।
২০ আউন্সে ... ...১ পাইণ্ট।
৮ পাইণ্টে ... ... ১ গ্যালন।

---

* গ্রেনকে ২ ধান ওজনের সমান এবং
* মিনিমকে ফোঁটা বুঝিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ফারমাকোপিয়া মতে একত্রিংশৎ প্রকার প্রয়োগরূপ তন্মধ্যে একবিংশতি প্রকার আভ্যন্তরিক, এবং অবশিষ্ট বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়। যথা—

আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ ।

ল্যাটিন ।	ইংরাজী ।	বাঙ্গলা ।
এসিটম,	ভিনিগার,	সির্কা ।
একোয়া,	ওয়াটর,	জল ।
এসেন্সিয়া,	এসেন্স,	শ্রেষ্ঠাংশ ।
একষ্ট্রাক্টম,	একষ্ট্রাক্ট,	সার ।
কনফেকশিও,	কনফেকসন,	খণ্ড ।
ডিকক্টম,	ডিকক্সন,	ক্বাথ ।
ইনফিউজম,	ইনফিউজন,	ফাণ্ট ।
লাইকর,	সোল্যুসন,	দ্রব ।
মিশ্চুরা,	মিক্শ্চর	মিশ্র ।
মিউসিলেগো,	মিউসিলেজ,	মণ্ড ।
ওলিয়ম,	অয়াইল,	তৈল ।
অকজিমেল, .	অকজিমেল,	সির্কা মধু ।
পাইল্যুলা,	পীল,	বটিকা ।
পলবরিস,	পৌডর,	চূর্ণ ।
স্পিরিটস,	স্পিরিট,	সুরা ।
সক্কস,	জুস,	রস ।
সিরপস,	সিরপ,	পাক ।
টিংচ্যুরা,	টিংচর,	অরিষ্ট ।
ট্রোচিসাই,	লোজেঞ্জেস,	চাক্তি ।
ভেপর,	ইনহেলেসন,	ধূম ।
ভাইনম,	ওয়াইন,	আসব ।

বাহ্য প্রয়োগার্থ।

ক্যাটেপ্লাজমা,	পুলটিস,	
চার্টা,	পেপার,	কাগজ।
এমপ্লাষ্ট্রম,	প্ল্যাষ্টর,	পলস্ত্রা।
গ্লাইসরাইনম,	গ্লীসরীণ,	
এনিমাটা,	এনিমা,	পিচ্‌কারি।
লোসিয়া,	লোসন,	ধৌত।
মেল··· ··· ···	···হনি··· ··· ···	···মধু
সপোজিটৌরিয়া	সপোজিটৌরি	গুহ্য দ্বারে বটিকা প্রয়োগের নাম
লিনিমেণ্টম··· ···	···লিনিমেণ্ট··· ···	···মৰ্দ্দণ
অঙ্গুয়েণ্টম··· ···	··অইণ্টমেণ্ট··· ···	···মলম

চতুর্থ অধ্যায়।

সঙ্কোচক ঔষধ সকল। যথা—

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। অ্যালুমেন··· ··· ··· ··· ···	···১০—৩০ গ্রেন।
২। ,, এক্সিকেটম্‌·· ··· ··· ···	···৫—১৫ গ্রেন।
৩। অর্জেণ্টাই নাইট্রাস··· ··· ···	···।০—১ গ্রেন।
৪। ক্যাডমিয়াই আইওডাইডম্‌ ··	···[বাহ্য প্রয়োগার্থ]
৫। মিশ্চুরা ক্রিটি·· ··· ···	···১—২ আউন্স।
৬। কুপ্রাই সল্‌ফাস্‌··· ··· ··· ··· ···	···।০—২ গ্রেন।
৭। ফেরি পর্ক্লোরাইড্‌··· ··· ··· ···	···২—৮ গ্রেন।
৮। লাইকর্‌ ফেরি পরনাইট্রেটিস···	···১০—৪০ মিনিম।
৯। ফেরি সল্‌ফাস্‌ এক্সিকেটা··· ··· ···	···১—৩ গ্রেন।
১০। প্লম্বাই এসিটাস্‌··· ··· ···	···১—৫ গ্রেন।
১১। জিনসাই সল্‌ফাস্‌··· ··· ···	···২—৫ গ্রেন।
১২। ,, এসিটাস··· ··· ···	···২—৫ গ্রেন।

১৩। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ বেলি লিকুইডম্‌... ... ...১—২ ড্রাম।
১৪। ক্যাটিকিউ প্যালিডম্‌... ... ...১০—৩০ গ্রেন।
১৫। টিংচ্যুরা ক্যাটিকিউ... ... ...||০—২ ড্রাম।
১৬। ইনফিউজম ক্যাটিকিউ... ... ...১—২ আউন্স।
১৭। ট্রোচিসাই ক্যাটিকিউ... ... ...১—৫ চাক্তি।
১৮। পলবিস্‌ ক্যাটিকিউ কম্পজিটস্‌...২০—৪০ গ্রেন।
১৯। সিঙ্কোনা প্যালিডা... ... ...১০—৬০ গ্রেন।
২০। টিংচুরা সিঙ্কোনি কম্পজিটস.........||০—২ ড্রাম।
২১। ডিকক্টম্‌ গ্রানেটাই রেডিসিস্‌... ...১—২ আউন্স।
২২। " হিমেটক্সিলাই... ... ...১—২ আউন্স।
২৩। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ হিমেটক্সিলাই... ... ...১০—৩০ গ্রেন।
২৪। পলবিস্‌ কাইনো কম্পজিটস্‌ .. ...৫—২০ গ্রেন।
২৫। টিংচ্যুরা কাইনো... ... ...||০—২ ড্রাম।
২৬। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ ক্রামিরি... ... ...৫—১০ গ্রেন।
২৭। ইনফিউজম ক্রামিরি... ... ...১—২ আউন্স।
২৮। টিংচুরা ক্রামিরি... ... ...||০—২ ড্রাম।
২৯। ক্রিয়োজোটম্‌... ... ...১—৩ মিনিম।
৩০। ক্রিয়োজোটাই মিক্‌শ্চ্যুরা............ ১—২ আউন্স।
৩১। ম্যাটিস ইনফিউজম্‌... ... ...||০—৪ আউন্স।
৩২। পলবিস কাইনো... ... ...১০—৩০ গ্রেন।
৩৩। ডিকক্টম্‌ কোয়ার্কস... ... ...১—২ আউন্স।
৩৪। পলবিস্‌ গ্যালি... ... ...১০—৩০ গ্রেন।
৩৫। টিংচ্যুরা গ্যালি... ... ...||০—২ ড্রাম।
৩৬। এসিডাই ট্যানিসাই ট্রোচিসাই... ...১—৬ চাক্তি।
৩৭। " " সপোজিটোরিয়া [বাহ্য প্রয়োগার্থ]
৩৮। এসিডম্‌ গ্যালিকম্‌... ... ...২—১০ গ্রেন।
৩৯। " ট্যানিকম্‌... ... ...২—১০ গ্রেন।

৪০। গ্লাইসরাইনম্ এসিডাই গ্যালিসাই } [বাহ্য
৪১। ” ” ট্যানিসাই } প্রয়োগার্থ]
৪২। ইনফিউজম রোজিএসিডম্... ... ...১—২ আউন্স।
৪৩। কনফেকশিয়ো রোজি গ্যালিসি... ...॥০—২ ড্রাম।
৪৪। সিরপস্ রোজিগ্যালিসি... ... ...১—৪ ড্রাম।
৪৫। কনফেকশিয়ো রোজিকেনাইনি......॥০— ২ ড্রাম।
৪৬। ডিকক্টম আলথাই... ... ...২—৪ আউন্স।
৪৭। ইনফিউজম ইউবিআর্শাই... ... ...১—২ আউন্স।
৪৮। পাইল্যুলা প্লম্বাই কমওপিও... ... ...২—৮ গ্রেন।
৪৯। পলবিস্ ক্রিটি এরোমেটিক্স্... ...১০—৬০ গ্রেন।
৫০। ” ” ” কমওপিও... ...১০—৪০ গ্রেন।
৫১। ডিকক্টম কনেসাইবার্ক... ... ...১—২ আউন্স।

সঙ্কোচক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
গ্যালা।	গল্স, বাগলনট্স।

(মাজুফল)

এসিয়া মাইনর প্রভৃতি রাজ্যে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, বলকারক, পর্য্যায় নিবারক।

প্রয়োগ রূপ... ... ... মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা গ্যালি... ... ...॥০ হইতে ২ ড্রাম
২। অঙ্গুয়েণ্টম গ্যালি... ... ...} বাহ্য প্রয়োগার্থ
৩। ” ” কম ওপিও......} ব্যবহৃত হয়

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, অতিসার, শ্বেত প্রদর, প্রমেহ, রক্ত প্রদর, প্রভৃতি রোগে।

(২য়)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
এসিডম্ট্যানিকম্।	ট্যানিক এসিড।

(মাজু ফল হইতে প্রস্তুত)

মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ সঙ্কোচক, রক্ত রোধক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ট্রোচিসাই এসিডাই ট্যানিসাই... ...১—৬ চাক্তি।

২। গ্লাইসরাইনম এসিডাই ট্যানিসাই
৩। সপোজিটোরিয়া এসিডাই ট্যানিসাই
৪। সপোজিটোরিয়া এসিডাই ট্যানিসাই কমসেপনি
} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ রক্তস্রাব, উদরাময়, দন্তক্ষত ইত্যাদি

(৩য়)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
এসিডম্ গ্যালিকম্।	গ্যালিক এসিড।

(মাজু ফল হইতে প্রস্তুত)

মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ সঙ্কোচক, রক্ত রোধক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। গ্লাইসরাইনম এসিডাই গ্যালিসাই) বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তোৎকাশ, রক্ত বমন, রক্ত প্রস্রাব, রক্ত প্রদর, যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাইটিস, পুরাতন প্রমেহ, উদরাময়, অর্শ প্রভৃতি।

(৪র্থ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
কাইনো।	কাইনো।

(টেরোকার্পাস মার্স্যুপিয়ম বৃক্ষের রস) মালব প্রদেশে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক।

প্রয়োগরূপ... .. ..মাত্রা।

১। টিংচুরা কাইনো... ... ...৷৹ হইতে ২ ড্রাম

২। পল্‌বিস্‌ কাইনো কম্পজিটস্‌ বা কমওপিও } ৫—২০ গ্রেন

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, পাইরোসীস রোগে, ইউথ্রিরাইটিস, এবং পুরাতন ক্ষতে।

(৫ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ক্যাটিকিউ প্যালিডম।	পেল্‌ ক্যাটিকিউ।

(পাণ্ডু খদির)

অনকেরিয়া গ্যাম্বির নামক বৃক্ষের পত্র এবং তরুণ শাখাগ্রের জলীয় সার।

পেগুও ভারতবর্ষে জন্মে।

(মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেন)

ক্রিয়া। আগ্নেয়, প্রবল সঙ্কোচক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ইনফিউজম্‌ ক্যাটিকিউ... .. ...১—২ আউন্স

২। পলবিস্‌ ক্যাটিকিউ কম্পজিটস......২০—৪০ গ্রেন

৩। ট্রোচিসাই ক্যাটিকিউ... ... ...১—৫ চাক্তি

৪। টিংচুরা ক্যাটিকিউ .. ..৷৷৹—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, অজীর্ণ, পাইরোসীস, রক্তপ্রদর রোগে আভ্যন্তরিক, এবং বিবিধ ক্ষতে স্থানিক এতদ্ভিন্ন শ্বেত প্রদর রোগে ইহার পিচ্‌কারি।

(৬ষ্ঠ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ক্রামিরি রেডিক্‌স...	...র‍্যাটানিরুট।

(ক্রামিরিয়া ট্রায়াণ্ডা নামক গুল্মের শুষ্ক মূল।)
(মার্কিন খণ্ড, পিরু এবং বোলিভিয়া প্রদেশে জন্মে)
চূর্ণ মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ ও প্রবল সঙ্কোচক।

প্রয়োগ রূপ... ... ...মাত্রা।

১। একষ্ট্রাক্টম ক্রামিরি... ... ...৫——১০ গ্রেন।
২। ইনফিউজম ক্রামিরি... ... ...১——২ আউন্স।
৩। টিংচুরা ক্রামিরি... ... ...।৹——২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। শ্বেত প্রদর, উদরাময়, ওজিনা, রজোধিক, এবং বিবিধ রক্তস্রাব রোধার্থ, ও দন্তমাড়ি হইতে রক্তপাত হইলে ইহার চূর্ণ মঞ্জন রূপে ব্যবহৃত হয়।

(৭ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কোয়ার্কস কর্টেক্স।... ... ... ওকবার্ক।

(কোয়ার্কস পিডঙ্কিউলেটা নামক বৃক্ষ বল্কল)
(ইউরোপ খণ্ডে জন্মে)
চূর্ণ মাত্রা ৩০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক।

প্রয়োগ রূপ... ... ...মাত্রা

১। ডিকক্টম্ কোয়ার্কস............১—২ আউন্স
২। একষ্ট্রাক্টম কোয়ার্কস.........১০—৩০ গ্রেন

আময়িক প্রয়োগ। পুরাতন উদরাময়, অতিশার রোগে আভ্যন্তরিক। রক্ত প্রদর, শ্বেত প্রদর, রজোধিক, রোগে বাহ্য প্রয়োগার্থ এবং পুরাতন ও দুষ্ট ক্ষতে ইহার ধৌত উপকারক।

(৮ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ইউবিআর্শাই ফোলিয়া।...... ...বেয়ারবেরি লিভ্‌স।

(আর্কটোষ্টেকাইলস্ ইউবাআর্শাই নামক বৃক্ষ পত্র)
ইউরোপ, এসিয়ায় জন্মে। চূর্ণ মাত্রা ১০—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, বলকারক, মূত্রকারক।

প্রয়োগ রূপ... ... ...মাত্রা।

১। ইনফিউজম বেয়ারবেরি... ... ...১—২ আউন্স।

২। একষ্ট্রাক্টম বেয়ারবেরি..........৫—১০ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। শ্বেত প্রদর, পুরাতন প্রমেহ, অতিশার, রক্ত প্রদর, বহুমূত্র রোগে।

(৯ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

রোজা।.............................রোজ।

(গোলাপ)

গোলাপ তিন প্রকার যথা—

(প্র) রোজা কেনাইনা।

প্রয়োগ রূপ... ... ...মাত্রা।

১। কনফেকশিয়ো রোজি কেনাইনি ।।০—২ ড্রাম বা তদূর্দ্ধ

(দ্বিঃ) রোজা গ্যালিকা।

প্রয়োগ রূপ... ... ...মাত্রা।

১। সিরপস রোজি গ্যালিসি... ... ...১—৪ ড্রাম

২। কনফেকশিয়ো রোজি গ্যালিসি ।।০—২ ড্রাম বা তদূর্দ্ধ

৩। ইনফিউজম রোজি এসিডম... ... ...১—২ আউন্স

(তৃ) রোজা স্যাণ্টিফোলিয়া।

প্রয়োগ রূপ... ... ...মাত্রা।

১। একোয়া রোজি... ... ...১—২ আং বা তদূর্দ্ধ

ক্রিয়া। মৃদু সঙ্কোচক, বলকারক, শৈত্যকারক।

(১০ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

টর্ম্মেণ্টিলা।.........................টর্ম্মেণ্টিল।

(পেটেণ্টিলা টর্ম্মেণ্টিলা বৃক্ষের কন্দ) ইংলণ্ডে জন্মে।

চূর্ণমাত্রা ২০— ৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, বলকারক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ডিকক্টম্ টর্মেণ্টিলী... ... .. ১—২ আউন্স

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, অতিশার রোগে আভ্যন্তরিক। শ্বেত প্রদর ও মাড়িতে এবং মুখ মধ্যে ক্ষতাদি হইলে ইহার কুল্য ও পিচকারী এ ভিন্ন মূত্রাশয় ও অন্ত্রের রক্তস্রাব রোগেও ব্যবহৃত হয়।

(১১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

রাইটিয়া এণ্টিডিসেণ্টেরীকা, কর্টেক্স। কনেসাইবার্ক

(কূরচি, ইন্দ্রযব।)

(কোকান এবং ভারতবর্ষে জন্মে)

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, পর্য্যায়নিবারক,

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ডিকক্টম্ কনেসাই বার্ক.........১—২ আউন্স

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, অতিশার, সপর্য্যায় জ্বরে।

(১২শ)

সীস ধাতু হইতে ঔষধ সমস্ত।

ল্যাটিন। ইংরাজী।

প্লম্বাই এসিটাস।.. ... ...এসিটেট অব্লেড্ }
বা শুগার অব্লেড্। }

(সীস শর্করা)

মাত্রা ১—৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, অবসাদক, রক্তরোধক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। পাইল্যুলা প্লম্বাই কমওপিও... ...২—৮ গ্রেন

২। সপোজিটোরিয়া প্লম্বাই কম্পজিটা } বাহ্য প্রয়োগার্থ
৩। অঙ্গুয়েণ্টম প্লম্বাই এসিটেটীস } ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, রক্তোৎকাশ, রক্তবমন, রক্তভেদ, রক্তপ্রস্রাব, রজোধিক, বিবিধ রক্তস্রাব রোগে, এবং প্রমেহ, বিবিধ ক্ষতে, চক্ষুপ্রদাহে, মূত্রমেহ, অতি-

ঘর্ম্ম, যক্ষ্মা, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, হৃতস্বর্দ্ধন, বিসূচিকা, রক্তাতিশার, এরিসিপেলাস, এরিথিমা, প্রুরিগো, একজিমা, আর্টিকেরিয়া, এবং অটোরিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

[১৩শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

লাইকর প্লম্বাই সব্‌এসিটেটিশ। সোল্যুসনঅব সব্‌এসিটেট অব্‌লেড্‌

(আভ্যন্তরিক সেবন নিষেধ।)

ক্রিয়া। বাহ্য প্রয়োগে সঙ্কোচক, অবসাদক।

প্রয়োগরূপ।

১। লাইকর প্লম্বাই সবএসিটেটিস্‌ ডাইলিউটস্‌ } বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

২। অঙ্গুয়েণ্টম্‌ প্লম্বাই সবএসিটেটিস্‌ কম্পজিটম্‌ }

আময়িক প্রয়োগ। প্রদাহ ও বেদনা নিবারনার্থ, এবং বিবিধ ক্ষতে স্থানিক ব্যবহৃত হয়।

[১৪শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

প্লম্বাই অক্সাইডম্‌।............ ... ...অক্সাইড্‌ অব্‌লেড্‌।

[মুদ্রাশঙ্খ]

ইহা কেবল পলস্ত্রা প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগরূপ।

১। এমপ্লাস্ট্রম্‌ প্লম্বাই... ... ...(বাহ্য প্রয়োগার্থ)

এই পলস্ত্রা বস্ত্রের উপর লাগাইয়া বিবিধ ক্ষতাদিতে আবরণের নিমিত্ত এবং কাটাস্থানের উভয় পার্শ্ব একত্র রাখিবার নিমিত্ত উপযোগী।

[১৫শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

প্লম্বাই কার্বনাস্‌।.... ....কার্বনেট্‌ অব্‌লেড্‌

[সফেদা।]

[আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না]

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম প্লম্বাই কার্বনেটিস্......[বাহ্য প্রয়োগার্থ]

কোন স্থান চর্ম্ম উঠিয়া ক্ষত হইলে এবং দগ্ধ ক্ষতাদিতে শুষ্ক করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

[১৬ শ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
প্লম্বাই আইওডাইডম।	.....আইওডাইড অবলেড্।

মাত্রা।০ হইতে ২ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, পরিবর্ত্তক, শোষক।

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম প্লম্বাই আইওডিডাই } বাহ্য প্রয়োগার্থ
২। এমপ্ল্যাষ্ট্রম প্লম্বাই আইওডিডাই } ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহার মলম এবং প্লীহা আদি রোগে আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

[১৭শ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
প্লম্বাই ক্লোরাইডম।	...ক্লোরাইড অবলেড্।

[আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না]

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, দাহক।

বিবিধ ক্ষতে স্থানিক ব্যবহৃত হয়।

[১৮শ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
প্লম্বাই নাইট্রাস।	...নাইট্রেট্ অবলেড্।

[আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, দুর্গন্ধহারক, পচন নিবারক, বিবিধ দুষ্ট ক্ষতাদির দুর্গন্ধ ও পচন নিবারনার্থ এবং কতকগুলি চর্ম্মরোগের সঙ্কোচন ও শুষ্ক করণার্থ ইহার জলীয় দ্রব বিশেষ উপযোগী।

পঞ্চম অধ্যায়।

বলকারক ঔষধ সকল, যথা—

ঔষধ সকলের নাম… … … …মাত্রা

১। এসিডম্ হাইড্রোক্লোরিকম্ ডাইল্যুটম ১০—৩০ মিনিম।
২। ,, সলফিউরিকম্ ,, ১০—৩০ মিনিম।
৩। ,, নাইট্রিকম্ ,, ১০—৩০ মিনিম।
৪। ,, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিকম্ ,, ৫—২০ মিনিম।
৫। ,, ফস্ফরিকম্ ,, ১০—৩০ মিনিম।
৬। ,, স্যালিসিলিকম্… … … …৫—৩০ গ্রেন।
৭। ,, সলফিউরিকম্ এরোমেটিকম্ ১০—৩০ মিনিম।
৮। ,, আর্সেনিওসম্… … … … … $\frac{১}{৬০}$—$\frac{১}{১২}$ গ্রেন।
৯। একষ্ট্রাক্টম্ এন্থেমিডিস্ … … ২—১০ গ্রেন।
১০। ,, ক্যালম্বী… … … …২—১০ গ্রেন।
১১। ,, বর্ব্বরিস… … … …৫—১০ গ্রেন।
১২। ,, সিঙ্কোনি ফ্লেবি লিকুইডম্…১০—৩০ মিনিম।
১৩। ,, জেনসিয়েনি… … … …৫—২০ গ্রেন।
১৪। ,, কোয়াসি… … … …৩—৫ গ্রেন।
১৫। ইনফিউজম এন্থেমিডিস্…………১—২ আউন্স।
১৬। ,, ক্যালম্বি… … … … $\frac{১}{২}$—২ আউন্স।
১৭। ,, ক্যাস্কারিলি… … … …১—২ আউন্স।
১৮। ,, বর্ব্বরিস… … … …১—৩ আউন্স।
১৯। ,, সিঙ্কোনি ফ্লেবি… … …১—২ আউন্স।
২০। ,, কস্পেরিয়া… … …১—২ আউন্স।
২১। ইনফিউজম্ জেনসিয়েনি কম্পজিটম ১—২ আউন্স।
২২। ,, সর্পেন্টরি… … …১—২ আউন্স।
২৩। ,, কোয়াসি… … …১—২ আউন্স।
২৪। ডিকক্টম অ্যাজাডিরাক্টি… … …১—২ আউন্স।
২৫। ,, সিঙ্কোনি ফ্লেবি………১—২ আউন্স।

২৬। ফেরিএট এমোনি সাইট্রাস... ... ...৫—১০ গ্রেন।
২৭। ,, ,, কোয়াইনি সাইট্রাস... ...৫—১০ গ্রেন।
২৮। ,, আর্সেনিয়াস... ...$\frac{১}{১৬}$ হইতে ৷৹ গ্রেন।
২৯। ,, আইওডাইড... ... ...১—৫ গ্রেন।
৩০। ,, কার্বনাস স্যাকারেটা.. ...৫—২০ গ্রেন।
৩১। ,, অক্সাইডম ম্যাগ্নেটিকম্...৫—৩০ গ্রেন।
৩২। ,, পরক্সাইডম্ হিউমিডম্......২—৪ ড্রাম।
৩৩। ,, ফস্ফাস... ... ...২—১০ গ্রেন।
৩৪। ,, সলফাস... ... ...১ ৫ গ্রেন।
৩৫। ,, ,, এক্সিকেটা... ...১—৫ গ্রেন।
৩৬। ,, ,, গ্র্যানিউলেটা .....১—১০ গ্রেন।
৩৭। ,, পরক্সাইডম্ হাইড্রেটম্... ...৫—৩০ গ্রেন।
৩৮। ,, ল্যাকটাস... ... ...২—১০ গ্রেন।
৩৯। ,, ভেলিরিয়েনাস... ... ...১—৩ গ্রেন।
৪০। ,, ব্রোমাইডম... ... ...১—৩ গ্রেন।
৪১। ,, স্যালিসিলাস... ... ...৩—১০ গ্রেন।
৪২। সিরপ্ ফেরি ব্রোমাইড... ... ...১০—৬০ মিনিম।
৪৩। ,, ,, ,, কমকুইনাইন... ...৷৹—১ড্রাম।
৪৪। ,, ,, ,, ,, ষ্ট্রিক্নি...৷৹—১ড্রাম।
৪৫। ,, ,, আইওডাইড .. ..৷৹—২—ড্রাম।
৪৬। ,, ,, ডায়েলিজেটাই... ... ...৷৹—২ ড্রাম।
৪৭। ,, ,, এটম্যাগনেসি ফস্ফরস...৷৹—১ ড্রাম।
৪৮। ,, ,, হাইপো ফস্ফাস... ... ...৷৹—১ড্রাম।
৪৯। ,, ,, ফস্ফাস এটকুইনাইন ষ্ট্রিক্নি ৷৹—১ড্রাম।
৫০। ,, ,, ফস্ফেটিস্... ... ...১—৪ড্রাম।
৫১। ,, অর্যানসিয়াই... ... ...৷৹—২ ড্রাম।
৫২। লাইকর্ ফেরিপরনাইটেটিস্......১০—৪০ মিনিম।
৫৩। ,, ,, পর্ক্লোরাইড্... ...১০—৩০ মিনিম।
৫৪। ,, আর্সেনিকেলিস্...... ...৪—১০ মিনিম।

৫৫। লাইকর আর্সেনিসাই হাইড্রো ক্লোরিকস ২-৮ মিনিম।
৫৬। ,, সোডি আর্সেনাইটিস ....৫—১০ মিনিম।
৫৭। ,, ষ্ট্রিক্নি... ... ...৩—১০ মিনিম।
৫৮। টিংচ্যুরা সিঙ্কোনি ফ্লেবি... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৫৯। ,, জেনসিয়েনি... ... .॥০—২ ড্রাম।
৬০। ,, কোয়াইনি .. ..১—৪ ড্রাম।
৬১। ,, সর্পেণ্টোরি... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬২। ,, কোয়াসি... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬৩। ,, অর‍্যান্সিয়াই... ... .॥০—২ ড্রাম।
৬৪। ,, ক্যালম্বি... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬৫। টিংচ্যুরা ক্যান্থারিলি.. ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬৬। ,, চিরাটি.. ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬৭। ,, অ্যাজাডি রাক্‌টী... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬৮। ,, বর্বরিস... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৬৯। ,, ফেরি এসিটেটিস... ... ... ৫—৩০ মিনিম।
৭০। ,, ,, পক্লোরিডাই...........১০—৩০ মিনিম।
৭১। মিশ্চ্যুরা ফেরি এরোমেটিকা.........১—২ আউন্স।
৭২। ,, ,, কম্পজিটা ... .১—২ আউন্স।
৭৩। পাইল্যুলা ফেরি কার্বনেটিস... ......৫—২০ গ্রেন।
৭৪। ,, ,, আইওডাইড......৫—২০ গ্রেন।
৭৫। ট্রোচিসাই ফেরি রিড্যাক্টাই... ... ...১—৮ চাক্তি।
৭৬। ভাইনম ফেরি... ... ...১—৪ ড্রাম।
৭৭। জিঙ্কাই সলফাস... ... ...১—৫ গ্রেন।
৭৮। ,, এসিটাস... ... ...১—২ গ্রেন।
৭৯। ,, কার্বনাস... ... ...২—৫ গ্রেন।
৮০। ,, অক্সাইডম... .. ..২—১০ গ্রেন।
৮১। ,, ভেলিরিয়েনাস... ... ...১—৫ গ্রেন।
৮২। কুপ্রাই সলফাস... ... ...$\frac{১}{৪}$—২ গ্রেন

৮৩। অর্জেন্টাই নাইট্রাস... ... ...$\frac{১}{৬}$—৷৷৹ গ্রেন
৮৪। ,, অক্সাইডম্... ... ...৷৷৹—২ গ্রেন।
৮৫। পেপসিন্ পোরসাই... ... ...২—৫ গ্রেন।
৮৬। ,, বোভাইন্টস্... ... ...১০—২০ গ্রেন।
৮৭। ওলিয়ম মর্হুই... .. ..১—৮ ড্রাম।
৮৮। কুইনাইন সলফাস... ... .১—৩ গ্রেন।
৮৯। ,, স্যালিসিলাস... ... ...২—৬ গ্রেন।
৯০। কোয়াসি লিগনম্... ... .১০—৩০ গ্রেন।
৯১। আলষ্টোনায়ি কর্টেক্স... ... ...৩—৫ গ্রেন।
৯২। অ্যাবসিন্থিয়ম... ... ...২০—৬০ গ্রেন।
৯৩। সোডিস্যালিসিল্যাস... .. ...১০—৩০ গ্রেন।
৯৪। ষ্ট্রিক্নি... ... ...$\frac{১}{৩০}$—$\frac{১}{১২}$ গ্রেন।

বলকারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ওলিয়ম মর্হুই।... ... ...কড্‌লিবর অয়েল।

মর্হুই নামক মৎস্যের তৈল।

এই মৎস্য আটলাণ্টিক সাগরে জন্মে।

মাত্রা ১—৮ ড্রাম।

ক্রিয়া। বলকারক, সংস্কারক, পরিবর্ত্তক, পোষক আময়িক প্রয়োগ। দুর্নিবার, যক্ষা, টেবীজ মেসেণ্টেরিকা ল্যুপস, ও পুরাতন বাত রোগে।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
পেপসিনা।... ... ...পেপ্‌সিন্।

মেষ, গোবৎস, এবং শূকরের পাকাশয় হইতে প্রস্তুত পেপ্‌সিন দুই প্রকার যথা—) মাত্রা।

১। পেপ্‌সিন্ পোরসাই... ... ...২—৫ গ্রেন
২। ,, বোভাইন্টস্... ... ...১০—২০ গ্রেন

প্রয়োগরূপ ... ...মাত্রা।
১। ভাইনম পেপ্‌সিনা ... ...১—২ ড্রাম।
২। পেপ্‌সিয়ানা সাকারেটা... ... ...৫—১৫ গ্রেন।
৩। লাইকর পেপটিকাস... ... ...১—২ ড্রাম।

ক্রিয়া। বলকারক, পচন নিবারক, পাচক।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, শৈশবাবস্থায় অজীর্ণ বশতঃ উদরাময়, গর্ভাবস্থায় অধিক বমন হইলে।

(৩)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
কোয়াসি লিগ্‌নম্‌।... ... ...কোয়াসিয়া উড্‌।

পাইক্রিনা এক্সেলসা নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ।

মার্কিন খণ্ডে জন্মে। চূর্ণ মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, কৃমিনাশক, পচননিবারক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।
১। একষ্ট্রাক্টম্‌ কোয়াসি... ... ...৩—৫ গ্রেন।
২। ইন্‌ফিউজম্‌ কোয়াসি... ... ...১—২ আউন্স।
৩। টিংচুরা কোয়াসি... ... ...॥০—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে, অজীর্ণ, পুরাতন উদরাময়, ও শৈশবাবস্থায়, মহিলতার ন্যায় কৃমি রোগে।

(৪র্থ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
একোরাস্‌ কেলেমস্‌।... ... ...সুইট ফ্ল্যাগ।

(বচ)

একোরাস্‌ কেলেমস্‌ নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে।

ক্রিয়া। উত্তেজক, বলকারক, আগ্নেয়, পর্য্যায় নিবারক।

আময়িক প্রয়োগ। বাত জনিত অজীর্ণ রোগে, সপর্য্যায় জ্বরে, এবং উদরাময় রোগে।

(৫ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
আলষ্টোনায়ি কর্টেক্স।... ... ...আলষ্টোনিয়া বার্ক।

(ছাতিম বল্কল)

চূর্ণ মাত্রা ৩—৫ গ্রেন ।

ক্রিয়া । সঙ্কোচক, বলকারক, পর্য্যায় নিবারক, ক্রমিনাশক ।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা ।

১ । টিংচ্যুরা আলষ্টোনায়ি... ... ...॥০—২ ড্রাম ।

২ । ইনফিউজম্ আলষ্টোনায়ি... ... ...১—২ আউন্স ।

আময়িক প্রয়োগ । পুরাতন উদরাময়, অতিসার, এবং রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে ।

(৬ষ্ঠ)

ল্যাটিন । ইংরাজী ।

অ্যাব্সিন্থিয়ম । .. .. ওয়র্ম্ম উড্ ।

[আর্টিমিসিয়া অ্যাব্সিন্থিয়ম্ বৃক্ষের মঞ্জরী]

ইউরোপ খণ্ডে জন্মে ।

চূর্ণ মাত্রা ২০—৬০ গ্রেন ।

আময়িক প্রযোগ । পর্য্যায় জ্বর, অজীর্ণ, এবং ক্রমি রোগে ।

[৭ম]

ল্যাটিন । ইংরাজী ।

ক্যালম্বি রেডিক্স্ । .. ...ক্যালম্বারুট ।

(কক্যুলস্ পালমেটস্ নামক লতার মূল)

আফ্রিকা খণ্ডে জন্মে ।

চূর্ণ মাত্রা ৫—২০ গ্রেন ।

ক্রিয়া । বিশুদ্ধ তিক্ত বলকারক, ও আগ্নেয় ।

প্রয়োগরূপ.. ... ...মাত্রা ।

১ । এক্ষ্ট্রাক্টম্ ক্যালম্বী... .. . . ২—১০ গ্রেন ।

২ । টিংচ্যুরা ক্যালম্বী... ... ...॥০—২ ড্রাম ।

৩ । ইনফিউজম ক্যালম্বী.. ... .. ১—২ আউন্স ।

আময়িক প্রয়োগ । রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে এবং অজীর্ণ রোগে ।

(৮ম)

ল্যাটিন । ইংরাজী ।

অ্যাজাডিরাক্টি কর্টেক্স এট ফোলিয়া । { নিম বার্ক এণ্ড লিভস

(নিম্ব বল্কল এবং পত্র)

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে জন্মে।

চূর্ণমাত্রা ॥০— ১ ড্রাম।

ক্রিয়া। বলকারক, পর্য্যায় নিবারক, সঙ্কোচক, কৃমিনাশক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ডিকক্টম্ অ্যাজাডিরাক্‌টি... ... ...১—২ আউন্স।

২। টিংচুরা অ্যাজাডিরাক্‌টি... .. ...॥০—২ ড্রাম।

৩। ক্যাটাপ্লাজ্‌ম্ অ্যাজাডিরাক্‌টি...[বাহ্য প্রয়োগার্থ]

আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায় জ্বরে, দৌর্ব্বল্য রোগে, বিবিধ ক্ষতে, এবং কৃমি রোগে।

(৯ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যাস্কারিলি কর্টেক্স। .. ..ক্যাস্কারিলা বার্ক।

ক্রোটন ইলিউটিরিয়া নামক বৃক্ষ বল্কল।

বাহামা উপদ্বীপে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, বায়ু নাশক।

প্রয়োগরূপ.. ... ...মাত্রা।

১। ইনফিউজম্ ক্যাস্কারিলি... ... ...১—২ আউন্স।

২। টিংচ্যুরা ক্যাস্কারিলি... ... .১—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে, অজীর্ণ, পুরাতন উদরাময়, এবং অতিসার রোগে।

(১০ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

বর্বরিস্ কর্টেক্স্।... ... .ইণ্ডিয়ান বার্ব্বেরি।

[দারু হরিদ্রা।]

হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, পর্য্যায় নিবারক, স্বেদজনক, ও মৃদু বিরেচক।

প্রয়োগরূপ.. .. ..মাত্রা।
১। টিংচুরা বর্বরিস্... ... ..॥০—২ ড্রাম বলকারক।
২—৬ ড্রাম পর্য্যায় নিবারক।
২। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ বর্বরিস্.. ... .৫—১০ গ্রেন।
৩। ইনফিউজম্ বর্বরিস্... ... ...১—২।৩ আউন্স।
আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায় জ্বরে, রোগান্তে দৌর্বল্যে, এবং সামান্য চক্ষু প্রদাহে।

(১১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
সিড্রন্। ... ... সিড্রন্।

সিড্রন্ নামক বৃক্ষের বীজ।

সেণ্ট্রাল্ আমেরিকায় জন্মে।

মাত্রা ২—৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। তিক্ত বলকারক, পর্য্যায় নিবারক,
আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, শূলবেদনা, এবং বিসুচিকাদি রোগে।

(১২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
এন্থেমিডিস্ ফ্লোরিস্।.. ..ক্যামোমাইল ফ্লাওয়ার।

এন্থেমিডিস্ নেবেলিস্ নামক বৃক্ষের পুষ্প।

পারস্য এবং ইউরোপ খণ্ডে জন্মে।

ক্রিয়া। তিক্ত বলকারক, উত্তেজক, বায়ু নাশক।
প্রয়োগরূপ... ... .মাত্রা।
১। ইনফিউজম এন্থেমিডিস্... ... ...১—৪ আউন্স।
২। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ এন্থেমিডিস্... ... ...৫—২০ গ্রেন।
৩। ওলিয়ম এন্থেমিডিস্... ... ...১—৫ মিনিম।
আময়িক প্রয়োগ। দৌর্বল্য এবং অজীর্ণ রোগে।

[১৩শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
বণ্ডুসেলি সেমিনা।... ... ...বণ্ডুক্ সীড্‌স্।

[নাটাকরঞ্জা।]
পৃথিবীর সমুদায় উষ্ণ প্রদেশে জন্মে।
মাত্রা ১০ ১৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, পর্য্যায় নিবারক।

প্রয়োগরূপ... ... .মাত্রা।

১। পলবিস্ বণ্ডুসেলি কম্পজিটম্। ১৫— গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায় জ্বরে, রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে,

(১ শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

চিরাটা। . . ..চিরেটা।

[চিরতা।]
(হিমালয় প্রদেশে জন্মে।)

ক্রিয়া। আগ্নেয়, বলকারক।

প্রয়োগরূপ .. . . . মাত্রা।

১। ইনফিউজম্ চিরাটি.. ..—২ আউন্স।

২। টিংচারা চিরাটি . .. . ॥০—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে এবং অজীর্ণ থাকিলে।

(১৫শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সিনকনা কর্টেক্স ফ্লেবা। ফ্লবা সিঙ্কোনা বার্ক।

[সিঙ্কোনেসী জাতীয় বিবিধ বৃক্ষের বল্কল।]
দক্ষিণ আমেরিকায় জন্মে।
চূর্ণ মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

সিঙ্কোনা ৩ প্রকার যথা— . .

সিঙ্কোনা ফ্লেবা, সিঙ্কোনা প্যালিডা, ও সিঙ্কোনা রুব্রা, তন্মধ্যে সিঙ্কোনা ফ্লেবাই উৎকৃষ্ট এবং ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগরূপ... ... .মাত্রা।

১। ডিকক্টম্ সিঙ্কোনি ফ্লেবি... ... ...১—২ আউন্স।

২। ইনফিউজম্ সিঙ্কোনি ফ্লেবি...... ...১—২ আউন্স।

৩। একষ্ট্রাক্টম্ সিঙ্কোনি ফ্লেবি লিকুইডম্ ১০—৩০ মিনিম।

৪। টিংচুরা সিঙ্কোনি ফ্লেবি... ... ...॥০—২ ড্রাম।
৫। টিংচুরা সিঙ্কোনি কম্পজিটা... .. ...॥০—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায় জ্বর, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য এবং অজীর্ণ রোগে আভ্যন্তরিক পচাঙ্কতে স্থানিক,।

[১৬শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
জেনসিয়েনি রেডিক্স। জেনসিয়েনরুট্।

[ল্যাটিয়া নামক বৃক্ষের শুষ্ক মূল।]

ইউরোপ খণ্ডে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়।

প্রয়োগরূপ... ... ... মাত্রা।
১। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ জেনসিয়েনি. . . . ৫—২০ গ্রেন।
২। টিংচুরা জেনসিয়েনি কম্পজিটা. . .. ॥০—২ ড্রাম।
৩। মিক্‌চুরা জেনসিয়েনি... . .. ১—২ আউন্স।
৪। ইনফিউজম্ জেনসিয়েনি কম্পজিটম্ ১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ রোগে, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য থাকিলে।

[১৭শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
লপুলস্... ... .হপ্।

(লপ্যুলস্ নামক ক্ষুদ্র লতার পুষ্প।)

ইংলণ্ড দেশের নানা স্থানে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ৫—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, নিদ্রাকারক, বেদনা নিবারক, ও ঈষৎ সঙ্কোচক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।
১। টিংচুরা লপুলাই.. ... ...১—২ ড্রাম।
২। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ লপুলাই... ... ...৫—২০ গ্রেন।
৩। ইনফিউজম্ লপুলাই... ... ...১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর রোগে অনিদ্রা ও প্রলাপ থাকিলে, মদাতঙ্ক, উন্মাদ, পর্য্যায়জ্বর, কামোন্মাদ, শয্যামূত্র, এবং স্বপ্নদোষ রোগে।

[১৮শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কোয়াইনি সল্‌ফাস্।... ... ...সল্‌ফেট অব্ কোয়াইনা।

(সিঙ্কোনা বার্কস্থিত বীর্য্য।)

মাত্রা ১—৩ গ্রেন বলকারক।

৩—১৫ গ্রেন পর্য্যায় নিবারক।

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ তিক্ত বলকারক, আগ্নেয়, পর্য্যায় নিবারক, অধিক মাত্রায় উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ... .. ..মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা কোয়াইনি... ... ...১—২ ড্রাম।

২। ভাইনম্ কোয়াইনি... ... ...॥০—১ আউন্স।

৩। পাইলুলা কোয়াইনি... ... ...১—১০ গ্রেন।

৪। টিংচ্যুরা কোয়াইনি এমনিয়েটা... ...॥০—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায় ও অনুপর্য্যায় জ্বরে, প্লীহা, যক্ষ্মা, মৃগী, তরুণবাত্, এবং দৌর্ব্বল্যে।

(১৯শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কপ্‌টিস্। গোল্ড্ থ্রেড্রূট।

স্বর্ণসূত্রমূল। মিস্‌মিতিতা।

মার্কিন খণ্ডে জন্মে।

(মাত্রা ৫—১৫ গ্রেন।)

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ বলকারক, আগ্নেয়।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা কপ্‌টিডিস্... ... ...॥০—২ ড্রাম।

২। ইনফিউজম্ কপ্‌টিডিস... ... ...১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য এবং মন্দাগ্নি থাকিলে।

(২০শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কস্পেরাই কর্টেক্স।... ... ...কস্পেরিয়া বার্ক।

[কস্পেরিয়া নামক বৃক্ষের বল্কল।]

দক্ষিণ আমেরিকাতে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০—৪০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, বলকারক, আগ্নেয়, জ্বরঘ্ন।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা

১। ইনফিউজম কস্পেরাই .. ..১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, পর্য্যায়জ্বর, বিকারগ্রস্থ জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময়, এবং অতিসার রোগে।

(২১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সর্পেণ্টরাই রেডিক্স।... ... ...সর্পেণ্টরিরূট।

[সর্পেণ্টরি নামক বৃক্ষের মূল।]

উত্তর আমেরিকা খণ্ডে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা সর্পেণ্টরাই... ... ...॥০—২ ড্রাম।

২। ইনফিউজম সর্পেণ্টরাই... ... ...১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, দৌর্ব্বল্য, এবং আঘাত রোগে।

(২২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

মর্হা।... ... ...মর্।

(গন্ধবোল।)

বালসা মোডেড্রন. মর্হা নামক বৃক্ষের বল্কল হইতে ক্ষরিত গাঁদ এবং ধুনাযুক্ত রস।

আরব্য ও অ্যাবিসিনিয়া প্রদেশে জন্মে।

মাত্রা ১০—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, আগ্নেয়, বলকারক, রজোনিঃসারক, কফ-নিঃসারক। স্থানিক প্রয়োগে, সঙ্কোচক, উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা মর্হি... ... ...১—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। পুরাতন কাশ, যক্ষ্মা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে আভ্যন্তরিক, মুখ মধ্যস্থ বিবিধ ক্ষতে ইহার কুল্য।

[২৩শ]

ল্যাটিন। ইরাজী।

এসিডম্ স্যালিসিলিকম্।... ..স্যালিসিলিক এসিড।

মাত্রা ৫—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। পর্য্যায় নিবারক, পচননিবারক, ঘর্ম্মকারক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ফেরি স্যালিসিলাস... ... ...৩—১০ গ্রেন।

২। কুইনি স্যালিসিলাস... ... ...২—৬ গ্রেন।

৩। সোডিয়াই স্যালিসিলাস... ... ...১০—৩০ গ্রেন।

৪। স্যালিসিনম্... ... ...৫—৩০ গ্রেন।

৫। এমনিয়াই স্যালিসিলাস... ... ...১০—৬০ গ্রেন।

৬। এমপ্লাষ্ট্রম স্যালিসিলাস ... ... } বাহ্য প্রয়োগার্থ

৭। অঙ্গুয়েণ্টম এসিডাই স্যালিসিলাই } ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায়জ্বর, এবং অন্যান্য সপর্য্যায় রোগে, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে। জ্বররোগে শৈত্যকারক, ঘর্ম্মকারক, হইয়া শরীরের উত্তাপ লাঘব করণার্থ। বাত, ও বাতজজ্বরে, এবং যক্ষ্মারোগের দুর্গন্ধযুক্ত কফ ও নিশ্বাসের দুর্গন্ধ নিবারণার্থ। এভিন্ন পচাক্ষতে, অজীর্ণ এবং তজ্জনিত শিরঃপীড়ায়, এবং অন্যান্য বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়।

[২৪শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

টাইনো স্পোরো।... ... ...গুলাঞ্চা।

(গোলঞ্চ।)

বাঙ্গলা, আসাম, বেহার প্রভৃতিতে জন্মে।

ক্রিয়া। বলকারক, পর্য্যায় নিবারক, মূত্রকারক, এবং পরিবর্ত্তক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। এক্‌ষ্ট্রাক্টম টাইনো স্পোরি... ... ...৫—১০ গ্রেন।

২। ইনফিউজম টাইনোস্পোরি... ... ...১—৪ আউন্স।

৩। টিংচ্যুরা টাইনোস্পোরি... ... ...॥০—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। সামান্য সপর্য্যায় জ্বরে, রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে, উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায়, এবং পুরাতন বাত রোগে।

(২৫শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

টোড্যালায়ি রেডিক্স।... ... ...টোড্যালিয়া রূট।

(কাকা তোদালি।)

দক্ষিণ মালাবার প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া। বলকারক, বায়ুনাশক, পর্য্যায় নিবারক।

প্রয়োগরূপ··· ... ...মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা টোড্যালায়ি... ... ...॥০—২ ড্রাম।

২। ইনফিউজম টোড্যালায়ি... ... ...১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে।

(২৬শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ হাইড্রো ক্লোরিকম্।...হাইড্রো ক্লোরিক এসিড।

[লবন দ্রাবক।]

মাত্রা ২—৮ মিনিম।

ক্রিয়া। জলমিশ্র করিয়া সেবন করিলে অল্পমাত্রায় বলকারক, আগ্নেয়, পরিবর্ত্তক, ক্ষারনাশক, কৃমিনাশক, নির্জ্জলাবস্থায় দাহক, বিষক্রিয়া করে। বাহ্য প্রয়োগে দাহক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। এসিডম্ হাইড্রো ক্লোরিকম্ ডাইল্যুটম ১০-৩০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, অশ্মরী, টাইফস, টাইফএড

ও শৈশবাবস্থায় অবিরাম জ্বরে আভ্যন্তরিক, এবং বিবিধ ক্ষতে স্থানিক।

(২৭শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ নাইট্রিকম্।... ... ...নাইট্রিক্ এসিড্।

[যবক্ষার দ্রাবক।]

মাত্রা ২—৬ মিনিম।

ক্রিয়া। অল্পমাত্রায় যথাযোগ্য জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বলকারক, আগ্নেয়, শৈত্যকারক, পরিবর্ত্তক, পিত্ত-নিঃসারক, ক্ষারনাশক, নির্জ্জলাবস্থায় দাহক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। এসিডম্ নাইট্রিকম্ ডাইলিউটম্...১০—৩০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। পুরাতন যকৃত প্রদাহে, উপদংশ রোগে, প্রস্রাবে ক্ষারত্ব দোষ জন্মিলে, মধুমেহ, অজীর্ণ-বশতঃ অম্লোদ্গার রোগে আভ্যন্তরিক, বিবিধ ক্ষতে ও বিষালুজন্তু দংশন করিলে স্থানিক।

[২৮শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ নাইট্রো হাইড্রো ক্লোরিকম্। নাইট্রো হাইড্রো ক্লোরিক এসিড।

[যবক্ষার, ও লবণ দ্রাবক]

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, ক্ষারনাশক, পিত্তনিঃসারক।

প্রয়োগরূপ। ... ...মাত্রা।

১। এসিডম্ নাইট্রো হাইড্রো ক্লোরিকম ডাইলিউটম্ } ৫-২০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। উপদংশ, পুরাতন কাশ, পুরাতন যকৃত, পাণ্ডু, এবং অতিসার রোগে।

[২৯শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ ফস্ফরিকম্ ডাইলিউটম। ডাইলিউটেড্ ফস্ফরিক এসিড্।

মাত্রা ১০—৩০ মিনিম।

ক্রিয়া। বলকারক, শৈত্যকারক, পরিবর্ত্তক, কামোদ্দীপক, অধিক মাত্রায় স্নায়বীয় ও ধামনিক উত্তেজক।

আময়িক প্রয়োগ। টাইফস, টাইফএড্ জ্বরে, স্ক্রুফিউলা এবং মধুমেহ রোগে।

[৩০শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ সলফিউরিকম।... ... ...সলফিউরিক এসিড।

[গন্ধক দ্রাবক।]

মাত্রা ১—৩ মিনিম।

ক্রিয়া। অল্প মাত্রায় জলমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বলকারক, ক্ষারনাশক, শৈত্যকারক, সঙ্কোচক, রক্তরোধক, অধিক মাত্রায় ও দীর্ঘকাল সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরে বেদনা এবং ভেদ উপস্থিত করে।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। এসিডম্ সলফিউরিকম ডাইলিউটম ১০—৩০ মিনিম।

২। ,, ,, এরোমেটিকম ১০—৩০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। বিসূচিকা, উদরাময়, অবিরাম জ্বর, পক্ষাঘাত, যক্ষা, বিবিধ রক্তস্রাব ও চর্ম্মরোগে।

[৩১শ]

রৌপ্য ধাতু ঘটিত ঔষধ সমস্ত।

ল্যাটিন। ইংরাজী।

আর্জেণ্টাই নাট্রাস।... ... ...নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার।

মাত্রা $\frac{১}{৬}$—$\frac{১}{৩}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, সঙ্কোচক, আক্ষেপ নিবারক, অবসাদক, স্থানিক সঙ্কোচক, উত্তেজক, আবরক, ফোস্কাকারক, দাহক।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, অতিসার, পুরাতনউদরাময়, মৃগী, হুপিংকফ, হিষ্টিরিয়া। বাহ্য প্রয়োগার্থ বিবিধ চক্ষু-রোগে, লিঙ্গলাল বদ্ধ, শুক্রমেহ, পুরাতন মুত্রাশয়, উপদং-

শীয় আদ্যক্ষত, ডিপ্থিরিয়া, এরিসিপেলাস, শিরাপ্রদাহে, বিবিধ ক্ষতে, এবং বিষালু জন্তু দংশন করিলে।

(৩২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

অর্জেণ্টাই অক্সাইডম্।... ... ...অক্সাইড্ অব্ সিল্ভার।

মাত্রা ||০ হইতে ২ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, মৃদুসঙ্কোচক, মৃদু দাহক।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তোধিক, রক্তবমন, রক্তোৎকাশ, পাকাশয় শূল, ও পাইরোসিস রোগে আভ্যন্তরিক, এবং প্রমেহ ও বিবিধ ক্ষতাদিতে বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

[৩৩শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

অর্জেণ্টাই ক্লোরাইডম্।.........ক্লোরাইড্ অব্ সিল্ভার।

মাত্রা $\frac{১}{৪}$ হইতে ২।৩ গ্রেন বলকারক, পরিবর্ত্তক।

৩০ গ্রেন মাত্রায় বমনকারক।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, পরিবর্ত্তক, বমনকারক।

আময়িক প্রয়োগ। স্ক্রফিউলা, উপদংশ, মৃগী, উদরাময়, এবং অতিসার রোগে।

বিসমথ ধাতু ঘটিত ঔষধ।

[৩৪শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

বিস্মথাই সব নাইট্রাস।... ...সব নাইট্রেট অব্ বিস্মথ।

মাত্রা ৫—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, পরিবর্ত্তক, স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ট্রোচিসাই বিস্মথাই ... ...১—৬ চাক্তি।
২। বিস্মথাই কার্বনাস... ... ...৫—২০ গ্রেন।
৩। লাইকর্ বিস্মথাই এট এমোনি সিট্রেটিস ... ...||০—১ ড্রাম।

৪। অঙ্গুয়েণ্টম বিসমথাই (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)
আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, উদরাময়, রোগে আভ্যন্তরিক। দদ্রু এবং পুরাতন চর্ম্মরোগে ইহার মলম ব্যবহৃত হয়। শিশুদিগের দন্ত উঠিবার সময় বমন নিবারণার্থ এবং দুর্ব্বল শিশুদিগের উদরাময় দমনার্থ, ইহার প্রয়োগরূপ কার্বনেট অব্ বিসমথ বিশেষ ফলপ্রদ।

[৩৫শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
বিসমথাই অক্সাইডম।... ... ...অক্সাইড অব্ বিসমথ।

মাত্রা ৫—১৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, অবসাদক, বমন নিবারক।
প্রয়োগরূপ... ... ... মাত্রা।
১। বিসমথাই ট্যানাস... ... ...১০—৩০ গ্রেন।
২। ,, ভেলিরিয়েনাস... ... ...॥০—২ গ্রেন।
আময়িক প্রয়োগ। কার্বনেট্ অব্ বিস্মথের ন্যায়।

(৩৬শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ক্যাড্মিয়াই আইওডাইডম।...... ... আইওডাইড অব্ ক্যাডমিয়ম।

(আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।)

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, সঙ্কোচক ও শোষক। স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক।
প্রয়োগরূপ
১। অঙ্গুয়েণ্টম্ ক্যাডমিয়াই আইওডিডাই [বাহ্য প্রয়োগার্থ।]

(৩৭শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ক্যাডমিয়াই সলফাস্।... ... ...সলফেট অব ক্যাডমিয়ম।
ক্রিয়া। সলফেট অবজিঙ্কের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা ১০গুণ উগ্র এবিধায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না। বাহ্য প্রয়ো-

পার্শ্ব, কর্ণিয়াতে ক্ষত হইলে এবং পুরাতন চক্ষু প্রদাহে ইহার দ্রব ১—২ গ্রেন জল ১ আউন্স ব্যবহৃত হয়।

[সিরিয়ম ধাতু ঘটিত।]

(৩৮শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সিরিয়াই অক্‌জ্যালাস্।…… …অকজ্যালেট্ অব্ সিরিয়ম্।

মাত্রা ১—২ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক।

আময়িক প্রয়োগ। মৃগী, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, প্রভৃতি আক্ষেপ জনক রোগে।

[৩৯শ]

তাম্র ধাতু হইতে ঔষধ সমস্ত।

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কুপ্রাই সল্‌ফাস্।… … … .. সলফেট্ অব্ কপর্।

[তুতিয়া।]

মাত্রা। { $\frac{১}{৪}$ হইতে ২ গ্রেন সঙ্কোচক, বলকারক। ৩—১০ গ্রেন বমনকারক।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, আগ্নেয়, অধিক মাত্রায় বমনকারক।

স্থানিক। সঙ্কোচক, উত্তেজক, রক্তরোধক, দাহক।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, অতিসার, ক্রুপ, কোরিয়া, মৃগীরোগে আভ্যন্তরিক, প্রমেহ ও শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার পিচ্‌কারি, পুরাতন, চক্ষু প্রদাহে ধৌত, এবং জলৌকা ক্ষতাদি হইতে রক্ত রোধার্থ ব্যবহৃত হয়।

(৪০শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কুপ্রাই এমোনিয়া সল্‌ফাস্। এমোনিয়ো সলফেট্ অব্ কপর্।

মাত্রা $\frac{১}{৪}$ হইতে ২—৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। তুতিয়ার ন্যায়, প্রভেদ এই যে তুতিয়া অপেক্ষা স্নায়বীয় ক্রিয়া প্রবল, কিন্তু সঙ্কোচন ও দাহন ক্রিয়া মৃদু। আময়িক প্রয়োগ। হিষ্টিরিয়া, মৃগী, কোরিয়া, ক্যাটেলেপসি রোগে আভ্যন্তরিক, প্রমেহ ও শ্বেতপ্রদর রোগে পিচ্‌কারি, এবং কর্ণিয়াতে ক্ষত হইলে ইহার ধৌত উপকারক।

[লৌহ ধাতু হইতে ঔষধ সমস্ত।]

(৪১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফিরম্ রিড্যাক্টম্।... ... ...রিডিউসড্ আয়রণ্।

(লৌহচূর্ণ।)

মাত্রা ১—৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। অতিশ্রেষ্ট রক্তজনক, বলকারক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ট্রোচিসাই ফেরি রিড্যাক্টাই... ... ...১—৫ চাক্তি।
২। ভাইনম্ ফেরি... ... ...১—৪ ড্রাম
৩। মিশ্চ্যুরা ফেরি এরোমেটিকা... ...১—২ আউন্স

আময়িক প্রয়োগ। নিরক্তাবস্থায়, কোরিয়া, এবং প্লীহা আদি রোগে।

(৪২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফেরি আর্সেনিয়াস্।... ...আর্সেনিয়েট্ অব্ আয়রণ্

মাত্রা $\frac{১}{১৬}$ হইতে ॥০ গ্রেন

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, রক্তজনক, বলকারক, স্থানিক দাহক। আময়িক প্রয়োগ। গোদ, কুরন্দ, হার্পিজ, কুষ্ঠ, লুপস একজীমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে।

(৪৩শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফেরি কার্বনাস্ স্যাকারেটা।.. স্যাকারেটেড্ কার্বনেট্ অব্ আয়রণ

মাত্রা ৫—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, রক্তজনক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। পাইল্যুলা ফেরি কার্বনেটিস... ... ...৫—১০ গ্রেন।

২। মিশ্চ্যুরা ফেরি কম্পাজিটা... ... ...১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। নিরক্তাবস্থায়, ক্লোরোসিস, রজস্তম্ভ, সপুজজ্বর, যক্ষ্মা, মৃগী এবং কাশরোগে।

(৪৪শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফেরিএট্ এমোনি সাইট্রাস।... সাইট্রেট্ অব্ আয়রণ এণ্ড এমোনিয়া।

মাত্রা ৫—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, রক্তজনক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।

১। ভাইনম ফেরি সাইট্রেটিস... ... ...১—৪ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তহীনতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য, স্ক্রফিউলা, টেবিজ, মেসেণ্টেরিকা, এবং পুরাতন বাতরোগে।

(৪৫শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফেরিএট্ কোয়াইনি সাইট্রাস। সাইট্রেট্ অব্ আয়রণ এণ্ড কুইনাইন।

মাত্রা ৫—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। রক্তজনক, পর্য্যায়নিবারক, বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ। নিরক্তাবস্থায়, দৌর্ব্বল্যাবস্থায় এবং জ্বররোগে।

(৪৬শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফেরি আইওডাইডম্।... ... ...আইওডাইড অব্ আয়রণ।

মাত্রা ১—৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, পরিবর্ত্তক, রক্তজনক, রজোনিঃসারক, মূত্রকারক, মৃদুবিরেচক।

প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা ।
১। সিরপ্স ফেরি আইওডিডাই... ... ...॥০—১ ড্রাম ।
২। পাইলুলা ফেরি আইওডিডাই... ...৫—১০ গ্রেন ।
আময়িক প্রয়োগ। স্ক্রফিউলা, যক্ষ্মা, রজস্তম্ভ, ক্লোরোসিস, কণ্ঠরজ, মধুমেহ, শ্বেতপ্রদর, প্লীহা বিবর্দ্ধন, যকৃত, গোদ, উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায়, এবং রক্তহীনতা রোগে।

[৪৭শ]

ল্যাটিন ইংরাজী।
ফেরি সলফাস্।... ... ...সলফেট্ অব্ আয়রণ।

(হিরাকস্)

মাত্রা ২—৫ গ্রেন ।

ক্রিয়া। রজোনিঃসারক, বলকারক, রক্তজনক, পর্য্যায়-নিবারক, কৃমিনাশক, স্থানিক সঙ্কোচক ।
প্রয়োগরূপ..., ...মাত্রা ।
১। ফেরি সলফাস্ এক্সিকেটা... ... ...॥০—৩ গ্রেন ।
আময়িক প্রয়োগ। প্লীহা, পর্য্যায় জ্বর, পাকাশয় মধ্যে ক্ষত, ক্লোরোসিস, রজস্তম্ভ, এবং নিরক্তাবস্থায় আভ্যন্তরিক ও বিবিধ ক্ষতে স্থানিক।

[৪৮ শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ফিরম্ টার্টারেটম্।... ... ...টার্টারেটেড্ আয়রণ।

মাত্রা। { ৫—২০ গ্রেন বলকারক, মূত্রকারক
৩০—৬০ গ্রেন কৃমি নাশক।

ক্রিয়া। বলকারক, রক্তজনক, কৃমি নাশক, মূত্রকারক।
আময়িক প্রয়োগ। রক্ত হীনতা, দৌর্ব্বল্য, শোথ ও উদরী রোগে প্রদাহাদি না থাকিলে, এ ভিন্ন কৃমি এবং উপদংশীয় ক্যাকেক্টেনিক ক্ষতে।

(৪৯শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
লাইকর্ ফেরি পর্ক্লোরিডাই ফর্সিয়র } ষ্ট্রং সোল্যুসন্ অব্ পর্ক্লো-রাইড্ অব্ আইরণ।

ক্রিয়া। প্রবল সঙ্কোচক, রক্তরোধক, দাহক, রক্তজনক বলকারক।

প্রয়োগরূপ... ... .মাত্রা।

১। লাইকর্ ফেরিপর্ক্লোরিডাই... ... ...১০—৩০ মিনিম।

২। টিংচুয়া ফেরি পর্ক্লোরিডাই... .....১০—৪০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। দুষ্ট ক্ষতে, পুযযুক্ত চক্ষু প্রদাহে, বিবিধ রক্তস্রাবে, তরুণ বা পুরাতন লিঙ্গলাল প্রদাহে, যক্ষ্মা, এবং অতিসার রোগে।

(৫০শ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
লাইকর্ ফেরি পরনাইট্রেটিস্	সোল্যুসন্ অব্ পরনাইট্রেট্ অব্ আয়রণ্।

মাত্রা ১০ হইতে ৬০ মিনিম।

ক্রিয়া। রক্তজনক, রক্তরোধক, সঙ্কোচক, বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ। রক্তোৎকাশ, রক্ত বমন, রক্তভেদ, উদরাময়, রক্ত প্রস্রাব, রক্ত প্রদর, অর্শ, এবং প্লীহাদি রোগে।

(৫১শ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ফেরি ল্যাকটাস্।	...ল্যাকটেট্ অব্ আয়রণ।

মাত্রা ২—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, রক্তজনক।

আময়িক প্রয়োগ। দৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, এবং প্লীহা আদি রোগে।

(৫২শ)

রঙ্গ ধাতু হইতে ঔষধ সমস্ত

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
জিনসাই সল্ফাস্।... ...	...সল্ফেট্ অব্ জিঙ্ক।

শ্বেত তুতিয়া।

মাত্রা { ১ হইতে ৫ গ্রেন বলকারক।
২০—৩০ গ্রেন বমনকারক।

ক্রিয়া। অল্প মাত্রায় সঙ্কোচক, স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, অধিক মাত্রায় বমনকারক।

আময়িক প্রয়োগ। ক্রুপ, কোরিয়া, মৃগী, হুপিংকফ, হিষ্টিরিয়া, বক্ষশূল, উদরাধ্মান, পুরাতন উদরাময়, অতিসার, তালু পার্শ্বগ্রন্থি প্রদাহ, চক্ষু প্রদাহ, প্রমেহ, মুখ মধ্যে শটিত ক্ষত, জল দোষের পীড়ায়, এবং পুরাতন ও ক্যান্সর ক্ষতাদিতে ব্যবহৃত হয়।

(৫৩শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

জিনসাই এসিটাস্।... ... ...এসিটেট্ অব্ জিঙ্ক।

মাত্রা। { ১ হইতে ২ গ্রেন বলকারক। ১০—২০ গ্রেন বমনকারক।

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, বমনকারক।

(প্রায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।)

আময়িক প্রয়োগ। প্রমেহ ও শ্বেত প্রদর রোগে ইহার পিচ্‌কারি, চক্ষু প্রদাহে ইহার কলিরিয়ম ব্যবহৃত হয়।

(৫৪শ)

ল্যাটিন॥ ইংরাজী॥

জিনসাই ক্লোরাইডম্... ... ...ক্লোরাইড্ অব্ জিঙ্ক।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, কিন্তু প্রায় ব্যবহৃত হয় না। বাহ্য প্রয়োগে দাহক, পচন নিবারক, দুর্গন্ধহারক।

আময়িক প্রয়োগ। প্রমেহ, দন্তক্ষত, পচাক্ষত ও ল্যুপস্ রোগে এবং পুরাতন ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

(৫৫শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

জিনসাই অক্সাইডম্।... ... ...অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক।

মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, অধিক মাত্রায় ভেদ ও বমনকারক।

বাহ্য প্রয়োগে। শুষ্ককারক, সঙ্কোচক।

প্রয়োগরূপ... ... .

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ জিনসাই... ... ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ)

আময়িক প্রয়োগ। পর্য্যায়জ্বর, অতিঘর্ম্ম, বালকদিগের উদরাময়, এবং মদাতঙ্ক রোগে আভ্যন্তরিক, পুযযুক্ত চক্ষু-প্রদাহে ইহার মলম, ও বিবিধ ক্ষতাদিতে স্থানিক।

(৫৬শ)

লাটিন।	ইংরাজী।
জিঙ্কসাই ভেলিরিয়েনস্।...	...ভেলিরিয়েনেট্ অব্ জিঙ্ক।

মাত্রা ।।০ হইতে ৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আক্ষেপ নিবারক, কৃমিনাশক।

আময়িক প্রয়োগ। কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, স্নায়ুশূল, ও মৃগী রোগে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(উত্তেজক।)

ধামনিক উত্তেজক সকল, যথা;—

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। এসিডম্ ফস্ফরিকম্	২—৮ মিনিম।
২। " " ডাইলুটম্........	১০—৩০ মিনিম।
৩। " " ফোরেটী	২—৬ মিনিম।
৪। লাইকর্ এমোনি	১০—৩০ মিনিম।
৫। " " ফর্সিয়র	৩—১০ মিনিম।
৬। অঙ্গুয়েণ্টম্ এলিমাই...	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
৭। " টেরেবিন্থিনি	
৮। লিনিমেণ্টম্ টেরেবিন্থিনি	
৯। " " এসিটিকম্	
১০। " এমোনি	
১১। টেরেবিন্থিনি চায়া...	১০—৪০ গ্রেন।

১২। টিংচ্যুরা ক্যাপসিসাই ... ... ৫—১৫ মিনিম।
১৩। „ ল্যারিসিস ... ... ১০—৩০ মিনিম।
১৪। ওলিয়ম টেরেবিন্থিনি ... ... ১০মিঃ—৪ ড্রাম।
১৫। „ ফস্ফরেটম্... .. ... ১—১০ মিনিম।
১৬। এমোনি কার্ব্বনাস .. . .. ৫—১০ গ্রেন।
১৭। স্পিরিটস্ এমোনি এরোমেটিকস্ ২০—৬০ মিনিম।
১৮। ক্যাপসিসাই ফ্রুক্টস্ ... ... ১/২—২ গ্রেন।
১৯। মাষ্টিক ... ... ২০—৬০ গ্রেন।
২০। ফস্ফরস্ .. ..১/২০০—১/৩০ গ্রেন।
২১। পাইল্যুলা ফস্ফরাই ... ... ৩—৬ গ্রেন।
২২। ক্যালসিস হাইপোফস্ফাস্ .. ... ৫—১০ গ্রেন।
২৩। সোডি হাইপোফস্ফাস্... .. ... ৫—১০ গ্রেন।
২৪। ইথর ফস্ফরেটস্ ... ... ১—১০ মিনিম।
২৫। ফস্ফরেটেড্ কড্লিভার অয়েল্... ..১—৪ ড্রাম।
২৬। স্যাণ্টেলম আল্বম্ .. .. ৫—৪০ মিনিম।
২৭। কন্ফেক্শিও টেরেবিন্থিনি... ... ১—৪ ড্রাম।
২৮। এনিমা টেরেবিন্থিনি ... .. } বাহ্য প্রয়োগার্থ
২৯। এলিমাই ... ... } ব্যবহৃত হয়।

ধামনিক্ উত্তেজক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এমোনি কার্ব্বনাস্।... ... ...কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া।

মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কফনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক, অম্ল নাশক, আক্ষেপ নিবারক, বমন কারক।

প্রয়োগরূপ ... ...মাত্রা।

১। স্পিরিটস্ এমোনি এরোমেটিকস্ ১০—৬০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ বশতঃ পাকাশয়ে অম্ল, বুক

জ্বালা, অম্লজনিত উদরাধ্মান, টাইফস, টাইফয়েড এবং স্কালেটজ্বর, নিউমোনিয়া, প্লুরাইটিস, হৃতপিণ্ডের রোগ বশতঃ শ্বাস কাশ, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস, হিষ্টিরিয়া, বসন্ত, মধুমেহ, এরিসিপেলাস, রোজিওলা, আঘাত, এরিথীমা প্রভৃতি রোগে এবং উত্তেজনার্থ বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

লাইকর্ এমোনি ফর্সিয়র। ষ্ট্রং সোল্যুশন্ অব্ এমোনিয়া।

[উগ্র এমোনিয়া দ্রব]

মাত্রা ৩ হইতে ১০ মিনিম।

ক্রিয়া। যথাযোগ্য জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, উত্তেজক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক, অম্ল নাশক, আক্ষেপ নিবারক, নির্জ্জলাবস্থায় দাহক বিষ ক্রিয়া করে। বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক, দাহক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। লাইকর্ এমোনি................. ১০—৩০ মিনিম।

২। লিনিমেণ্টম্ এমোনি .... বাহ্য প্রয়োগার্থ।

আময়িক প্রয়োগ। বাত রোগে বাহ্য প্রয়োগার্থ। টাইফস্, টাইফয়েড, এবং অন্যান্য অনুপর্য্যায় জ্বরে, অজীর্ণ হাম, বসন্ত, ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি রোগে আভ্যন্তরিক এবং সর্পাঘাতে আভ্যন্তরিক ও স্থানিক।

[৩য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফস্ফরস্।... ... ...ফস্ফরস্।

মাত্রা $\frac{১}{২০০}$ হইতে $\frac{১}{৩০}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কামোদ্দীপক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক।

প্রয়োগরূপ... ... ... মাত্রা।

১। ওলিয়ম্ ফস্ফরেটম্ ... ... ১—১০ মিনিম।

২। পাইল্যুলা ফস্ফরাই ... ...৩—৬ গ্রেন।

৩। এসিডম্ ফস্ফরিকম্ ... ... ২—৮ মিনিম।

৪। এসিডম্ ফস্ফরিকম্ ডাইল্যুটম্ ...১০—৩০ মিনিম।
৫। „ „ ফোরেটী ... ...২—৬ মিনিম।
৬। ক্যালসিস্ হাইপো ফস্ফাস্ ... ... ৫—১০ গ্রেন।
৭। সোডি হাইপো ফস্ফাস্ ... .. ৫—১০ গ্রেন।
৮। সিরপ্ অব্ হাইপো ফস্ফেট্ অব্ লাইম্ ১—২ ড্রাম।
৯। ইথর ফস্ফরেটস্ ... ... ১—১০ মিনিম।
১০। ফস্ফরেটেড্ কড্ লিভার অয়েল ... ...১—৪ ড্রাম।
১১। টিংচ্যুরা ফস্ফরি কম্পজিটা ... ...৩—১২ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। বিসূচিকা, হাম, ফুসফুস্ প্রদাহ, স্কার্লেটিনা, পক্ষাঘাত, মৃগী, কোরিয়া, রক্তহীনতা, গাইটর, স্নায়ু শূল, মস্তিষ্কের কোমলতা, যক্ষ্মা, বাত, লেপ্রসী, একজীমা প্রভৃতি চর্ম্ম রোগে ব্যবহৃত হয়।

[৪র্থ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ওলিয়ম টেরেবিন্থিনি। ... ... অয়েল্ অব্ টার্পেন্টাইন
তার্পিন তৈল।

মাত্রা। ৫—৩০ মিনিম রক্তরোধক, মূত্রকারক
॥০—২ ড্রাম উত্তেজক।
২—৮ ড্রাম বিরেচক ক্রিমিনাশক।

ক্রিয়া। উত্তেজক, মূত্রকারক, রক্ত রোধক, কফনিঃসারক ঘর্ম্মকারক, আক্ষেপ নিবারক, বিরেচক, ক্রিমি নাশক।

প্রয়োগরূপ... ... ... মাত্রা।
১। কনফেকশিয়ো টেরেবিন্থিনি ... ... ১—৪ ড্রাম
২। লিনিমেন্টম্ „ ... ...
৩। „ „ এসিটিকম্ ...
৪। এনিমা টেরেবিন্থিনি... ... ...
৫। অঙ্গুয়েন্টম টেরেবিন্থিনি... ...
(২—৫) বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ জ্বর, অতিসার, ধনুষ্টঙ্কার উদরাময়, মৃগী, পুরাতন বাত, রক্তোৎকাশ, রক্ত বমন রক্ত প্রস্রাব, অর্শ হইতে রক্তস্রাব, পুরাতন প্রমেহ, শ্বেত

ক্ষত, এবং বিবিধ আক্ষেপ জনক রোগে আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

[৫ম।]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
রেজিনা।...	...রেজিন্।

(ধুনা।)

ক্রিয়া। উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ।

১। এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ রেজিনি	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
২। অঙ্গুয়েণ্টম্ রেজিনি	

বাহ্য প্রয়োগার্থ বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়।

স্নায়বীয় উত্তেজক সকল যথা।——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা সম্বল...	১০—৩০ মিনিম।
২। „ ভেলিরিয়েনি	॥০—২ ড্রাম।
৩। „ „ এমোনিয়েটা.........	॥০—১ ড্রাম।
৪। „ ক্যাষ্টোরিয়াই	১—৪ ড্রাম।
৫। „ আসা ফেটিডি	$\frac{১}{২}$—২ ড্রাম।
৬। ইনফিউজম ভেলিরিয়েনি	১—২ আউন্স।
৭। „ কফি	২—৪ আউন্স।
৮। এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ গ্যালবেনাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
৯। „ এমোনিয়েসাই কম্ হাইড্রার্জিরো	
১০। কেম্ফিনা	$\frac{১}{২}$—৫ গ্রেন।

১১। কেফিনা সাইট্রাস ... ... ||০—৫ গ্রেন।
১২। ,, হাইড্রো ব্রোমাস ... ... ||০—৫ গ্রেন।
১৩। ,, ভেলিরিয়েনাস ... ... ||০—৩ গ্রেন।
১৪। ,, সোডি স্যালিসিলাস ... ১—৪ গ্রেন } হাইপডার্মিক ব্যবহার্য্য}
১৫। এমোনায়েকম্ ... ... ৫—৩০ গ্রেন
১৬। মিশ্চুরা এমোনিয়েসাই ... ... ১—২ আউন্স
১৭। এমিল নাইট্রাস্ .. .. ||০—১ মিনিম
১৮। পাইলুলা আসাফেটীডি কম্পজিটা ৫—২০ গ্রেন
১৯। এনিমা আসাফেটীডা ... ... বাহ্য প্রয়োগার্থ
২০। আসাফেটীডা .. .. ৫—২০ গ্রেন
২১। স্পিরিটস্ এমোনি ফেটীডস্ ... ... ||০—১ ড্রাম
২২। কফিয়া ... . ১০—৩০ গ্রেন
২৩। গ্যালবেনম ... ... ১০—২০ গ্রেন
২৪। স্যাগাপিনম্ ... ... ১০—৩০ গ্রেন
২৫। সম্বল রেডিক্স্ ... ... ১০—২০ গ্রেন
২৬। ভেলিরিয়েনি রেডিক্স্ ... ... ১০—৩০ গ্রেন
২৭। সোডি ভেলিরিয়েনাস্ ... .. ১—৫ গ্রেন
২৮। ক্যাষ্টোরিয়ম্ ... ... ১৬—৬০ গ্রেন

স্নায়বীয় উত্তেজক সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী

এমোনায়েকম্। ... ... এমোনায়াক

[ডোরিমা এমোনায়েকম বৃক্ষের ধুনাযুক্ত রস।]

মাত্রা ৫—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক, কফনিঃসারক, আক্ষেপ নিবারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। এমপ্লাষ্ট্রম এমোনায়েসাই কম হাডার্জিরো। } বাহ্য প্রয়োগার্থ।

২। মিশ্চ্যুরা এমোনায়েসাই... ... ...১—২ আউন্স।
আময়িক প্রয়োগ। শ্বাসকাশ এবং পুরাতন কাশরোগে আভ্যন্তরিক এবং বিবিধ রোগে ইহার পলস্ত্রা লাগান যায়।

[২য়]

লাটিন। ইংরাজী।
অ্যাসাফেটিডা। ... ... অ্যাসাফোটিডা।

[হিঙ্গু]

নার্থেক্স অ্যাসাফেটিডা নামক বৃক্ষের গঁদ ও ধুনাযুক্ত রস।

মাত্রা ৫—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, কফনিঃসারক, বায়ুনাশক, রজোনিঃসারক, কৃমি নাশক।

প্রয়োগরূপ··· ··· ··· ··· ··· ···মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা অ্যাসাফেটিডি··· ··· ···||০—২ ড্রাম।
২। স্পিরিটস অ্যাসাফেটিডি ··· ··· ||০—১ ড্রাম।
৩। পাইল্যুলা অ্যাসাফেটিডি··· ··· ···৫—২০ গ্রেন।
৪। এনিমা অ্যাসাফেটিডি ··· ··· (বাহ্য প্রয়োগার্থ)
আময়িক প্রয়োগ। হিষ্টিরিয়া, শ্বাসকাশ, মৃগী, কোরিয়া, উদরাধ্মান, হুপিংকফ, শৈশবাবস্থায় দন্ত উঠিবার সময় আক্ষেপ, এবং কৃমি রোগে।

[৩য়]

লাটিন। ইংরাজী।
ভেলিরিয়েনি রেডিক্স। ... ... ভেলিরিয়েন রুট।

ভেলিরিয়েনা অফিসিনেলিস বৃক্ষের কন্দ।

ইউরোপ খণ্ডে জন্মে।

চূর্ণমাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, অধিকমাত্রায় শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বিবমিসা, ও অস্থিরতা উপস্থিত করে।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা ভেলিরিয়েনি ... . ||০—২ ড্রাম।
২। „ „ এমোনিয়েটা, ... ||০—১ ড্রাম।

৩। ইনফিউজম ভেলিরিয়েনি ... ... ১—২ আউন্স।
আময়িক প্রয়োগ। হিষ্টিরিয়া, মৃগী, কোরিয়া, ফুস্‌ফুস্‌ প্রদাহ, এবং টাইফয়েড জ্বর রোগে।

[৪র্থ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
সোডি ভেলিরিয়েনাস্‌। ... ভেলিরিয়েনেট্‌ অব্‌ সোডা।

মাত্রা ১—৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক।
জিনসাই ভেলিরিয়েনাস্‌ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

[৫ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
মস্কস্‌। ... ... মস্ক।

[মৃগনাভি।]

মাত্রা ৫—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, কামোদ্দীপক, বায়ুনাশক, অধিক মাত্রায় মাদক।
প্রয়োগরূপ... .. ..মাত্রা।
১। টিংচ্যরা মস্কস্‌... ... ...১০—৩০ মিনিম।
আময়িক প্রয়োগ। কোরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, হিষ্টিরিয়া, গাউট, মৃগী, হিক্কা, হুপিংকফ, এরিসিপেলাস, টাইফস, টাইফয়েড ও অন্যান্য জ্বর, যক্ষ্মা, শ্বাসকাশ, ফুসফুস প্রদাহ, বমন নিবারনার্থ বিসুচিকা রোগে, এবং বিবিধ কাশ ও আক্ষেপ জনক রোগে ব্যবহৃত হয়।

মাস্তিষ্ক উত্তেজক সকল যথা—

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা ক্যানেবিস্‌ ইণ্ডিসি... ...	৫—৩০ মিনিম।
২। ,, হাইওসিয়েমাই	১০—৬০ মিনিম।
৩। ,, ওপিয়াই	৫—৪০ মিনিম।
৪। ,, ,, এমোনিয়েটা... ...	॥০—১ ড্রাম।

৫। টিংচ্যুরা ষ্ট্র্যামোনিয়াই ... ... ৫—২০ মিনিম।
৬। " ক্যাম্ফোরি কম্পজিটা ... ॥০—২ ড্রাম।
৭। " বেলাডোনি ... ... ৫—৩০ মিনিম।
৮। " আর্ণিসি ... ... ॥০—২ ড্রাম।
৯। একষ্ট্রাক্টম্ ক্যানেবিস্ ইণ্ডিসি... .. $\frac{১}{৪}$-১গ্রেন।
১০। " হাইওসায়েমাই ... ... ৫—১০ গ্রেন।
১১। " ওপিয়াই ... ... $\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন।
১২। " " লিকুইড্ ... ৫—৪০ মিনিম।
১৩। " বেলাডোনি ... ... $\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন।
১৪। " ষ্ট্র্যামোনিয়াই ... .।০—১ গ্রেন।
১৫। " পাপেভারিস্ ... ... ২—৫ গ্রেন।
১৬। স্পিরিটস্ ইথারিস্ ... ... ২০—৬০ মিনিম।
১৭। " ক্যাম্ফোরি ... ... ১০—৬০ মিনিম।
১৮। " ভাইনম্ গ্যালিসাই ... ১—৮ ড্রাম।
১৯। " রেক্টিফিকেটস্ ... ১০—১৫ মিনিম।
২০। " টেনিয়র্ ... ... ১—৪ ড্রাম।
২১। ভাইনম্ ওপিয়াই... ... ...৫—৪০ মিনিম।
২২। " সেরি ... ... ১—৪ ড্রাম।
২৩। সিরপস্ পাপেভারিস্ ... ... ১—২ ড্রাম।
২৪। " রিয়াডস্ ... ... ॥০—১ ড্রাম।
২৫। সক্কস্ বেলাডোনি... ... ...৫—১৫ মিনিম।
২৬। " হাইওসায়েমাই ... ... ॥০—১ ড্রাম।
২৭। ফোলিয়ো হাইওসায়েমাই .. ... ৫—১০ গ্রেন।
২৮। " বেলাডোনি ... ... ১—৫ গ্রেন।
২৯। " ষ্ট্র্যামোনিয়াই... ... ...১—৩ গ্রেন।

৩০। এমপ্লাষ্ট্রম্ ওপিয়াই ... ...
৩১। ,, বেলাডোনি ... ...
৩২। ,, ষ্ট্র্যামোনিয়াই ...
৩৩। ক্যাটেপ্লাজমা ষ্ট্র্যামোনিয়াই ... ...
৩৪। ,, ফর্ম্মেণ্টাই ... ...
৩৫। লিনিমেণ্টম্ ক্যাম্ফোরি ... ...
} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

৩৬। ,, ,, কম্পজিটা ...
৩৭। ,, বেলাডোনি ... ...
৩৮। ,, ওপিয়াই ... ...
৩৯। ,, এট্রোপি ... ...
} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

৪০। অঙ্গুয়েণ্টম্ এট্রোপি ... ...
৪১। ,, বেলাডোনি ... ...
} বাহ্য প্রয়োগার্থ।

৪২। পল্‌বিস্ ওপিয়াই কম্পজিটস্ ... ... ২—৫ গ্রেন।

৪৩। ,, ওপিয়াই ... ... $\frac{১}{৪}$ ...২ গ্রেন।

৪৪। ,, ক্রিটি এরোমেটিক কম্ ওপিও ১০—৪০ গ্রেন।

৪৫। ,, ইপিকাকুয়ানি কম্পজিটস্ ... ৫—১০ গ্রেন।

৪৬। ,, কাইনো কম্পজিটস্ ... ৫—২০ গ্রেন।

৪৭। পাইল্যুলা ইপিকাকুয়ানি কম্ শিলা ..৫—১০ গ্রেন।

৪৮। ,, স্যাপনিস কম্পজিটা ... ... ২—৫ গ্রেন।

৪৯। ,, প্লম্বাই কম্ ওপিও ... .. ৪—৮ গ্রেন।

৫০। ট্রোচিসাই মর্ফি ... ... ১—৫ চাক্তি

৫১। ,, ,, এট ইপিকাকুয়ানি...১—৬ চাক্তি।

৫২। ,, ওপিয়াই... ... ...১—৬ চাক্তি।

৫৩। মর্ফিয়া হাইড্রো ক্লোরাস্ ...
৫৪। ,, এসিটাস্ ... ...
} $\frac{১}{৮}$—॥৹ গ্রেন।

৫৫। লাইকর মর্ফি হাইড্রো ক্লোরাস্
৫৬। ,, ,, এসিটাস্ ...
} ১০-৬০ মিনিম।

৫৭। লাইকর্ এট্রোপি সল্ফেটিস্ } ...১—৪ মিনিম।
৫৮। ,, এট্রোপি... ... ... }
৫৯। সপোজিটোরিয়া মর্ফি ... ... { বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
৬০। ,, ,, কম্সেপনি
৬১। ,, প্লম্বাই কম্পজিটা... ...
৬২। এট্রোপি... ... ... { $\frac{১}{১২০}$—$\frac{১}{৬০}$ গ্রেন।
৬৩। ,, সল্ফেটিস্... ...
৬৪। এনিমা ওপিয়াই... ... ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)
৬৫। কনফেক্সিয়ো ওপিয়াই... ... ...৫—২০ গ্রেন।
৬৬। ডিকক্টম্ পাপেভারিস্ ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)
৬৭। আর্ণিসি রেডিক্স্ ... ... ৫—২০ গ্রেন।
৬৮। ক্যাম্ফোরা ... ... ১—১০ গ্রেন।
৬৯। ,, মান্ব্রোমেটা ... ... ২—৫ গ্রেন।
৭০। একোয়া ক্যাম্ফোরি ... ... ১—২ আউন্স।
৭১। সেরেভাইসি ফার্মেণ্টম্... ... ... ২—৮ গ্রেন।
৭২। ইঞ্জেকসিয়ো মর্ফি হাইপডার্ম্মিকা ১—৬ মিনিম। হাইপোডার্ম্মিকব্যবহার্য্য।

মাস্তিষ্ক উত্তেজক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ইথর্। ... ... ইথর্।

আলকোহল হইতে প্রস্তুত হয়।
মাত্রা ২০—৬০ মিনিম।

ক্রিয়া। ব্যাপ্ত উত্তেজক, মাদক, স্পর্শহারক, আক্ষেপ নিবারক।

প্রয়োগরূপ। ... ... মাত্রা।
১। স্পিরিট্স্ ইথরিস্... ... ... } ॥০—১ ড্রাম।
২। ,, ,, কম্পজিটস্...}

আময়িক প্রয়োগ। হিষ্টিরিয়া, মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার, শিরঃপীড়া কর্ণবেদনা, হিক্কা নিবারণার্থ, শ্বাসকাস, বিসূচিকা, জ্বর, অন্ত্রপ্রদাহ, অন্ত্রবেদনা, গর্ব্ভবেদনা, পাকাশয়, মূত্রাশয় ও

অন্ত্রাক্ষেপ, অস্ত্র চিকিৎসার যন্ত্রণা নিবারণার্থ, এবং অন্যান্য বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

আর্নিসি রেডিক্স্। ... ... আর্নিকারূট্।

আর্নিকা মল্টানা বৃক্ষের শুষ্ক মূল।

ইউরোপ, এসিয়া ও আমেরিকা খণ্ডে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ৫—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মাস্তিষ্ক উত্তেজক, মাদক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, আক্ষেপ ও অচৈতন্য উপস্থিত করে।

প্রয়োগরূপ... .. . . মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা আর্নিসি... .. ..॥০—২ ড্রাম

আময়িক প্রয়োগ। উৎকট জ্বর, বিবিধ পক্ষাঘাত এবং আভিঘাতিক ক্ষতে।

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

বেলাডোনি। .. .. বেলাডোনা।

এট্রোপি বেলেডোনা নামক বৃক্ষের সরস বা শুষ্কপত্র এবং তরুণ শাখা ও মূল।

চূর্ণ মাত্রা ।০—২ গ্রেন।

ক্রিয়া। নিদ্রাকারক, মূত্রকারক, আক্ষেপ নিবারক, মাদক, স্নায়বীয় ও মাস্তিষ্ক উত্তেজক, বেদনা নিবারক, বাহ্য প্রয়োগে স্পর্শহারক, বেদনা নিবারক।

প্রয়োগরূপ..: ... ...মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা বেলাডানি... ... ... ৫—৩০ মিনিম

২। লিনিমেণ্টম্ বেলাডানি... ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ।

৩। এক্ষ্ট্রাক্টম্ বেলাডানি... ... ... ।০—১ গ্রেন

৪। সক্কস্ বেলাডানি .. ..৫—১৫ মিনিম

৫। এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ বেলাডানি } ...বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত
৬। অঙ্গুয়েন্টম্ বেলাডানি } হয়।

আময়িক প্রয়োগ। আক্ষেপজনক রোগ, নিউর্যালজিয়া, শিরঃশূল, পক্ষাঘাত, মৃগীরোগ, হুপিংকফ, আর্মোরোসিস, ক্যান্সরক্ষত, ডিস্মেনোরিয়া, জ্বররোগ, চক্ষুতারা সঙ্কুচিতা হইলে, সায়টিকা, অর্শ, অর্কাইটিস, ফাইমোসিস, প্যারা-ফাইমোসিস, কর্ডি, স্ক্রফিউলা, অ্যাজমা, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, বিবিধ বেদনা জনক রোগে, পারদ দ্বারা মুখ আসিলে।

(৪র্থ)

এট্রোপি। ... ... এট্রোপিয়া।

বেলাডোনা হইতে প্রস্তুত।

মাত্রা $\frac{১}{১২০}$ হইতে $\frac{১}{৬০}$ গ্রেন।

আভ্যন্তরিক প্রযোগ হয় না।

ক্রিয়া। বেলেডোনার ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা এত প্রবল যে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না। কনিনীকা প্রসারণার্থ বেলাডোনা অপেক্ষা অধিক উপযোগী।

প্রয়োগরূপ ... ...মাত্রা।

১। লাইকর্ এট্রোপি ... ... } ১—৪ মিনিম।
২। ,, ,, সলফেটিস }
৩। অঙ্গুয়েণ্টম্ এট্রোপি ... ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)
৪। এট্রোপি সলফাস্ ... ... $\frac{১}{১২০}$—$\frac{১}{৬০}$ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। বেলাডোনার ন্যায়।

(৫ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যাম্ফোরা। ... ... ক্যাম্ফর।

(কর্পূর।)

ক্যাম্ফোরা অফিসেনেলিস বৃক্ষের বায়িতৈল।

মাত্রা ১—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মাস্তিষ্ক উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, বেদনা নিবারক, নিদ্রাকারক, স্বেদজনক, জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতাহারক, বাহ্য প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতা সাধক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা ক্যাম্ফোরি কম্পজিটা ... ... ॥০—২ ড্রাম।
২। স্পিরিটস্ ক্যাম্ফোরি... ... ...১০—৬০ মিনিম।
৩। একোয়া ক্যাম্ফোরি ... ... ১—২ আউন্স।
৪। লিনিমেণ্টম্ ক্যাম্ফোরি... ... ... } বাহ্য প্রয়োগার্থ
৫। „ „ কম্পজিটা... } ব্যবহৃত হয়।
৬। „ সেপোনিস্... ... ... }
৭। ক্যাম্ফোরা মানব্রমেটা ... ... ২—৫ গ্রেন।
আময়িক প্রয়োগ। টাইফস্ ও টাইফয়েড্ প্রভৃতি জ্বর রোগে, গাউট, বাত, ফুসফুস ও মুত্রযন্ত্র প্রভৃতি যান্ত্রিক প্রদাহে, কষ্টরজ, উন্মত্ততা, কামোন্মাদ, কর্ডি, শুক্রমেহ, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, ও মৃগী রোগে, স্নায়বীয় শিরঃপীড়া, হুপিংকফ, শ্বাসকাশ, কনফ্লুয়েণ্ট স্মল্পক্স্, প্রভৃতি রোগে।

[৬ষ্ঠ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ক্যানেবিস্ ইণ্ডিসি। .. .. ইণ্ডিয়ান হেম্প।

[গাঁজা।]

ক্যানেবিস্ সেটাইভা বৃক্ষের মঞ্জরিত শাখাগ্র।
ভারতবর্ষ, ইউরোপ, এবং পারস্য প্রভৃতি স্থানে জন্মে।
ক্রিয়া। আক্ষেপ নিবারক, মাদক, নিদ্রাকারক, মাস্তিষ্ক উত্তেজক, কামোদ্দীপক, বেদনা নিবারক, জরায়ু সঙ্কোচক।
প্রয়োগরূপ... ... ...মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা ক্যানেবিস্ ইণ্ডিসি... ... ৫—৩০ মিনিম।
২। এক্ষ্ট্রাক্টম্ ক্যানেবিস্ ইণ্ডিসি... .. ।০—২ গ্রেন।
আময়িক প্রয়োগ। ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, বিসূচিকা, মদাতঙ্ক, শিরঃপীড়া, হুপিংকফ, শ্বাসকাস, উন্মাদরোগ, রক্তপ্রস্রাব, প্রমেহ, বাত ও স্নায়শূল, রজোকৃচ্ছ, জরায়ুর শিথিলতা প্রযুক্ত প্রসব বিলম্ব হইলে, এবং জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে।

(৭ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

হাইয়ো সায়েমাই ফোলিয়া। হাইয়ো সায়েমস্ লিভস্।

(হাইয়ো সায়েমস্ নাইগর বৃক্ষের সরস এবং শুষ্কপত্র ও তরুণ শাখাগ্র।)

ক্রিয়া। বেদনা নিবারক, মাদক, কনীনিকা প্রসারক, মাস্তিষ্ক উত্তেজক, অবসাদক, আক্ষেপ নিবারক, নিদ্রাকারক, ঈষৎ সঙ্কোচক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা হাইয়ো সায়েমাই ... ... ২০—৬০ মিনিম।

২। এক্স্ট্রাক্টম্ হাইয়ো সায়েমাই ... ...৫—১০ গ্রেন।

৩। সক্কস্ হাইয়ো সায়েমাই ... ... ‖০—১ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। মেনিয়া, নিউর‍্যালজিয়া, গাউট, রিউমেটিজম্, অ্যাজ্‌মা, অর্শ, মিল্ক অ্যাবসেস্, সিষ্টাইটিস, নিফ্রাইটীস্, এবং বিরেচক ঔষধাদির উগ্রতা হ্রাস করণার্থ।

[৮ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ওপিয়াই। ... ... ওপিয়ম্।

(অহিফেন।)

পাপেবর সমনিফিরম ঔষধির অপক্ক ফল বা ঢেড়ির দুগ্ধবৎরস।

মাত্রা ।০—২ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, ধারক, মাদক, বেদনা নিবারক, স্পর্শ হারক, পর্য্যায় নিবারক, স্বেদজনক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা ওপিয়াই ... ... ৫—৪০ মিনিম।

২। „ ক্যাম্ফোরি কম্পজিটা ... ... ‖০—২ ড্রাম।

৩। „ ওপিয়াই এমোনিয়েটা... ...‖০—১ ড্রাম।

৪। পল্‌বিস্ ইপিকাকুয়ানি কম্পজিটস্... ৫—১০ গ্রেন।

৫। পল্‌বিস্‌ কাইনো কম্পজিটস্‌ ... ... ৫—২০ গ্রেন।
৬। „ ওপিয়াই কম্পজিটস্‌ ... ... ২—৫ গ্রেন।
৭। „ ক্রিটি এরোমেটিক্‌স্‌ কম্‌ ওপিয়ো ১০—৪০ গ্রেন।
৮। পাইলুলা ইপিকাকুয়ানি কম্‌সিলা ... ৫—১০ গ্রেন।
৯। „ প্লম্বাই কম্‌ ওপিয়ো ... ... ৪—৮ গ্রেন।
১০। „ সেপনিস্‌ কম্পজিটা ... . ২—৫ গ্রেন।
১১। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ ওপিয়াই ... . ।০—১ গ্রেন।
১২। „ „ লিকুইডম্‌ ... ৫—৪০ মিনিম।
১৩। ভাইনম্‌ ওপিয়াই ... ... ৫—৪০ মিনিম।
১৪। কন্‌ফেক্‌শিয়ো ওপিয়াই ... ... ৫—২০ গ্রেন।
১৫। ট্রোচিসাই ওপিয়াই ... ... ১—৬ চাক্তি।
১৬। এম্‌প্লাষ্ট্রম্‌ ওপিয়াই ... ...
১৭। লিনিমেণ্টম্‌ ওপিয়াই ... ...
১৮। অঙ্গুয়েণ্টম্‌ গ্যালি কম্‌ ওপিয়ো ... বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
১৯। এনিমা ওপিয়াই ... .
২০। সপোজিটোরিয়া প্লম্বাই কম্পজিটা ...

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, অতিসার, পাইরোসিস্‌ বাত রোগ, গাউট, মূত্র ও মধুমেহ, প্রমেহ, ধনুষ্টঙ্কার বিবিধ আক্ষেপজনক রোগ, স্প্যাজমডিক ষ্ট্রিক্‌চার, সীসশূল, কাশ রোগ, সপর্য্যায় রোগ, টাইফস্‌ জ্বর, বেদনাজনক রোগ, প্রাদাহিক জ্বর রোগ, সূতিকা উন্মাদ, এণ্টেরাইটিস্‌, গ্যাষ্ট্রো-ইটিস্‌ পেরিটো নাইটিস্‌, একিউট্‌ সিষ্টাইটিস্‌, ইণ্টাস্‌, সসেপ্‌সন্‌, মদাতঙ্ক, উন্মাদরোগ, ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্‌ হার্ণিয়া, অনিদ্রা, বমন ও হিক্কানিবারণার্থ, মূত্র ও পিত্ত প্রণালী প্রভৃতিতে পাথরি থাকিলে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে, গর্ব্ভস্রাবের উপলক্ষ হইলে, প্রসবান্তে হেতাল ব্যাথা ও

স্নায়ুশূল রোগে আভ্যন্তরিক, এবং সোরায়েসিস্, হার্পিস্, বিবিধ পচা ও দুষ্ট ক্ষতে স্থানিক ব্যবহৃত হয়।

লাটিন। [৯ম] ইংরাজী।

মর্ফিয়া হাইড্রো ক্লোরাস। হাইড্রো ক্লোরেট্ অব্ মর্ফিয়া।

(অহিফেন হইতে প্রস্তুত।)

মাত্রা $\frac{১}{৮}$ হইতে $\frac{১}{২}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। মাস্তিষ্ক উত্তেজক, মাদক, আক্ষেপনিবারক, ঘর্ম্মকারক, বেদনানিবারক, নিদ্রাকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। লাইকর্ মর্ফি হাইড্রো ক্লোরেটিস্ ... ১০—৬০ মিনিম।

২। ট্রোচিসাই মর্ফি ... ... ১—৫ চাক্তি।

৩। „ „ এট্ ইপিকাকুয়ানি ১—৬ চাক্তি।

৪। সপোজিটোরিয়া মর্ফি ... ... } বাহ্য প্রয়োগার্থ

৫। „ „ কম্ সেপনি ... } ব্যবহৃত হয়।

৬। ইঞ্জেক সিয়ো মর্ফি হাইপো ডার্মিকা }

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ অস্ত্রাঘাতাদির পর অনিদ্রা, যন্ত্রনাজনক রোগ, প্রবল উন্মাদ, মদাতঙ্ক, কোরিয়া, শ্বাসকৃচ্ছ, বিসূচিকা, রক্তোৎকাশ, গর্ভাবস্থায় বমন, ও অন্যান্য দুর্দ্দম বমনাদি রোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ অপেক্ষা হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশন অধিক ব্যবহৃত হয়।

(১০ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

মর্ফিয়া অ্যাসিটাস্। ... ... এসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া।

(অহিফেন হইতে প্রস্তুত।)

মাত্রা $\frac{১}{৮}$ হইতে ৷৷০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মস্তিষ্ক উত্তেজক, মাদক।

প্রয়োগরূপ। ... ...মাত্রা।

১। লাইকর্ মর্ফি এসিটেটিস্ ... ... ১০—৬০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। হাইড্রোক্লোরেট্ অব্ মর্কিয়ার ন্যায়।

(১১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ষ্ট্র্যামোনিয়াই ফোলিয়া } এটসেমিনা } ষ্ট্র্যামোনিয়ম্ } লিভস্ এণ্ডসিড্স্ }

(ধুস্তর পত্র এবং বীজ।)

ক্রিয়া। অবিকল বেলাডোনার ন্যায়।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। একষ্ট্রাক্টম্ ষ্ট্র্যামোনিয়াই ... ... ।০—১ গ্রেন।

২। টিংচ্যুরা ষ্ট্র্যামোনিয়াই ... ... ৫—২০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। অ্যাজমা, মেনিয়া, মৃগী, কোরিয়া, গ্যাষ্ট্রোডিনিয়া, রিউমেটিজম, গাউট, নিউর্যালজিয়া, গিনি ওয়ার্ম্, একজীমা প্রভৃতি রোগে।

(১২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

প্যাপেভেরিস্ ক্যাপসিউলি। ... ... পপি ক্যাপসিউল।

(পোস্তের ঢেড়ি।)

ক্রিয়া। অহিফেণের ন্যায় কিন্তু তদপেক্ষা অনেক মৃদু।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। ডিকক্টম্ প্যাপেভেরিস্ ... ... বাহ্য প্রয়োগার্থ

২। সিরপস্ প্যাপেভেরিস্ ... ... ১—২ ড্রাম।

৩। একষ্ট্রাক্টম্ প্যাপেভেরিস্ ... ...২—৫ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। বেদনা, কাশের উগ্রতা ও আক্ষেপ নিবারণার্থ ব্যবহার্য্য।

কশেরুকা মজ্জের উত্তেজক ঔষধ সকল যথা;—

ঔষধ সকলের নাম। ... ... মাত্রা।

১। ষ্ট্রিক্নি... ... ... $\frac{১}{৩০}$—$\frac{১}{১২}$ গ্রেন।

২। ষ্ট্রিক্‌নি এসিটাস্		
৩। ,, সল্‌ফাস্	} $\frac{১}{২৪}$—$\frac{১}{১০}$ গ্রেন	
৪। ,, নাইট্রাস্		
৫। ,, সল্‌ফাস্ এসিডা ...		
৬। ফেরি এট ষ্ট্রিক্‌নি সাইট্রাস্	৩—৮ গ্রেন।	
৭। ,, কুইনাইন এটষ্ট্রিক্‌নি সাইট্রাস্	৩—১০ গ্রেন।	
৮। লাইকর্ ষ্ট্রিক্‌নি	৪—১০ মিনিম।	
৯। টিংচ্যুরা নিউসিস্ ভমিসি	৫—২০ মিনিম।	
১০। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ নিউসিস্ ভমিসি	।০—২ গ্রেন।	
১১। নক্সভমিকা	।০—২।৩ গ্রেন।	
১২। ব্রুসিয়া	$\frac{১}{১৬}$—$\frac{১}{২}$ গ্রেন।	

কশেরুকা মজ্জের উত্তেজক
ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
নিউশেষ ভমিসি ... ... নক্সভমিকা।

(কুঁচিলা।)

ষ্ট্রিক্‌নস নক্সভমিকা নামক বৃক্ষের বীজ। ভারতবর্ষ এবং সমুদ্রস্থ উপদ্বীপে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ।০—২।৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, আগ্নেয়, কামোদ্দীপক, উত্তেজক, মাদক, মূত্রকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা নিউসিস্ ভমিসি... ... ৫—২০ মিনিম।
২। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্ নিউসিস্ ভমিসি ... .. ।০—২ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, গাউট, বাত, উদরাময়, অতিসার, কোরিয়া, নিউর‍্যালজিয়া, হেমিপ্লেজিয়া, প্যারাপ্লিজিয়া, সীসশূল, বিবিধ পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ষ্ট্রিক্‌নি ... ... ষ্ট্রিক্‌নিয়া।

[কুঁচিলার বীর্য্য।]

মাত্রা $\frac{১}{৩০}$ হইতে $\frac{১}{১২}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। নক্স ভমিকার ন্যায়।

প্রয়োগরূপ ... . মাত্রা।

১। লাইকর্ ষ্ট্রিক্‌নি ... . ৪—১০ মিনিম।

২। ফেরিএট্ ষ্ট্রিক্‌নি সাইট্রাস্ . ... ৩—৮ গ্রেন।

৩। „ কুইনাইন্‌এট ষ্ট্রিক্‌নি সাইট্রাস্ ৩—১০ গ্রেন।

৪। ষ্ট্রিক্‌নি সাইট্রাস্ ... ...
৫। „ এসিটাস্ ... ...
৬। „ সলফাস্ .. ..
৭। „ „ এসিডা ...
} $\frac{১}{২৪}$—$\frac{১}{১০}$ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। কুচিলার ন্যায়।



সপ্তম অধ্যায়।

ধামনিক অবসাদক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। এসিডম্ এসিটিকম্	৩—১৫ মিনিম।
২। ,, ,, ডাইলিউটম্	॥০—২ ড্রাম।
৩। ,, সাইট্রিকম্	১০—৩০ গ্রেন।
৪। ,, অকজ্যালিকম্	॥০—২ গ্রেন।
৫। ,, টার্টারিকম্	১০—৩০ গ্রেন।
৬। এণ্টিমনিয়াই টার্টারেটম্ ...	$\frac{১}{১৬}$—২ গ্রেন।
৭। ,, অক্সাইডম্	১—৪ গ্রেন।
৮। ,, সলফিউরেটম্	১—৪ গ্রেন।
৯। ,, টার্টারেটাই লাইকর ...	৫—৬০ মিনিম।
১০। ভাইনম এণ্টিমোনিয়েলিস্ ...	৫—৬০ মিনিম।
১১। একনাইসিয়া	$\frac{১}{২৪০}$—$\frac{১}{৬০}$ গ্রেন।
১২। অঙ্গুয়েণ্টম একোনাইসি	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত।
১৩। ,, এণ্টিমোনিয়াই টার্টারেটাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত।
১৪। পলবিস্ এণ্টিমোনিয়েলিস্ ...	৩—১০ গ্রেন।
১৫। সিরপস্ লিমোনিস্	১—৪ ড্রাম।
১৬। সক্কস্ লিমোনিস্	২—৮ ড্রাম।
১৭। অকজিমেল	১—৮ ড্রাম।
১৮। পটাসি নাইট্রাস	৫—২০ গ্রেন।
১৯। একোনাইটম্	১—২ গ্রেন।
২০। টিংচ্যুরা একোনিটাই	৫—১৫ মিনিম।
২১। লিনিমেণ্টম একোনিটাই ...	[বাহ্য প্রয়োগার্থ]

ধামনিক অবসাদক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম এসিটিকম ... ... এসিটিক্ এসিড্।

[সির্কাম্ল]

মাত্রা ৩—১৫ মিনিম।

ক্রিয়া। জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, ধামনিক অবসাদক, শৈত্য কারক, সঙ্কোচক, আগ্নেয়, ক্বচিৎ মূত্র-কারক, স্বেদ জনক। স্থানিক প্রয়োগে ফোস্কা কারক, দাহক, চর্ম্ম প্রদাহক, উগ্রতা সাধক, দুর্গন্ধ হারক, পচন নিবারক।

প্রয়োগরূপ। ... ... মাত্রা।

১। এসিডম্ এসিটিকম ডাইল্যুটম্ ... ॥০—২ ড্রাম।

২। অকজিমেল ... ... ১—৮ ড্রাম।

৩। এসিডম্ এসিটিকম্ গ্ল্যাসিয়েল ... ২—৫ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। আঁচিল, দদ্রু, সোরায়েসিস, পোরা-ইগো, কড়ুল, কড়া, ভিনিরিয়েলভেজিটেসন, শ্বাসরোধ, শিরঃপীড়া, মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, স্কার্ভি, স্কার্লেটিনা, ক্রনিক-অপথ্যালমিয়া, গ্যাংগ্রিন ও পচা ক্ষত, ঠুনকো, পার্পিউরা চক্ষু মধ্যে চুন লাগিলে জল মিশ্রিত করিয়া ধৌত করিতে, কৃমি জনিত বিসুচিকায়, বিবিধ রক্তস্রাব, এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ সাইট্রিকম্ ... ... সাইট্রিক্ এসিড্।

[জম্বিরাম্ল।]

মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। শৈত্য কারক, অবসাদক, স্কার্ভিনিবারক, পচন নিবারক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর ও প্রদাহাদি রোগ এবং স্কার্ভি রোগে।

(৩য়)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
এসিডম টার্টারিকম্	টার্টারিক এসিড।

[দ্রাক্ষাম্ল।]

মাত্রা ১৫—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। ধামনিক অবসাদক, শৈত্য কারক, পচন নিবারক। আময়িক প্রয়োগ। প্রদাহিক ও জ্বর রোগ, স্কার্ভি, অন্ত্র-মধ্যে অধিক শ্লেষ্মা থাকিলে। এতদ্ভিন্ন ইহা জম্বিরাম্লের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

[৪র্থ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
সক্কস লিমোনিস্	লেমনজুস।

(জম্বীর রস।)

মাত্রা ২—৮ ড্রাম বা তদূর্দ্ধ।

ক্রিয়া। সর্ব্বমতে জম্বিরাম্লের ন্যায়।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। সিরপস্ লিমোনিস	১—৪ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। স্কার্ভি, তরুণ বাত, জ্বর, অতিসার এবং উদরাময় রোগে।

[৫ম]

এণ্টিমনি ধাতু ঘটিত ঔষধ সকল।

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
এণ্টিমোনিয়ম্ টার্টারেটম্। ...	টার্টারেটেড্ এণ্টিমোনি।

মাত্রা।
- $\frac{১}{১২}$—$\frac{১}{৮}$ গ্রেন স্বেদ জনক, কফনিঃসারক।
- ১—২ ,, বমন কারক।
- $\frac{১}{৮}$—$\frac{১}{২}$,, বিবমিসা ও অবসাদক।

ক্রিয়া। ধামনিক অবসাদক; শৈত্যকারক, স্বেদজনক, বিব
মিসা জনক, কফনিঃসারক, মূত্র কারক, পরিবর্ত্তক, বমন
কারক, বিরেচক, শোষক, প্রদাহ নাশক, স্থানিক উগ্রত্ব
সাধক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

ভাইনম অ্যান্টি- মোনিয়েলিস্ } ৫-৩০ মিঃ কফনিঃসারক, ঘর্ম্ম কারক।
॥০—২ ড্রাম বিবমিসা জনক্।
২—৪ ড্রাম বমন কারক।

২। অঙ্গুয়েণ্টম এণ্টিমোনিয়াই টার্টারেটাই } (বাহ্য প্রয়োগার্থ)

আময়িক প্রয়োগ। মাদক দ্বারা বিষাক্ত, অন্ত্র প্রদাহ, প্রস
বান্তে স্তন প্রদাহে, রেমিটেণ্ট, ইণ্টর মিটেণ্ট, কণ্টিনিউড
জ্বর, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, প্লিবাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস
হিপেটাইটিস, প্লুরাইটিস, হিমপ্টিসিস, অ্যারাকাইটিস্
ক্রুপ, হুপিংকফ, ডিপথিরিয়া, আর্টীকুল্যার, রিউমেটিজম,
মদাতঙ্ক, পক্ষাঘাত, উন্মাদ, সুতিকোন্মাদ, হিষ্টিরিয়া, শির
শূল, বাঘি, স্ফীতকোষ, ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ হার্ণিয়া, অপথ্যালমিয়া
ইরিসিপেলাস, সোরায়েসিস্ প্রভৃতি রোগে।

(৬ষ্ঠ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এণ্টিমোনিয়ম্ অক্সাইডম্ ... অক্সাইড্ অব্ এণ্টিমোনি

মাত্রা। ১—৪ গ্রেন।

ক্রিয়া। টার্টার এমেটিকের ন্যায়, কিন্তু তদপেক্ষা মৃদু।

প্রয়োগরূপ। ... ... মাত্রা।

১। পবলিস্ এণ্টিমোনিয়েলিস ... ... ৩—১০ গ্রেন

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ জ্বর রোগে।

(৭ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসি নাইট্রাস্ ... . নাইট্রেট্ অব্ পটাস্।

(সোরা বা যবক্ষার।)

মিসর, পারস্য, স্পেন, এবং ভারতবর্ষের মৃত্তিকাতে জন্মে।

মাত্রা। { ৫—২০ গ্রেন শৈত্যকারক, মূত্র কারক। ২০—৬০ গ্রেন ধামনিক অবসাদক। }

ক্রিয়া। অবসাদক, স্বেদ জনক, বেদনা নিবারক, মূত্রকারক, অধিক মাত্রায় বিরেচক, ও বমন কারক।

আময়িক প্রয়োগ। তরুণ ও পুরাতন বাত রোগ, স্কার্ভি, রক্তোৎকাশ, ব্রঙ্কাইটিস্, অ্যাজমা, টনসিলাইটিস, শোথ, জ্বর, মেনিনা, হার্পিজ প্রভৃতি রোগে।

স্নায়বীয় অবসাদক ঔষধ সকল যথা।

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। টিংচুরা একোনিটাই	৫—১৫ মিনিম।
২। „ ডিজিটেলিস	১০—৩০ মিনিম।
৩। „ লোবিলি	১০—৬০ মিনিম।
৪। „ „ ইথিরিয়া	১০—৬০ মিনিম।
৫। „ বিরাট্রাই বিরিডিস	৫—১৫ মিনিম।
৬। একষ্ট্রাক্টম একোনিটাই	।০—২ গ্রেন।
৭। ভিরাট্রিম আলবম	১—৫ গ্রেন।
৮। লিনিমেন্টম একোনিটাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
৯। এনিমা ট্যাবেসাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
১০। অঙ্গুয়েণ্টম একোনাইসি	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
১১। সিমিসিফিউগা	২০—৬০ গ্রেন।
১২। ডিজিটেলিস ফোলিয়ো	॥০—২ গ্রেন।
১৩। „ ইনফিউজম	২—৮ ড্রাম।

১৪। ডিজিটেলাইন ... ... $\frac{১}{৬০}$—$\frac{১}{৩০}$ গ্রেন।
১৫। লোবিলিয়া ... ... ২—৫ গ্রেন।
১৬। একোনাইটম্ ... ... ১—২ গ্রেন।
১৭। একোনাইসিয়া ... ... $\frac{১}{২৪০}$—$\frac{১}{৬০}$ গ্রেন।
১৮। স্যাবেডিলা ... ... ৪—৮ গ্রেন।
১৯। বিরাট্রিয়া ... ... $\frac{১}{৭০}$—$\frac{১}{১৬}$ গ্রেন।
২০। ভাইনম বিরাট্রাই ... ... ৫—২০ মিনিম।
২১। বিরাট্রাই বিরিডিস্ রেডিক্স্ ... ১—২ গ্রেন।

স্নায়বীয় অবসাদক ঔষধ
সকলের বিবরণ।
[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
একোনাইটম্। ... ... একোনাইট।

একোনাইটম্ নেপেলস নামক ঔষধির
মূল, সরসপত্র এবং পুষ্প।
চূর্ণ মাত্রা ১—২ গ্রেন। }
প্রায় ব্যবহৃত হয় না। }

ক্রিয়া। বেদনানিবারক, স্নায়বীয় ও ধামনিক অবসাদক, মাদক, অধিকমাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়া করে। স্থানিক উগ্রতাসাধক, স্পর্শহারক, বেদনানিবারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। টিংচুরা একোনিটাই ... ... ৫—১৫ মিনিম।
২। একষ্ট্রাক্টম্ একোনিটাই ... ... ।০—২ গ্রেন।
৩। লিনিমেণ্টম্ একোনিটাই ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)

আময়িক প্রয়োগ। তরুণ ও পুরাতন বাত, প্রাদাহিক জ্বর, দমনার্থ, আদকপালি বেদনায়, প্রমেহ রোগের প্রবল অবস্থায়, শোথ রোগ, প্যালপিটেসন্ অব্ দি হার্ট, এরিসি-

পেলাস্, রক্তস্রাব, ধনুষ্টঙ্কার, স্ক্রফিউলা, অ্যামোরোসিস্, ভিনিরিয়েল নোড্স্, সায়েটীকা, এবং বিবিধ স্নায়ুশূল রোগে।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

একোনিসিয়া। ... ... একোনাইসি।

(একোনাইট্ হইতে প্রস্তুত।)

মাত্রা $\frac{১}{২৪০}$—$\frac{১}{৬০}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। একোনাইটের ন্যায়, কিন্তু অবসাদন ক্রিয়া এত প্রবল যে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।

বাত এবং স্নায়ুশূল ও পেশির বেদনা রোগে বাহ্য প্রয়োগ বিশেষ উপকারক।

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ একোনাইসি ... [বাহ্য প্রয়োগার্থ]

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ডিজিটেলিস্ ফোলিয়া। ... ... ফক্সগ্লব।

ডিজিটেলিস্ পর্পিউরা নামক বৃক্ষের শুষ্কপত্র।

চূর্ণ মাত্রা ॥০—২ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় অবসাদক, মূত্রকারক, শৈত্যকারক, জরায়ু সঙ্কোচক, চর্ম্ম প্রদাহক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। ইনফিউজম্ ডিজিটেলিস্ ... $\frac{১}{২}$—১ আউন্স।

২। টিংচ্যুরা ডিজিটেলিস্ ... ... ১০—৩০ মিনিম।

আভ্যন্তরিক প্রয়োগ। ডাইলেটেসন, প্যালপিটেসন, ইনক্রাষেসন, শোথ, উদরি, রক্তোৎকাশ, মৃগীরোগ, মত্ততা স্নায়ুশূল, শিরঃপীড়া, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, কর্ণে বেদনা হইলে,

রক্তস্রাব, মদাতঙ্ক রোগ, নাড়ির বেগ ও দ্রুততা হ্রাসার্থ, অবৈধানিক হৃতকম্পে এবং যক্ষ্মা রোগে।

(৪র্থ)

লাটিন।		ইংরাজী।
লোবিলিয়া।	... ...	লোবিলিয়া।

লোবিলিয়া ইনফ্লেটা নামক পুষ্পিত বৃক্ষ।

[মাত্রা ২—৫ গ্রেন।]

অধিক মাত্রায় বমনকারক।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় অবসাদক, আক্ষেপনিবারক, স্বেদজনক, কফনিঃসারক, অধিকমাত্রায় বমনকারক ও বিরেচক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা লোবিলিয়া ...	১০—৩০ মিনিম। বমনার্থ ১—২ ড্রাম।
২। " " ইথিরিয়া ...	১০—৬০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। শ্বাসকাস, ব্রঙ্কাইটিস্, হুপিংকফ, এবং ল্যারিঞ্জিসমাস রোগে।

মাস্তিষ্ক অবসাদক ঔষধ সকল যথা,——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। একষ্ট্রাক্টম্ কোনিয়াই	২—১০ গ্রেন।
২। " ল্যাক্‌টিউসি	৫—১৫ গ্রেন।
৩। টিংচ্যুরা কোনিয়াই	১০—৬০ মিনিম।
৪। " ক্লোরকর্ম্মাই কম্পজিটা।	১০—৬০ মিনিম।
৫। ভেপর এসিডাই হাইড্রোসিয়েনিসাই	ধূম গ্রহণার্থ ব্যবহৃত হয়।
৬। " কোনিয়াই	ধূম গ্রহণার্থ ব্যবহৃত হয়।
৭। একোয়া ক্লোরকর্ম্মাই	||০—২ আউন্স।
৮। " ক্যাম্ফোসিরেসাই ..	১০—৩০ মিনিম।
৯। ক্লোরফর্ম্ম্	১—১০ মিনিম।
১০। ক্লোরল্ হাইড্রাস্	১০—৩০ গ্রেন।
১১। কোমারম্	২—১০ গ্রেন।

১২। ক্যাটেপ্লাজমা কোনিয়াই ... } বাহ্য প্রয়োগার্থ
১৩। লিনিমেণ্টম্ ক্লোরফর্ম্মাই ... } ব্যবহৃত হয়।
১৪। স্পিরিটস্ ক্লোরফর্ম্মাই ... ... ১০—৩০ মিনিম।
১৫। সক্কস্ কোনিয়াই ... ... } ॥০—২ ড্রাম।
১৬। সিরপস্ ক্লোরেল্ ... ... }
১৭। এসিডম্ হাইড্রসিয়েনিকম্ ডাইল্যুটম্ ... } ২—৬ মিনিম।
১৮। ক্রোটন ক্লোরেল হাইড্রেট ... ১—৩ গ্রেন।
১৯। ল্যাক্টিউকা ... ... ৫—৩০ গ্রেন।
২০। ল'রোসিরেসাই ফোলিয়া ... ... ৪—৮ গ্রেন।
২১। পাইলুলা কোনিয়াই কম্পজিটা ... ৫—১০ গ্রেন।

মস্তিষ্ক অবসাদক ঔষধ
সকলের বিবরণ।
(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
এসিডম্ হাইড্রোসিয়ানিকম্। হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।
পীচ, বাদাম, চেরি প্রভৃতি উদ্ভিজ্জে এই পদার্থ পাওয়া যায়। নির্জ্জলাবস্থায় অতি উৎকট অবসাদক সে জন্য ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় না, ইহার প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়।
ক্রিয়া। মস্তিষ্ক অবসাদক, আক্ষেপ নিবারক, বমন নিবারক, অধিকমাত্রায় বিষক্রিয়া করে।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। এসিডম্ হাইড্রোসিয়োনিকম্ ডাইল্যুটম্ } ... ২—৬ মিনিম।
২। ভেপর্ এসিডাই হাইড্রোসিয়োনিসাই } ধুম গ্রহণার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। শ্বাসকাশ, হিক্কা, হুপিংকফ, ব্রঙ্কাইটিস, ক্ষয়কাশ, গর্ভাবস্থায় ও বিসূচিকা রোগের বমন নিবারণার্থ, অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস, রক্তোৎকাশ, পুরাতন পাকাশয়

প্রদাহ, বুক জ্বালা, পাকাশয় শূল, পাইরোসিস, গাউট, বাত, ধনুষ্টঙ্কার, অজীর্ণ, ইম্পেটাইগো, একজীমা, প্রুরাইগো, লাইকেন, এবং গ্যাষ্ট্রোডিনিয়া প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

(২য়)

লাটিন।	ইংরাজী।
ক্লোরোফর্ম্মম	ক্লোরোফর্ম্ম।

মাত্রা ১—১০ মিনিম।

ক্রিয়া। মস্তিষ্ক অবসাদক, আক্ষেপ নিবারক, মাদক, উত্তেজক, বেদনা নিবারক, স্পর্শ হারক, স্থানিক উগ্রতা সাধক ও চৈতন্য হারক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা ক্লোরফর্ম্মাই কম্পাজিটা ...	১০—৬০ মিনিম।
২। স্পিরিটস্ ক্লোরফর্ম্মাই	২০—৬০ মিনিম।
৩। ক্লোরফর্ম্ম ক্যাম্ফরেটম্	১—৫ মিনিম।
৪। একোয়া ক্লোরফর্ম্মাই	$\frac{১}{২}$—২ আউন্স।
৫। লিনিমেণ্টম্ ক্লোরফর্ম্মাই	(বাহ্য প্রয়োগার্থ)

আময়িক প্রয়োগ। ক্যানসর্, কোরিয়া, অ্যাজমা, হিষ্টিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, হিক্কা, কষ্টরজঃ, ক্ষীণতা, বমন, বিসূচিকা, দদ্রু, পাঁচড়া, দন্তক্ষত, প্রসব বেদনা ও অস্ত্রক্রিয়ার বেদনা নিবারণার্থ, মৃগী, বিবিধ স্নায়ুশূল রোগ, লিঙ্গনালাক্ষেপ, মলদ্বারে ক্ষত, এবং বিবিধ আক্ষেপ ও বেদনা জনক রোগে।

(৩য়)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ক্লোরেল হাইড্রাস্	হাইড্রেট্ অব্ ক্লোরেল।

মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় উগ্রতা নিবারক, নিদ্রা কারক, বেদনা হারক, আক্ষেপ নিবারক, বমন নিবারক, অধিক মাত্রায় চৈতন্য হারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। সিরপস্ ক্লোরেল ... ... ॥০—২ ড্রাম।

২। সপোজিটোরিয়া ক্লোরেল ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ)

আময়িক প্রয়োগ। উন্মাদ, সূতিকোন্মাদ, মদাত্যয়, বিবিধ আক্ষেপ জনক ও বেদনা জনক রোগে, ক্যান্সার, বালকদিগের শয্যামূত্ররোগ, অনিদ্রা, অস্থিরতা, ও স্নায়বীয় উগ্রতা নিবারণার্থ, হুপিংকফ, ধনুষ্টঙ্কার, কোরিয়া, শ্বাসকৃচ্ছ, হিক্কা ও বমন নিবারণার্থ, যক্ষ্মা রোগের অতিঘর্ম্ম ও অস্থিরতা নিবারণার্থ ব্যবহার্য্য।

(৪র্থ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কোনায়ম্ ... ... হেমেলক।

কোনায়ম্ ম্যাকুলেটম্ নামক বৃক্ষের সরস এবং শুষ্ক পত্র ও শাখাগ্র।

আফ্রিকা, এসিয়া, ইউরোপ, এবং মার্কিন খণ্ডে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ২—৮ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নায়বীয় অবসাদক, মাদক, আক্ষেপ নিবারক, বেদনা নিবারক, পরিবর্ত্তক, শোষক, স্থানিক স্পর্শ হারক, উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। এক্স্ট্রাক্টম্ কোনিয়াই ... ... ২—৬ গ্রেন।

২। পাইল্যুলা কোনিয়াই কম্পজিটা ... ৫—১০ গ্রেন।

৩। ভেপর কোনিয়াই ... (ধুম গ্রহণার্থ ব্যবহার্য্য)

৪। ক্যাটাপ্লাজমা কোনিয়াই ... [বাহ্য প্রয়োগার্থ।]

৫। টিংচুরা কোনিয়াই ... ... ১০—৬০ মিনিম।

৬। সক্কস কোনিয়াই ... ... $\frac{১}{২}$—১ ড্রাম।

৭। কোনিয়াই হাইড্রোব্রমাস্ ... $\frac{১}{৩}$—২ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। নিউর‍্যালজিয়া, ক্যান্‌সার্‌, রিউমেটিজম্‌, স্ক্রুফিউলা, হুপিংকফ, শ্বাসকাশ, কাশরোগ, কোরিয়া, মৃগী, ধনুষ্টঙ্কার, উন্মাদরোগ, রজোধিক, মালু্‌রিয়েলট্রেমর, প্লীহা ও গুল্ম্যাদিরোগ, ল্যুপস্‌, গোদ, বিবিধ অর্ব্বুদাদিতে, শুক্রমেহ, নিম্ফোম্যানিয়া, সেটাইরেটিস, ক্যাজেডিনিক ও ঔপদংশিক ক্ষতে।

অষ্টম অধ্যায়।

বমনকারক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	বমনকারক মাত্রা।
১। পল্‌বিস্‌ ইপিকাকুয়ানি ...	২০—৩০ গ্রেন।
২। এণ্টিমোনি পটাশিয়ো টার্ট্রাস্‌ ...	১—৩ গ্রেন।
৩। কুপ্রাই সল্‌ফাস্‌	৫—১০ গ্রেন।
৪। জিনসাই সল্‌ফাস্‌	১০—৩০ গ্রেন।
৫। সিনেপিস্‌	॥০—১ আউন্স।
৬। সোডিয়াই ক্লোরাইডম্‌	॥০—২ আউন্স।
৭। ভাইনম্‌ ইপিকাকুয়ানি ...	২—৪ ড্রাম।
৮। „ এণ্টিমোনিয়েলিস্‌ ...	২—৪ ড্রাম।
৯। ক্যান্‌থ্রিপিস্‌ কর্টেক্স্‌	॥০—১ ড্রাম।
১০। টাইলোফোরী কোলিয়া ...	২০—৩০ গ্রেন।
১১। এমোনি কার্বনাস্‌	১৫—৪০ গ্রেন।

বমনকারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ইপিকাকুয়ানা ... ... ইপিকাকুয়ানা।

সিফেলিস্ ইপিকাকুয়ানা লতার মূল।

মার্কিন খণ্ডস্থ ব্রেজিল রাজ্যে জন্মে।

মাত্রা { ২০—৩০ গ্রেন বমনকারক।
॥০—৩ গ্রেন স্বেদ জনক, কফ নিঃসারক।

ক্রিয়া। কফনিঃসারক, স্বেদ জনক, বমন কারক, বিবমিষা জনক, আক্ষেপ নিবারক, অতি অল্প মাত্রায় বমন নিবারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। ভাইনম্ ইপিকাকুয়ানি { ৫—৪০ মিঃ কফ নিঃসারক।
২—৪ ড্রাম বমন কারক।

২। ট্রোচিসাই ইপিকাকুয়ানি ... ... ১—৩ চাক্তি।

৩। „ মর্ফিএট ইপিকাকুয়ানি ... ১—৬ চাক্তি।

৪। পল্‌বিস্ ইপিকাকুয়ানি কম্পাজিটা ... ৫—১৫ গ্রেন।

৫। পাইলুলা ইপিকাকুয়ানি কম্‌সিলি ... ৫—১০ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। ক্ষয়কাশ, জ্বর, প্রাদাহিক রোগ, বাঘি, ফুসফুস্ প্রদাহ, অণ্ড প্রদাহ, পাকাশয় ও শ্বাসনালী প্রদাহ, শ্বাসকাস, হুপিংকফ, উদরাময়, অতিসার, সরদি, রক্তোৎ-কাশ, ক্রুপ, রক্তপ্রস্রাব, রক্তপ্রদর, আঘাত, মাদকদ্বারা বিষাক্ত, বোলতা ভিমরুল ও বৃশ্চিকাদির দষ্টস্থান, গাউট বাত, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, এবং রক্তবমন প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সিনেপিস্। ... ... মাষ্টার্ড।

(সর্ষপ।)

মাত্রা { ॥০ আউন্স বমনকারক।
৫—১০ গ্রেন উত্তেজক, আগ্নেয়।

ক্রিয়া। আগ্নেয়, উত্তেজক, বমনকারক, মূত্রকারক, বাহ্য-প্রয়োগে ফোস্কাকারক, দাহক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। ওলিয়ম্ সিনেপিস্	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
২। কাটাপ্লাজ্মা সিনেপিস্	
৩। লিনিমেণ্টম্ সিনেপিস্ কম্পজিটম্ ...	
৪। চার্টা সিনেপিস্	

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, অ্যাপোপ্লেক্সি, মাদক দ্বারা বিষাক্ত হইলে, মস্তিষ্কিয় রোগ, ব্রঙ্কাইটিস্, পক্ষাঘাত, প্লুরাইটিস্, হিষ্টিরিয়া জনিত বেদনা, টাইফস্ ও বিসূচিকা রোগের অবসন্নাবস্থায়, ক্যাটার, নিউর‍্যালজিয়া, কলিক, শোথ, আক্ষেপ, লেরিঞ্জাইটিস্ এবং যান্ত্রিক রক্তাধিক্য রোগে।



নবম অধ্যায়।

পরিবর্ত্তক ঔষধ সকল যথা—

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। এসিডম্ আর্শেনিয়োশম্ ...	$\frac{১}{৬০}$—$\frac{১}{১২}$ গ্রেন।

২। এসিডম্ সলফিউরোসম্ … … ||০—২ ড্রাম।
৩। এণ্টিমোনিয়ম্ সলফিউরেটম্ … … ১—৫ গ্রেন।
৪। ,, টার্টারেটম্ { $\frac{১}{১৬}$—$\frac{১}{৬}$ গ্রেন ঘর্ম্মকারক। ১—২ গ্রেন বমনকারক।
৫। এণ্টিমোনিয়াই অক্সাইডম্ … … ১—৪ গ্রেন।
৬। এক্স্ট্রাক্টম্ সার্জি লিকুইডম্ … ২—৪ ড্রাম।
৭। এমোনি ব্রোমাইডম্ … … … ২—২০ গ্রেন।
৮। ,, ক্লোরাইডম্ … … ৫—২০ গ্রেন।
৯। লাইকর্ আর্সেনিকেলিস্ … … ২—১০ মিনিম।
১০। ,, আর্সেনিসাই হাইড্রোক্লোরিকস্ … ২—৮ মিনিম।
১১। ,, সোডি আর্সেনাইটিস্ … ৫—১০ মিনিম।
১২। ,, ,, ক্লোরেটি … ১০—৩০ মিনিম।
১৩। ,, বেরিয়াই ক্লোরাইডাই … ৫—১০ মিনিম।
১৪। ,, ক্যালসিস্ ক্লোরেটিস্ … ১০—৬০ মিনিম।
১৫। ,, হাইড্রার্জিরাই পর্ক্লোরিডাই… ||০—২ ড্রাম।
১৬। ,, ,, নাইট্রেটিস্ এসিডাস্ … (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)
১৭। ,, আর্সেনিসাই হাইড্রার্জিরাই হাইড্রিয়োডেটিশ ১০—৩০ মিনিম।
১৮। টিংচুরা কলচিসাই সেমিনা … ১০—৩০ মিনিম।
১৯। ,, আইওডিন … … ৫—৩০ মিনিম।
২০। ,, গোয়েসাই এমোনিয়েটা … ||০—১ ড্রাম।
২১। হাইড্রার্জিরাই পর্ক্লোরাইডম্ … $\frac{১}{১৬}$—$\frac{১}{৮}$ গ্রেন।
২২। ,, অক্সাইডম্ রুব্রম্ $\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন।
২৩। ,, কমক্রেটা … … ২—৫ গ্রেন।

২৪। হাইড্রার্জিরাই আইয়োডাইডম্ রুব্রম্ $\frac{১}{১৬}$—$\frac{১}{৮}$ গ্রেন।
২৫। „ „ বিরিডি ... ১—৩ গ্রেন।
২৬। „ সব্ ক্লোরাইডম্ ... $\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন।
২৭। পটাসি ক্লোরাস্ ... ... ৫—২০ গ্রেন।
২৮। „ সলফিরেটা ... ... ২—৮ গ্রেন।
২৯। „ আইওডাইডম্ ... ... ২—১০ গ্রেন।
৩০। „ ব্রোমাইডম্ ... ... ৫—৩০ গ্রেন।
৩১। ফেরি আইওডাইডম্ ... ... ১—৫ গ্রেন।
৩২। „ আর্সেনিয়াস্ ... ... $\frac{১}{১৬}$—$\frac{১}{২}$ গ্রেন।
৩৩। পাইল্যুলা হাইড্রার্জিরাই ... ... ২—৫ গ্রেন।
৩৪। „ ফেরি আইওডিডাই ... ৫—১০ গ্রেন।
৩৫। „ কেলোমেলেনস্ কম্পজিটা ২—১০ গ্রেন।
৩৬। ডিকক্টম সার্জি ... ... } ২—১০ আউন্স।
৩৭। „ „ কম্পজিটম্ ... }
৩৮। „ হেমিডেসমাই ... ... ১—৪ আউন্স।
৩৯। সোডিয়াই ক্লোরাইডম্ ... ... ২০—৬০ গ্রেন।
৪০। „ হাইপো সলফিস্ .. ১০—৩০ গ্রেন।
৪১। „ হাইপো ফস্ফাস্ ... ৫—১০ গ্রেন।
৪২। ট্রোচিসাই পটাসি ক্লোরেটিস্ ... ১—৬ চাক্তি।
৪৩। ভাইনম্ এণ্টিমোনিয়েলিস্ ... ৫—৩০ মিনিম।
৪৪ পলবিস্ এণ্টিমোনিয়েলিস্ ... ৩—১০ গ্রেন।
৪৫। সিরপ ফেরি আইওডিডাই ... ... } ১ ড্রাম।
৪৬। „ হেমিডেসমাই ... ... }
৪৭। ওলিয়ম মর্হুই ... ... ১—৮ ড্রাম।
৪৮। ব্রোমোহাইড্রিক্ এসিড্ ... ... ||০—১ ড্রাম।
৪৯। ক্যালসিয়াই ক্লোরাইডম্ ... ... ৫— ১৫ গ্রেন।

৫০। বেরিয়াই ক্লোরাইডম্ ... ... ১—২ গ্রেন।

৫১। সলফিউরিস আইওডাইডম্ ... $\frac{১}{২}$—৫ গ্রেন।

৫২। সাল্‌ফার্ ... ... ২০—৬০ গ্রেন।

৫৩। ক্যালসিস্ হাইপোফস্ফাস্ ... ৫—১০ গ্রেন।

৫৪। ভাইনম্ কলচিসাই ... ... ১০—৩০ মিনিম।

৫৫। মিশ্চুরা গোয়েসাই ... ... ॥০—২ আউন্স।

৫৬। আইডোফর্ম ... ... ১—৩ গ্রেন।

৫৭। আইওডিন্ ... ... $\frac{১}{৪}$—$\frac{১}{২}$ গ্রেন।

৫৮। কল্‌চিকম্ .. .. ২—৫ গ্রেন।

৫৯। ইনফিউজম ডল্কামারা ... ... ১—২ আউন্স।

৬০। হাইড্রোকোটাই এসিয়াটিকা ... ... ৮ গ্রেন।

৬১। কনফেক্‌শিও সলফিউরিস্ ... ...॥০—২ ড্রাম।

(বাহ্য প্রয়োগার্থ)

৬২। ভেপর ক্লোরাই, ভেপর আইওডাই, লিনিমেণ্টম পটাসি আইওডিডাই কমসেপনি, লিনিমেণ্টম হাইড্রাজির্রাই, লিনিমেণ্টম আইওডিন, অঙ্গুয়েণ্টম সলফিউরিস আইওডিডাই, অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজির্রাই, অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজির্রাই এমোনিয়েটা, অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজির্রাই আইওডিডাই রুব্রাই, অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজির্রাই নাইট্রেটিস, অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রাজির্রাই অক্সাইডাই রুব্রাই, অঙ্গুয়েণ্টম আইওডিডাই কম্পজিটা, অঙ্গুয়েণ্টম সলফিউরিস, অঙ্গুয়েণ্টম পটাসি সলফিউরেটা, অঙ্গুয়েণ্টম গাইনোকর্ডাই, এমপ্লাস্ট্রম হাইড্রাজির্রাই, এমপ্লাস্ট্রম এমোনায়েসাইকম্ হাইড্রাজির্রাই, সপোজিটোরিয়া হাইড্রাজির্রাই। (৭৯)

পরিবর্ত্তক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
এসিডম্ আর্সেনিয়োসম্	আর্সেনিক্ এসিড্।

[সিম্বুলক্ষার। শেঁকো।]

কোবাল্ট, নিকেল, এবং লৌহ সহযোগে খনি মধ্যে পাওয়া যায়।

মাত্রা $\frac{১}{৬০}$ হইতে $\frac{১}{১২}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। পর্য্যায় নিবারক, বল কারক, পরিবর্ত্তক।
অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে।
স্থানিক প্রয়োগে পচন নিবারক, দাহক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। লাইকর আর্সেনিকেলিস ..	২—১০ মিনিম।
২। .. আর্সেনিস'ই হাইড্রোক্লোরিকস্	২—৮মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। পালাজ্বর, হেমিক্রেনিয়া, সপর্য্যায় উন্মাদ ও সপর্য্যায় রোগ, স্নায়ুশূল, বিবিধ চর্ম্মরোগ যথা—ল্যুপস্, সোরায়েসিস, পিটিরায়েসিস, ইম্পেটাইগো, একজিমা, একনি, কুষ্ট, সাইকোসিস, পুরাতন বাত, কোরিয়া, মৃগী, ফেগ্মেসিয়া, পচাক্ষতে, দন্তক্ষত, ক্যান্সর, কুরন্ড, গোদ, সর্পাঘাত।

[২য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
সোডি আর্সেনিয়াস্।	আর্সেনিয়েট অব্ সোডা।

মাত্রা $\frac{১}{১৬}$ $\frac{১}{৮}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। লাইকর্ সোডি আর্সেনাইটিস ...	৫—১০ মিনিম।

আময়িক প্রয়োগ। আর্সেনিয়াস এসিডের ন্যায়।

[৩য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
আর্সেনিসাই আইওডাইডম্। ...	... আইওডাইড্ অব্ আর্সেনিক্।

মাত্রা। $\frac{১}{১২}$ হইতে $\frac{১}{৩}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ। লেপ্রা, সোরোয়েসিস, ইম্পিটাইগো, ল্যুপস, এক্জিডেন্স প্রভৃতি চর্ম্মরোগ এবং ক্যান্সর রোগে।

[৪র্থ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
লাইকর আর্সেনিসাই হাইড্রা-র্জিরাই হাইড্রিয়োডেটিস	সোল্যসন অব আইওডাইড্ অব্ আর্সেনিক্ এণ্ড মর্কুরি

মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ পুরাতন চর্ম্মরোগ।

(৫ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
এমোনিয়াই ব্রোমাইডম্। ...	ব্রোমাইড্ অব্ এমোনিয়া।

মাত্রা ২ হইতে ২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, শোষক, এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উগ্রতা-হারক।

আময়িক প্রয়োগ। মৃগী, হুপিং কফ এবং তরুণবাত রোগে।

[৬ষ্ঠ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
পটাশিয়াই ব্রোমাইডম্।	ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়ম্।

মাত্রা ৫—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। পোষক, উত্তেজক, পরিবর্ত্তক, স্নায়বীয় অবসাদক, স্রাবণ ক্রিয়া বর্দ্ধক।

আময়িক প্রয়োগ। মৃগী, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, সূতিকাক্ষেপ, উন্মাদ, মদাতঙ্ক, মূর্চ্ছা, ফুসফুস প্রদাহে, বাত, বিবিধজ্বর, বিসূচিকা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, স্ক্রফিউলা, প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্দ্ধন, গলগণ্ড, এজ্‌মা, ক্রুপ, হুপিংকফ, রজোধিক, ঔপদংশিক চর্ম্মরোগ, শুক্রমেহ, প্রমেহ, মধুমেহ, অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ বীর্য্যপাতন, এবং জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ বিকারে।

[৭ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সোডিয়াই ক্লোরাইডম্। ক্লোরাইড্ অব্ সোডিয়ম্।

[সামান্য লবন)

মাত্রা। { ২০—৬০ গ্রেন পরিবর্ত্তক, বলকারক। ||০—২ আউন্স বিরেচক, বমনকারক।

ক্রিয়া। অল্প মাত্রায় আগ্নেয়, বলকারক, পরিবর্ত্তক, অধিক মাত্রায় বমন কারক, বিরেচক, কৃমিনাশক।

আময়িক প্রয়োগ। বিসূচিকা, রক্তোৎকাশ, কৃমি, পুরাতন উদরাময়, যক্ষ্মা, স্ক্রফিউলা, বিবিধ জ্বর, নাইট্রেট অব্ সিলভার দ্বারা বিষাক্ত হইলে, গুহ্য এবং জরায়ু আদির মধ্যে জলৌকা প্রবিষ্ট হইলে।

[৮ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এমোনিয়াই ক্লোরাইডম্ . . ক্লোরাইড্ অব্ এমোনিয়ম্

(নিসাদল)

মাত্রা ৫ হইতে ২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। শোষক, পরিবর্ত্তক, কফনিঃসারক, রজোনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক।

আময়িক প্রয়োগ। পেশীশূল, বিবিধ স্নায়ুশূল, যকৃত ও প্লীহা বিবর্দ্ধন, আঘাত লাগিয়া কোন স্থান থেৎলাইয়া গেলে, ফোড়া ও বাঘি ইত্যাদি বসাইবার নিমিত্ত, জল

গোমের পীড়ায়, রক্তোৎকাশ, রক্ত বমন, স্তনপ্রদাহ, বিবিধ জ্বর ও প্রদাহ রোগে।

[৯ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাশি ক্লোরাস্। ... ... ক্লোরেট্ অব্ পটাশ।

৫ হইতে ৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। শৈত্যকারক, মূত্রকারক, পরিবর্ত্তক।

প্রয়োগরূপ ... ... মা

ট্রোচিসাই পটাশি ক্লোরেটিস ... ... ১—৬ ট

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধজ্বর, বিসূচিকা, বাত, বি ধ মূত্রাশয় প্রদাহ, ইরিসিপেলাস, মূত্রাশয়ের কা উপদংশরোগের দ্বিতীয় অবস্থায়, পারদদ্বারা মু

(১০ম)

ল্যাটিন।

হাইড্রার্জাইরম ... ...

(পারদ)

এই ধাতু খনি মধ্যে গন্ধকসহযোগে বাইসল্‌ফিউরেট্ অব্ মর্কুরিরূপে পাওয়া যায়।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, বিরেচক, পিত্তনিঃসারক, শোষক, দাহক মূত্রকারক, কৃমিনাশক, অবসাদক, প্রদাহ নাশক, লালনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক।

প্রয়োগরূপ।	মাত্রা।
১। পাইল্যুলা হাইড্রার্জিরাই	২—৫ গ্রেন।
২। হাইড্রার্জিরাই কমক্রিটা	৩—৮ গ্রেন।
৩। এমপ্লাষ্ট্রম হাইড্রার্জিরাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
৪। „ এমোনিয়েসাই কম্ হাইড্রার্জিরাই	
৫। সপোজিটোরিয়া হাইড্রার্জিরাই	
৬। লিনিমেণ্টম হাইড্রার্জিরাই ...	
৭। অঙ্গুয়েণ্টম হাইড্রার্জিরাই	
৮। „ „ কম্পজিটা	

আময়িক প্রয়োগ। সিফিলিস, অজীর্ণ ইণ্টাস্ সসেপ্সন, কোষ্টবদ্ধ, পক্ষাঘাত, ধনুষ্টঙ্কার, মেনিয়া, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, হেমিপ্লিজিয়া, শিরঃশূল, বিসূচিকা; অতিসার, ফ্যাজিডিনিক, ক্ষত, একিউট রিউমেটিজম, গাউট, ইডিওপেথিক ও ইও-লোকিবার, সিরস মেম্ব্রেনের প্রদাহ ও যকৃতের ব্যাধিবশতঃ ড্রপসিরোগ, পেরি কার্ডাইটীস ও এণ্ডোকার্ডাইটিস, এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রদিগের রক্তাধিক্য রোগে।

নিষেধ। দৌর্ব্বল্য ও নিরক্তাবস্থায়, গ্লীট, প্লীহা রোগ, স্কার্ভি রোগ, ব্রাইটাময়, থাইসিস, ইরিথিমা, স্ক্রফিউলা এবং গ্র্যানিউলার ডিজেনারেসন্ অবদি কিড্নি রোগ।

(১১শ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
হাইড্রার্জাইরম অক্সাইডম রুব্রম।	রেড অক্সাইড অব-মর্কারি।

(আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।)

ক্রিয়া। দাহক, পরিবর্ত্তক, উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। অঙ্গুয়েণ্টম্ হাইড্রার্জিরাই অক্সাইডাই রুব্রাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। ইনডোলেণ্ট ও ফঙ্গাস্ অলসার, অপ-থ্যালমিয়া, শ্যাঙ্কার প্রভৃতি রোগে।

(১২শ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
হাইড্রার্জারাইরম্ সব্ ক্লোরাইডম্ ...	সব ক্লোরাইড অব মর্কারি

মাত্রা।
- $\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক।
- ২—৫ গ্রেন বিরেচক।
- ২০—৩০ গ্রেন অবসাদক।

ক্রিয়া। বিরেচক, পিত্তনিঃসারক ক্রিমিনাশক, প্রত্যুগ্রতাসাধক, মূত্রকারক, অবসাদক, দাহক, ঘর্ম্মকারক, উপদংশ নাশক, পরিবর্ত্তক, লালনিঃসারক।

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ হাইড্রাজির্রাই সব ক্লোরিডাই
২। লোসিয়া হাইড্রার্জির্রাই নাইগ্রা
} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। কোষ্টবদ্ধ, শোথ, অজীর্ণ, উপদংশ রোগ, অ্যাপোপ্লেক্সি, পচাক্ষত, পাণ্ডু রোগ, রিউমেটিজম্, ইয়োলোফিবার, বিসূচিকা, অতিসার, প্লুরাইটিস, ক্রুপ, হিপেটাইটিস্, লেরিঞ্জাইটিস, এণ্টেরাইটিস, পোরাইগো, ইম্পেটাইগো, হার্পিজ, একজীমা প্রভৃতি রোগে।

(১৩শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
হাইড্রার্জির্রাই পর্ক্লোরাইডম্। পর্ক্লোরাইড্ অব্ মর্কুরি।

(রসকর্পূর)

মাত্রা $\frac{১}{১৬}$ হইতে $\frac{১}{৮}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, লালনিঃসারক, উপদংশ নাশক, ঘর্ম্মকারক, উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। লাইকর্ হাইড্রার্জির্রাই পর্ক্লোরিডাই ॥০—২ ড্রাম।
২। লোসিয়া হাইড্রার্জির্রাই ফ্লেবা (বাহ্য প্রয়োগার্থ)

আময়িক প্রয়োগ। কুষ্টরোগ, সোরায়েসিস্, পোরাইগো, পিটিরায়েসিস্, ঔপদংশিকব্যাধি, পাঁচড়া, ফঙ্গাস, নখক্ষত, গলদেশক্ষত, মেসেণ্ট্রিক্ ব্যাধি, শোথ, গ্লীট, টনসিলাইটিস, ক্রনিক রিউমেটিজম্ প্রভৃতি রোগে।

(১৪শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

হাইড্রার্জ্জাইরম্ এমোনায়েটম্। ... অ্যামোনায়েটেড্ অব্ মর্কুারি।

(আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।)

ক্রিয়া। দাহক, পরিবর্ত্তক।

প্রয়োগরূপ .. .. মাত্রা।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ হাইড্রার্জ্জিরাই এমোনিয়েটা (বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। পোরাইগো, পাঁচড়া, একনি, হার্পিজ, ইম্পিটাইগো, লাইকেন, অপথ্যালমিয়া টার্সাই, কেশকীট বিনাশার্থ।

(১৫শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

হাইড্রার্জ্জিরাই আইয়োডাইডম্ রুব্রম্ রেড্ আইওডাইড্ অব্ মর্কুারি।

মাত্রা $\frac{১}{২০}$ হইতে $\frac{১}{৮}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। করোসিব সব্লিমেটের ন্যায়। তদ্ভিন্ন দাহক, শোষক, অধিক মাত্রায় প্রাদাহিক বিষ ক্রিয়া করে।

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ হাইড্রার্জ্জিরাই আইওডিডাই রুব্রাই বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। স্ক্রফিউলা, উপদংশ, ল্যুপস, চক্ষুর কোনে দুষ্টক্ষত হইলে, গোদ, গাইটফোলা, গলগণ্ড, প্লীহা ও যকৃৎ বিবর্দ্ধন, পেরিয়ষ্টিয়েল নোড্স, অপথ্যালমিয়া টার্সাই, এবং কর্ণিয়ার অসচ্ছতা হইলে।

(১৬শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

লাইকর হাইড্রার্জ্জিরাই নাইট্রেটিস্ এসিডাস্ অ্যাসিড সোল্যুসন অব্ নাইট্রেট্ অব্ মর্কুারি

(আভ্যন্তরিক ব্যবহৃত হয় না।)

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, তীক্ষ্ণ দাহক।

প্রয়োগরূপ।	মাত্রা।
১। অঙ্গুয়েণ্টম্ হাইড্রার্জিরাই নাইট্রেটিস্	(বাহ্য প্রয়োগার্থ।)

আময়িক প্রয়োগ। দুষ্টক্ষত, টুবর্কেল, ল্যুপস্, ক্যানসর উপদংশিক ক্ষত, জরায়ু স্কন্ধক্ষত, পোরাইগো, অপথ্যালমিয়া টার্সাই, দুষ্টক্ষত, সোরায়েসিস্, কুষ্ট, পোরাইগো, কার্ব্বঙ্কেল, হার্পিজ এক্জিডেন্স এবং কণ্ডিলোমা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

(১৭শ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
আইওডম্	আইওডিন্।

মাত্রা $\frac{১}{৪}$ হইতে $\frac{১}{২}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, শোষক, বলকারক, পিত্ত নিঃসারক, রজোনিঃসারক, লালনিঃসারক।

বাহ্য প্রযোগে প্রত্যুগ্রতাসাধক, এবং দাহক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা আইওডাই	৫—৩০ মিনিম
২। লাইকর্ আইওডাই	৫—১০ মিনিম
৩। অঙ্গুয়েণ্টম্ আইওডাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
৪। ভেপর্ আইওডাই	
৫। লিনিমেণ্টম্ আইওডাই	
৬। কলোডিয়ম্ আইওডাই	
৭। গ্লাইসরাইনম্ আইওডাই	

আময়িক প্রয়োগ। ভগন্দর, পুরাতন স্বরভঙ্গ, বাত, গাউট, জলদোষের পীড়ায়, ইরিসিপেলাস্, রজোধিক, কেবস্ ও ল্যুপস প্রভৃতি চর্ম্মরোগ, পোরাইগো, ইম্পিটাইগো,

পিটিরায়েসিস, সোরায়েসিস, পচাক্ষত, ক্যান্সরক্ষত, নখক্ষত, ফ্যাজেডিনিক্ ক্ষত, জরায়ুমুখেক্ষত, কোরিয়া, প্যারালিসিস্, ক্রুপ, ডিপথিরিয়া, ফুসফুস, ফুস ফসাবরণ, শ্বাসনালী, সন্ধি, প্লীহা, যকৃৎ, জরায়ু, অংশয়, মেসেন্টেরিক্, প্যারোটিড্, প্রষ্টেট্ ও লিম্ফেটিক্ গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, স্ক্রফিউলা, উপদংশ, টুবকুলোসিস্, যক্ষ্মা, টেবিজ, মেসেন্টেরিকা, স্ক্রফিউলা জনিত চক্ষুপ্রদাহ, গণ্ডমালা, কনীনিকাপ্রদাহ, কার্ব্বঙ্কল ও সন্ধ্যুদরি ইত্যাদি রোগে।

(১৮শ)

ল্যাটিন ইংরাজী।

পটাশিয়াই আইওডাইডম্। আইওডাইড্ অব্ পটাসিয়ম।

মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। ঘর্ম্মকারক, পরিবর্ত্তক, পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক, লালনিঃসারক, শোষক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ পটাসি আইওডাই .. } বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
২। লিনিমেণ্টম্ পটাসিয়াই আইও-... }
ডিডাই কম্‌পোজিটম্ ... }

আময়িক প্রয়োগ। বাত, উপদংশ, অ্যাজমা, পাঁচড়া, মার্ক্যুরিয়েলট্রেমর, সীসশূল, সীসপক্ষাঘাত, স্ক্রফিউলা, প্রমেহ, গাউট, সীস এবং পারদ শরীরে বিষাক্ত হইলে, আঁচিল, স্ক্রফিউলাস অপথ্যালমিয়া, ক্রনিকহিপেটাইটিস্, পেরিয়ষ্টাইটিস্, নিউমোনিয়া, প্লুরাইটিস্ পেরিকার্ডাইটিস্, অ্যাজমা, পল্‌মোনারি ইম্ফিজিমা, এবং কুষ্ঠরোগ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

(১৯শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

আইডোফর্ম্মম ... ... আইডোফর্ম্ম।

মাত্রা $\frac{১}{২}$ হইতে ৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, পরিবর্ত্তক, বলকারক, স্পর্শহারক, স্থানিক উগ্রতাসাধক।

(প্রায় আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না)

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। অঙ্গুয়েন্টম্ আইডোফর্ম্মাই ...
২। ,, ,, রোসেটম্ ...
৩। কলোডিয়ম্ আইডোফর্ম্মাই ...
৪। সপোজিটোরিয়ম্ আইডোফর্ম্মাই

} বাহ্য প্রয়োগার্থ বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়।

৫। পাইল্যুলা আইডোফর্ম্মাই ... ... ১—২ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। ঔপদংশিকক্ষত, মস্তকের দদ্রুরোগ, ক্লোয়াজম্, ওজিনা, প্রুরিগো, স্নায়ুশূল, স্ক্রফিউলা, রিকেটস্, উপদংশ, গলগণ্ড, লুপসরভঃ, দুর্দ্দম চর্ম্মরোগ, প্রষ্টেট গ্রন্থির বিবর্দ্ধন, ডিপ্থিরিয়া ও ক্যান্সার ক্ষত এবং অন্যান্য বিবিধ ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

(২০শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সল্ফর ... ... সল্ফর।

(গন্ধক)

ইহা খনিমধ্যে এবং আগ্নেয়গিরি প্রদেশস্থ মৃত্তিকাতে পাওয়া যায়।

মাত্রা { ৩০—৬০ গ্রেন পরিবর্ত্তক, ঘর্ম্মকারক।
১—৪ ড্রাম বিরেচক।

ক্রিয়া। শোষক, ঘর্ম্মকারক, পরিবর্ত্তক, কফনিঃসারক, উত্তেজক, অধিক মাত্রায় বিরেচক, স্থানিক প্রয়োগে উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। অঙ্গুয়েন্টম্ সল্ফিউরিস ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ)

২। কনফেক্‌শিও সল্‌ফিউরিস ... ... ১—২ ড্রাম

আময়িক প্রয়োগ। অর্শ, গাউট, রিউমেটিজম্‌, ব্লেফ' ইটিস, ক্রনিকব্রঙ্কাইটিস্‌, পাঁচড়া, প্রুরাইগো, ইম্পেটি ইগো, একনি, দদ্রু, পিটিরায়েসিস, কোষ্টবদ্ধ, উদরাময় পারদ ঘটিত পক্ষাঘাত, মুখ আসিলে, সীস দ্বারা বিষাক্ত হইলে, ষ্ট্রিক্‌চার অব্‌দি রেকটম্‌ এবং প্রল্যাপসাস এনা প্রভৃতি রোগে।

(২১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসি সলফিউরেটা। সলফিউরেটেড পটাস

মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। ঘর্ম্মকারক, উত্তেজক, পরিবর্ত্তক, কফনিঃসারক পিত্তনিঃসারক, পচননিবারক, ডিটার্জেণ্ট, অধিক মাত্রা বিরেচক, অবসাদক, বমনকারক এবং প্রাদাহিক বি ক্রিয়া করে।

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম পটাসি সল্‌ফিউরেটা } বাহ্য প্রয়োগা
২। লিনিমেণ্টম্‌ পটাসি সলফিউরেটা } ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। ক্যাঠার, টিনিয়া ক্যাপিটিস, সীস' আর্সেনিকদ্বারা বিষাক্ত হইলে, ইম্পেটাইগো, এক্‌জীম উদরাময়. প্রুরাইগো, ক্রনিক হিপেটাইসিস্‌ ও ক্রনিঃ ল্যারিঞ্জাইটীস্‌ রোগে।

(২২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যালসিস্‌ হাইপোফস্ফাস। হাইপোফস্ফেট্‌ অব্‌ লাইম

মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বলকারক, পরিবর্ত্তক, উত্তেজক,।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। সিরপ্‌ফেরি হাইপোফস্ফেটিস্‌ ... ...॥০—১ ড্রাম

২। সিরপ্ হাইপোফস্ফেট্ অব্ লাইম্ ... ১—৪ ড্রাম।
৩। লাইকর্ ফেরি হাইপোফস্ফাস্ কম্পজিটম্ ১—২ ড্রাম।
আময়িক প্রয়োগ। যক্ষ্মা, দৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, ক্লোরোসিস, নিরক্তাবস্থায়, এবং স্রাবণ গ্রন্থির রোগে।

[উদ্ভিদ পরিবর্ত্তক।]

[২৩শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
কল্চিকম্। ... ... কল্চিকম।

চূর্ণ মাত্রা ২ হইতে ৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। অল্প মাত্রায় পরিবর্ত্তক, বেদনানিবারক, স্বেদজনক, অবসাদক, মূত্রকারক অধিকমাত্রায় বিরেচক, বমনকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা কল্চিসাই ... ... } ১০—৩০ মিনিম।
২। ভাইনম্ কল্চিসাই ... ... }
৩। একষ্ট্রাক্টম্ কল্চিসাই ... ... } $\frac{১}{২}$—২ গ্রেন।
৪। ,, ,, এসিটীকম্ ... }

আময়িক প্রয়োগ। গাউট, বাত, শোথ, উদরি, তরুণপ্রদাহ এবং জ্বররোগ, লেরিঞ্জাইটিশ, কোষ্টবদ্ধ, যকৃৎ প্রদাহ ও বিবৰ্দ্ধন, এবং পাণ্ডু রোগে।

(২৪শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
গোয়েসাই লিগ্নম্ এট্ রেজিনা। ... গোয়েকমউড্ এণ্ড রেজিন।

গোয়েকম্ অফিসিনেলিস্ নামক
বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং ধূনা।
মাত্রা ১০ হইতে ৫০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, পরিবর্ত্তক, রজোনিঃসারক, রুচিৎলালানিঃসারক, অধিকমাত্রায় বিরেচক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। মিক্শ্চুরা গোয়েসাই ... ... ১—২ আউন্স।
২। টিংচুরা গোয়েসাইঅ্যামোনিয়েটা ... ॥০—১ ড্রাম।
আময়িক প্রয়োগ। পুরাতন বাত রোগ, গাউট, রজো-লোপ, চর্ম্মরোগ, শ্বেতপ্রদর, টিনসিলাইটিস্, শ্বাসনালী প্রদাহ, উপদংশ এবং ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগে।

(২৫শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
হেমিডেসমস রেডিক্স ... ... হেমিডেস্মস্রুট্।

(অনন্তমূল)

ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, বলকারক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক। সার্জার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। সিরপ্ হেমিডেসমস্ ... ... ॥০—২ ড্রাম
২। ডিকক্টম্ হেমিডেসমস্ ... ... ১—৪ আউন্স।
৩। ইন্ফিউজম্ হেমিডেস্মস্ ... ১—৪ আউন্স।
আময়িক প্রয়োগ। উপদংশ, বাত, বিবিধ চর্ম্মরোগ, ও স্ক্রুফিউলা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়।

(২৬শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
সার্জি রেডিক্স। ... ... জ্যামেকা সার্জাপ্যারিলা।
ক্রিয়া। পরিবর্ত্তক, বলকারক, ঘর্ম্মকারক, কচিৎমূত্রকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। ডিকক্টম সার্জি ... ... } ১—৪ আউন্স।
২। „ „ ... ... কম্পাজিটম্ }
৩। এক্ষ্ট্রাক্টম্ সার্জিলিকুইডম্ ... ... ॥০—২।৩ ড্রাম।
আময়িক প্রয়োগ। চর্ম্মরোগ, ঔপদংশিক রোগ, সন্ধিরোগ গোদ, স্ক্রুফিউলা, পুরাতন বাত রোগ, এবং গাউট প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য।

দশম অধ্যায়।

মূত্রকারক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। লাইকর্ এমোনিয়া এসিটেটিস্ ...	১—৬ ড্রাম।
২। „ পটাসি	১০—৬০ মিনিম।
৩। „ সোডি	১০—৩০ মিনিম।
৪। অ্যামোনি বেনজোয়াস্	৫—২০ গ্রেন।
৫। „ ফস্ফাস	৫—২০ গ্রেন।
৬। „ নাইট্রাস্	২০—৪০ গ্রেন।
৭। পটাসি কার্ব্বনাস্	১০—৩০ গ্রেন।
৮। „ এসিটাস্	১০—২০ গ্রেন।
৯। „ বাইকার্ব্বনাস্	১০—২০ গ্রেন।
১০। „ নাইট্রাস	৫—২০ গ্রেন।
১১। „ সাইট্রাস্	২০—৬০ গ্রেন।
১২। „ ক্লোরাস্	৫—২০ গ্রেন।
১৩। „ টার্ট্রাস্	১—২ ড্রাম।
১৪। „ „ এসিডা	২০—৬০ গ্রেন।
১৫। সোডি অ্যাসিটাস্	২০—৬০ গ্রেন।
১৬। „ বাইকার্বনাস্	১০—৩০ গ্রেন।
১৭। „ সাইট্রোটার্ট্রাস্ একারভেসেন্স	১—২ ড্রাম।
১৮। „ এট্ পটাসিয়ো টার্ট্রাস্ ...	॥০—১ ড্রাম।
১৯। স্পিরিটস্ ইথারিস্ নাইট্রোসাই	॥০—২ ড্রাম।
২০। „ আর্ম্মোরেসি কম্পজিটম্ ...	১—২ ড্রাম।
২১। „ জুনিপরাই	॥০—১ ড্রাম।
২২। টিংচ্যুরা ডিজিটেলিস্ ...	১০—৩০ মিনিম।
২৩। „ ক্যাস্থারিডিস্	৫—২০ মিনিম।
২৪। „ সিলি	১০—৩০ মিনিম।

২৫।	টিংচ্যুরা বকু	॥০—২ ড্রাম
২৬।	ওলিয়ম জুনিপরাই	১—৫ মিনিম।
২৭।	„ সেবাইনা	১—৩ মিনিম।
২৮।	„ কিউবেবী	৫—২০ মিনিম।
২৯।	„ টেরেবিন্থিনি	৫—৩০ মিনিম।
৩০।	„ কোপেবি	৫—৩০ মিনিম।
৩১।	ডিকক্টম্ স্কোপেরিয়াই	২—৪ আউন্স।
৩২।	„ ট্যারেক সেসাই	১—২ আউন্স।
৩৩।	„ সেনেগি	
৩৪।	ডিপ্টেরোকার্পাই বালসেমোমম্	॥০—১ ড্রাম।
৩৫।	ইনফিউজম বকু	১—২ আউন্স।
৩৬।	„ সেনেগি	
৩৭।	„ ইউভিআর্সাই	
৩৮।	লিথিকার্বনাস্	৩—৬ গ্রেন।
৩৯।	„ সাইট্রাস্	৫—১০ গ্রেন।
৪০।	ডিজিটেলাইনম্	১/৬০—১/৩০ গ্রেন।
৪১।	ডিজিটেলিস্ ফোলিয়ো	১/২—১ ১/২ গ্রেন।
৪২।	„ ইনফিউজম্	২—৪ ড্রাম।
৪৩।	সিরপস্ সিলি	১—২ ড্রাম।
৪৪।	„ স্কোপেরিয়াই	
৪৫।	পেরিরি রেডিক্স	॥০—১ ড্রাম।
৪৬।	ইথর অ্যাসিটিকাস্	২০—৬০ মিনিম।
৪৭।	এক্স্ট্রাক্টম্ ট্যারেক্সেসাই ...	১০—৩০ গ্রেন।
৪৮।	পলবিস্ সিলি	১—৩ গ্রেন।

মূত্রকারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ইথর এসিটিকাস্।	অ্যাসিটিক্ ইথর।

মাত্রা ২০ হইতে ৬০ মিনিম।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, উত্তেজক,।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর এবং উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ইথর স্পিরিট্স নাইট্রোসাই। ...	স্পিরিট অব্ নাইট্রিক ইথর্

মাত্রা ১/২ হইতে ২ ড্রাম।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, উত্তেজক, আক্ষেপনিবারক, বায়ুনাশক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, সরদি, শ্বাসকাস, ড্রপসি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগে।

[৩য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
অ্যামোনি বেন্জোয়াস।	বোঞ্জোয়েট অব্ অ্যামোনিয়া।

মাত্রা ১০—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, মূত্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ। মূত্রেফস্ফেট আধিক্য হইলে, এবং মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহে।

[৪র্থ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
পটাসি অ্যাসিটাস্।	এসিটেট্ অব্ পটাস্।

মাত্রা { ২০—৬০ গ্রেন মূত্রকারক।
২ ড্রাম মাত্রায় বিরেচক।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, অম্লনাশক, অধিক মাত্রায় বিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ। লেপ্রা, সোরায়েসিস, বাতরোগ, চর্ম্মরোগ, শোথ, পাণ্ডু, বিবিধ যান্ত্রিকবিবর্দ্ধন রোগে।

[৫ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

বকু ফোলিয়া। বকুলিভস্।

(বারজমা বেটিউলিনা বৃক্ষের শুষ্কপত্র।)

চূর্ণমাত্রা ১০ হইতে ৪০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মকারক, বলকারক, বায়ু-নাশক, আগ্নেয়।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা বকু	১—২ ড্রাম।
২। ইনফিউজম্ বকু	১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। গাউট, রিউমেটিজম্, মূত্রাশয় ও মূত্র গ্রন্থিপ্রদাহ, পুরাতন প্রমেহ, ইউরিথ্রাইটিস, প্রমেহ, প্রস্রাবে লিথিক অ্যাসিডের আধিক্য হইলে, ইউরিথ্রার ষ্ট্রিক্চার হইলে।

[৬ষ্ঠ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যান্থারিস্। ক্যান্থারিডিস।

ক্যান্থারিস রেসিকেটোরিয়া নামক পতঙ্গ।

চূর্ণ মাত্রা $\frac{১}{১৬}$ হইতে $\frac{১}{২}$ গ্রেন। বটিকাকারে।

ক্রিয়া। ফোস্কাকারক, মূত্রকারক, উত্তেজক, প্রত্যুগ্রতা-সাধক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
টিংচ্যুরা ক্যান্থারিডিস্	৫—২০ মিনিম।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ ক্যান্থারিডিস্	বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
২। এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ ক্যান্থারিডিস	
৩। ,, ক্যালিফেসিয়েন্স	
৪। চার্টাএপিস্পাষ্টিকা	
৫। এসিডম্ ক্যান্থারিডিস	
৬। লাইকর্ এপিস্পাষ্টিকস্	

আময়িক প্রয়োগ। প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, শোথ, মূত্রস্তম্ভ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ, কুষ্ঠ, কামোন্মত্ততা, পোরাইগো, একজীমা, সোরায়েসিস, বাত, পক্ষাঘাত, টাকরোগ, স্নায়ুশূল, বিবিধ ক্ষত, এবং প্রদাহ রোগে।

ল্যাটিন। ইংরাজী।
কোপেবা। ... ... কোপেবা।
কোপাইফরা অফিসিনেলিস্ বৃক্ষের তৈল এবং ধুনা-যুক্ত রস।

মাত্রা ২০—৬০ মিনিম।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, উত্তেজক।
প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। ওলিয়ম কোপেবি ... ... ৫—৩০ মিনিম।
আময়িক প্রয়োগ। প্রমেহ, গ্লিট, শ্বেতপ্রদর, অর্শ, ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস, অ্যাজমা, সিষ্টাইটিস, ডিস্ইউরিয়া, এবং ইস্কিউরি প্রভৃতি রোগে।

[৮ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ডিপ্টেরোকার্পাই ব্যালসেমোমম্। গর্জ্জন বালসম-উড্ অয়াইল।

(গর্জ্জন তৈল।)

মাত্রা $\frac{১}{২}$ হইতে ১ ড্রাম।

ক্রিয়া। উত্তেজক, মূত্রকারক।
আময়িক প্রয়োগ। কোপেবার ন্যায়।

[৯ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ওলিয়ম জুনিপরাই। ... ... অইল অব্ জুনিপর।
ক্যামিউনিস নামক বৃক্ষের ফল চুয়াইয়া প্রস্তুত হয়।

মাত্রা ১—৫ মিনিম।

ক্রিয়া। উত্তেজক, মূত্রকারক, বায়ুনাশক।

প্রয়োগরূপ ... . মাত্রা।

১। স্পিরিটস্ জুনিপরাই ... ॥০—১ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, উদরি, অজীর্ণ, উদরোধ্মান, প্রভৃতি রোগে।

[১০ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সিলা। ... ... স্কুইল।

(অর্গেনিয়া সিলা নামক বৃক্ষেরকন্দ)

চূর্ণ মাত্রা ১—৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, উত্তেজক, কফনিঃসারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। টিংচুরাসিলি ... ... ১০—৩০ মিনিম।

২। অক্‌জিমেল্ সিলি ... ... ॥০—১ ড্রাম।

৩। এসিটম্ সিলি ... ... ১০—৪০ মিনিম।

৪। সিরপ্‌স্‌সিলি ... ... ॥০—১ ড্রাম।

৫। পাইল্যুলাসিলি কম্পজিটা ... ... ৫—১০ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। কাশরোগ, হিউমারেল অ্যাজমা, শোথ, উদরি, হুপিংকফ্, ক্যাটার, ক্রুপ, ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস, হাইড্রোথোর্যাকস্ প্রভৃতি রোগে।

একাদশ অধ্যায়।

স্বেদ জনক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। লাইকর্ অ্যামোনিয়া এসিটেটিস...	১—৬ ড্রাম।
২। „ „ সাইট্রেটিস	

৩। স্পিরিটস্ ইথারিস নাইট্রোসাই ॥০—২ ড্রাম।
৪। ,, কাজুপটি ... ... ॥০—১ ড্রাম।
৫। ভাইনম এণ্টিমোনিয়েলিস ...} ৫—৩০ মিনিম।
৬। ,, ইপিকাকুয়ানি ...}
৭। ,, কলচিসাই ... ... ১০—৩০ মিনিম।
৮। টিংচ্যুরা গোয়েসাই এমোনিয়েটা ... ॥০—১ ড্রাম।
৯। ,, কলচিসাই সেমিনা ... ১০—৩০ মিনিম।
১০। পটাসি নাইট্রাস ... ... ৫—৩০ গ্রেন।
১১। ,, সাইট্রাস্ ... ... ২০—৬০ গ্রেন।
১২। এণ্টিমোনিয়ম টার্টারেটম্ ... $\frac{১}{১২}$—$\frac{১}{৮}$ গ্রেন।
১৩। পলবিস্ এণ্টিমোনিয়োলিস ... ... ৩—৮ গ্রেন।
১৪। ,, ইপিকাকুয়ানি ... ... $\frac{১}{৮}$ — ১ গ্রেন।
১৫। ক্যালট্রপিস কর্টেক্স ... ... ৫—১৫ গ্রেন।
১৬। ক্যাম্ফোরা ... ... ১—১০ গ্রেন।
১৭। এমোনি কার্ব্বনাস ... . ৩—১০ গ্রেন।

স্বেদজনক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

লাইকর্ অ্যামোনিয়া এসিটেটিস্ ... সোলুসন অব্ এসিটেট্ অব্ এমোনিয়া

(মাত্রা ১ হইতে ৬ ড্রাম।)

ক্রিয়া। ঘর্ম্মকারক, শৈত্যকারক, মূত্রকারক, বাহ্য প্রয়োগে সঙ্কোচক, শৈত্যকারক, বেদনা নিবারক, শোষক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর ও প্রদাহাদি রোগ, প্রমেহ, প্রাদাহিক শোথ, ক্রনিক অপথ্যালমিয়া, পোরাইগো, ফ্যাকচার ও কোন স্থানে থেৎলাইয়া গেলে ইহার ধৌত স্থানিক ব্যবহার্য্য।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

লাইকর্ আ্যামোনিয়া সাইট্রেটিস ... সোল্যুসন অব্ সাইট্রেট অব্ অ্যামোনিয়া।

মাত্রা ১ হইতে ৬ড্রাম।

ক্রিয়া। ঘর্ম্মকারক, শৈত্যকারক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর ও প্রদাহাদি রোগে।

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসি সাইট্রাস। সাইট্রেট্ অব্ পটাস্।

মাত্রা ২০ হইতে ৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, শৈত্যকারক, ঘর্ম্মকারক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বররোগ, পাইরেক্সিয়া, গাউট, প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য হইলে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিত্তনিঃসারক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। এসিডম্ নাইট্রিকম্ ডাইল্যুটম্ ...	৫—৩০ মিনিম
২। " নাইট্রো হাইড্রো ক্লোরিকম্ ডাই- ... ল্যুটম্	৫—২০ মিনিম।
৩। হাইড্রাজির্রাই সব্ ক্লোরাইডম্ ...	২—৫ গ্রেন
৪। " কম্ক্রিটা	৩—৮ গ্রেন
৫। পাইল্যুলা হাইড্রাজির্রাই ...	৩—৮ গ্রেন
৬। পডফিলাই রেজিনা	$\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন

৭। লাইকর্ ক্লোরাই ... ... ১০—৩০ মিনিম।
৮। একষ্ট্রাক্টম্ ট্যারেকসেসাই ... ১০—৩০ গ্রেন।

পিত্তনিঃসারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ট্যারেকসেসাই রেডিক্স। ... ... ড্যাণ্ডেলিয়ন রূট্।

ট্যারেক্ সেকম্ ডেন্সলিয়োনিস্ বৃক্ষের মূল।

ইউরোপ খণ্ড ও হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া। পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক, স্বেদজনক, মৃদুবিরেচক, আগ্নেয়, পরিবর্ত্তক, বলকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। ডিকক্টম্ ট্যারেকসেসাই .. ১—৪ আউন্স।
২। একষ্ট্রাক্টম্ ট্যারেক্সেসাই ... ১০—৩০ গ্রেন।
৩। লাইকর্ ট্যারেকসেসাই ... ... ১—৩ ড্রাম।
৪। সক্কস ট্যারেকসেসাই .. . ... ১—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। যকৃত প্রদাহ, পাণ্ডু, শোথ, অজীর্ণ, পুরাতন চর্ম্মরোগ, যকৃৎক্রিয়া সম্বন্ধীয় ও বৈধানিক ব্যাধি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ফেল্বভিনম্ পিউরিফিকেটম্ ... পিউরিফায়েড অক্স বাইল।

(শোধিত বৃষপিত্ত।)

মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মৃদুবিরেচক, পিত্তনিঃসারক, আগ্নেয়, কৃমিনাশক, বমনকারক, মূত্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ। মধুমেহ, কোষ্টবদ্ধ, অজীর্ণ, পাণ্ডুরোগ, পুরাতন বাতরোগ, উদরাময়, পিত্তনিঃসারণাভাব, এবং

আভিঘাতিক ও বেদনাস্থলে স্থানিক প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কফনিঃসারক ঔষধ সকল যথা—

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। ইপিকাকুয়ানি	$\frac{১}{২}$—৩ গ্রেন।
২। এণ্টিমোনি পটাসি টার্ট্রাস	$\frac{১}{৮}$—$\frac{১}{৪}$ গ্রেন।
৩। সিলা	১—২ গ্রেন।
৪। সেনেগি রেডিক্স	১০—৩০ গ্রেন।
৫। লোবিলিয়া	২—৫ গ্রেন।
৬। ক্রিয়োজোটম্	১—৩ মিনিম।
৭। বেঞ্জোইনম্	১০—২০ গ্রেন।
৮। এসিডম্ বেঞ্জোইকম্	৫—৩০ গ্রেন।
৯। ষ্টাইরাকস্	৫—২০ গ্রেন।
১০। টেরেবিন্থিনা কানেডেসিস্	১০—৩০ গ্রেন।
১১। ওলিবেনম্	১৫ গ্রেন—২ ড্রাম।
১২। গ্যালবেনম্	১০—২০ গ্রেন।
১৩। এমোনায়েকম্	৫—৩০ গ্রেন।
১৪। এমোনায়েসাই মিশ্চ্যুরা	$\frac{১}{২}$—১ আউন্স।
১৫। সিরপস্ টোলুটেনস্	॥০—২ ড্রাম।
১৬। ইনফিউজম সেনেগি	১—২ আউন্স।
১৭। বালসেমম্ পিরুভিয়ানম্	১০—৩০ মিনিম।
১৮। „ টোলুটেনম্	১০—৩০ মিনিম।
১৯। টিংচ্যুরা টোলুটেনম্	$\frac{১}{২}$—১ ড্রাম।
২০। „ বেঞ্জোইনাই কম্পজিটা	$\frac{১}{২}$—১ ড্রাম।

২১। টিংচ্যুরা সিলি ... ... ১০—৪০ মিনিম।
২২। „ লোবিলি ... ... } ১০—৩০ মিনিম।
২৩। „ „ ইথিরিয়া ...
২৪। „ সেনেগি ... ... ১—২ ড্রাম।
২৫। ভাইনম্ ইপিকাকুয়ানি ... } ৫—৩০ মিনিম।
২৬। „ এণ্টিমোনিয়েলিস্ ...

কফনিঃসারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ব্যালসেমম্ পিরুভিয়ানম। ... ... ব্যালসেমম্ পিরু।

(মাইরক সাইলন্ পেরেরি নাম বৃক্ষের রস।)

মাত্রা ১০ হইতে ৩০ মিনিম।

ক্রিয়া। কফনিঃসারক, উত্তেজক, বাহ্য প্রয়োগে ঈষৎ সঙ্কোচক।

আময়িক প্রয়োগ। পুরাতনক্ষত, শয্যাক্ষত, পচাক্ষত, কর্ণে পুজহইলে, এবং লুকোরিয়া, গ্লিট, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ব্যালসেমম্ টোলুটেনম্। ... ... ব্যালসেমম্ টোলু।

(মাইরক সাইলম্ টুলুফিরা নামক বৃক্ষের রস।)

মাত্রা ১০ হইতে ৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। ব্যালসম অব্ পিরুর ন্যায়।

প্রয়োগরূপ ... মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা টোলুটেনা ... ... ‖০—১ ড্রাম।
২। সিরপস টোলুটেনাস্ ... ... ‖০—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। ব্যালসম অব্ পিরুর ন্যায়।

[৩য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

বেঞ্জোইনম্। ... ... বেঞ্জোইন।

(লোবান)

ষ্টাইরাকস্ বেঞ্জোইন বৃক্ষের ধুনাযুক্ত রস।
বোর্ণিয়ো সুমাত্রা, জাবা উপদ্বীপ এবং শ্যাম রাজ্যে জন্মে।
মাত্রা ১০—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক, আক্ষেপ নিবারক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা বেঞ্জোইনা কম্পাজিটা ...	||০—১ ড্রাম।
২। এসিডম্ বেনজোইকম্	১০—২০ গ্রেন।
৩। এডেপস্ বেনজোয়েটস্	(বাহ্য প্রয়োগার্থ।

আময়িক প্রয়োগ। মূত্রাশয়ের উগ্রতায়, পুরাতন কাশরোগ, প্রস্রাবের ক্ষারত্ব, পচাক্ষত, পুরাতন আভিঘাতিকক্ষত, প্রভৃতি রোগে।

(৪র্থ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ক্রিয়োজোটম্।	ক্রিয়োজোট্।

কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত আল্‌কাতরা চুয়াইলে প্রস্তুত হয়।
মাত্রা ১ হইতে ৩ মিনিম।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কফনিঃসারক, বায়ুনাশক, মূত্রকারক, আক্ষেপ নিবারক, বমননিবারক, বাহ্য প্রয়োগে রক্ত রোধক, বেদনানিবারক, উগ্রতাসাধক, পচননিবারক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। মিশ্চুরা ক্রিয়োজোটাই ...	$\frac{১}{২}$—২ আউন্স।
২। ভেপার ক্রিয়োজোটাই	বাহ্য প্রয়োগার্থ
৩। অঙ্গুয়েণ্টম্ ক্রিয়োজোটাই ...	ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, রক্তোৎকাশ, মধুমেহ, আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব, পুরাতন শ্বাসনালী প্রদাহ, পুরাতন প্রমেহ গর্ভাবস্থায় বমন নিবারনার্থ, পুরাতন পচাক্ষত, ... ত্বক্ষত, দন্তগহ্বর বেদনা, দন্তশূল, জলৌকাদংশন এবং দন্তোৎ-

প্যাটমের পর রক্তস্রাব, েপারাইগো, ইম্পিটাইগো, সোরায়েসিস, শ্বেবীজ, একজীমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে।

(৫ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সেনেগি রেডিক্স। ... ... সেনেগারূট।

পলিগেলেসি জাতীয় পলিগেলা সেনেগা নামক বৃক্ষের শুষ্কফল। উত্তর আমেরিকায় জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০--৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। কফনিঃসারক, উত্তেজক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক স্বেদজনক, অধিক মাত্রায় বিরেচক ও বমনকারক।

প্রয়োগরূপ ... ...মাত্রা।

১। টিংচ্যুরা সেনেগি ... . $\frac{১}{২}$—২ ড্রাম।

২। ইনফিউজম সেনেগি ... ... ১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। ক্রনিক নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, হিউমারেল অ্যাজমা, হুপিংকফ, ডিসমেনোরিয়া, ক্রুপ, অ্যালবিউ মিনুরিয়া, ড্রপ্সি, ক্রনিক্ রিউমেটিজম্ প্রভৃতি রোগে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ক্রমিনাশক ঔষধ সকল যথা।——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। ইনফিউজম কসো	২—৬ আউন্স।
২। ,, কোয়াসিয়া	১—২ আউন্স।
৩। পলবিস্ স্কেমনি কম্পজিটস্ ..	৫—২০ গ্রেন।
৪। ,, গ্র্যানেটাই রেডিসিস কর্টেক্স	২০—৬০ গ্রেন।
৫। মিকিউমিনা প্রুরিয়েন্স	১—২ ড্রাম।
৬। ক্যামেলা	$\frac{১}{২}$ —২ ড্রাম।

৭। ডিকক্টম্ গ্র্যানেটাই রেডিসিস্ ... ১—৩ আউন্স
৮। কসো ... ... ২—৪ ড্রাম
৯। ফিলিক্সমাস্ ... ... ১—২ ড্রাম
১০। এক্ষ্ট্রাক্টম্ ফিলিসিস্ লিকুইডম্ ১৫—৬০ মিনিম
১১। স্যাণ্টোনিনম্ ... ... ২—৬ গ্রেন
১২। স্পাইজিলিয়া ... ... ১—৩ ড্রাম
১৩। ওলিয়ম টেরিবিন্থিনি ... ... ২—৮ ড্রাম

ক্রিমিনাশক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কসো। ... ...কুসো।

রোজেসী জাতীয় ব্রায়েরিয়া এন্থেল মিণ্টিকা নামক বৃক্ষের পুষ্প।

(অ্যাবিসিনিয়া দেশে জন্মে।)

চূর্ণমাত্রা ২—৪ ড্রাম।

ক্রিয়া। কৃমি নাশক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। ইনফিউজম কসো ... ... ২—৬ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। টিনিয়া সোলিয়ম অর্থাৎ ফিতার ন্যায় ক্রিমিরোগে ব্যবহার্য্য।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ফিলিক্স মাস। ... ... মেলফার্ণ।

(মেলফার্ণ নামক বৃক্ষের কন্দ।)

এই বৃক্ষ ইউরোপ-খণ্ডে জন্মে।

মাত্রা ১—২ ড্রাম।

ক্রিয়া। ক্রিমিনাশক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। একষ্ট্রাক্টম্ ফিলিসিস লিকুইডম্ ১৫—৬০ মিনিম

আময়িক প্রয়োগ। টেপওয়ারম অর্থাৎ ফিতার ন্যায় কৃমি রোগে ব্যবহৃত হয়।

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

গ্র্যানেটাই রেডিসিস্ কর্টেক্স। ... পোমগ্র্যানেটরুটবার্ক।

(দাড়িম্ব মূলের বল্কল)

চূর্ণমাত্রা ২০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। ঈষৎ সঙ্কোচক, কৃমিনাশক,

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। ডিকক্টম গ্র্যানেটাই রেডিসিস ... ১—৩ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। ফিতাব ন্যায় কৃমিরোগে।

(৪র্থ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যামেলা। ... ... কামালা।

রটলিয়া টিংটোরিয়া নামক বৃক্ষের ফলের গাত্রস্থ লোহিত বর্ণ চূর্ণ পদার্থ।

ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, চীনরাজ্য এবং আরব্য দেশে জন্মে।

মাত্রা $\frac{১}{২}$ হইতে ২ ড্রাম।

ক্রিয়া। কৃমিনাশক, বিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ। টিনিয়া সোলিয়ম অর্থাৎ ফিতার ন্যায় কৃমিরোগে।

(৫ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

স্যাণ্টোনিকা। ... ... স্যাণ্টোনিকা।

আর্টিমিসিয়া বৃক্ষের মঞ্জরী।

এসিয়া এবং আফ্রিকা খণ্ডে জন্মে।

মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া ক্রিমিনাশক।

প্রয়োগরূপ .. .. মাত্রা।

১। স্যাণ্টোনিনম ... ... ২—৬ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। মহীলতার ক্রিমি এবং সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমিরোগে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

স্নিগ্ধকারক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। একেশিয়া গমাই	৩০—৬০ গ্রেন।
২। সিরপস আলথি	১—৪ ড্রাম।
৩। ,, মোরাই	॥০—১ ড্রাম।
৪। গ্লাইসিরিজি রেডিক্স	৫—২০ গ্রেন।
৫। একষ্ট্রাক্টম গ্লাইসিরিজি	৫—৩০ গ্রেন।
৬। ,, ,, লিকুইডম	২০—৬০ মিনিম।
৭। পলবিস গ্লাইসিরিজি কম্পাজিটম ...	॥০—১ ড্রাম।
৮। গ্লাইসরাইনম	১০ মিনিম ২— ড্রাম।
৯। ইসপাগুলি সেমিনা	২—৩ ড্রাম।
১০। ডিকক্টম ইসপাগুলি	২—৪ আউন্স।
১১। ওলিয়ম অলিভি	১/৪—১ আউন্স।
১২। ট্রাগেকান্থা	২—১০ গ্রেন।
১৩। মিউসিলেগো ট্রাগেকান্থি	১—২ আউন্স।

১৪। একষ্ট্রাক্টম আব্রাই, মিউসিলেগো একেসি, আলথি, ডিকক্টম আলথি, এমিগডেলি ডলসেস, মিশ্চুরা এমিগডেলি, ওলিয়ম এমিগডেলি, গ্লাইসরাইনম এমিলাই, মিউসিলেগো এমিলাই, সিট্রেরিয়া, ডিকক্টম সিট্রেরাই,

সাইডোনিয়ম, গ্রাসিলেরিয়া লাইকেনইডিস, ফিকক্টম, গ্রাসিলারি, ডিকক্টম হিবিস্কাই, লিনাইসেমিনা, ইনফিউজম লিনাই, ওলিয়ম লিনাই, মোরাইসকস, ওকাইমম-ব্যাসিলিকম্ সিমেনা, ওলিয়ম আারাকিস, ওলিয়ম থিয়োব্রোমি, স্যাকেরম পিউরিফিকেটম্, থেরাইয়েকা, অলমাই কর্টেক্স, ইউভি, ইকথাইয়োকলা, ল্যাক, মেল, স্যাকেরম ল্যাক্টিস, ওভম, ষ্টার্চ। (৪৫)

স্নিগ্ধকারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
একেসিয়া গমাই।	গম একেসিয়া।

(আরবী গঁদ।)

মাত্রা ৩০—৬০ গ্রেন বা তদূর্দ্ধ।

ক্রিয়া। আদ্রকারক, স্নিগ্ধকারক, আবরক, পোষক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। মিউসিলেগো একেসি	২—৮ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। উগ্রবিষদ্বারা বিযাক্ত হইলে, উদরাময়, অতিসার, মূত্রকৃচ্ছু, মূত্রাশ্মরী, দগ্ধস্থান, মূত্রযন্ত্র ও শ্লৈষ্মিকঝিল্লির বিবিধ বিকারে, এবং জলোকাদংশিত স্থানহইতে রক্ত রোধার্থ।

(২য়)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
অ্যামিগডেলি ডলসিস।	সুইট আমণ্ডস্।

(মিষ্টবাদাম।)

ক্রিয়া। পোষক, স্নিগ্ধকারক ও এমোলিয়েণ্ট।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। পলবিস্ এমিগডেলি কম্পজিটস্ ...	॥০—২ ড্রাম।
২। মিশ্চুরা এমিগডেলি	১—২ আউন্স।

৩। ওলিয়ম এমিগডেলি ... . ২—৪ ড্রাম।
৪। কনফেকশিয়ো এমিগডেলি ... ... ॥০—২ ড্রাম।
আময়িক প্রয়োগ। কাশরোগ, শর্দ্দী ও প্রমেহ রোগের প্রারম্ভে স্নিগ্ধকারকের নিমিত্ত এবং শৈশবাবস্থায় মৃদু বিরেচনার্থ ব্যবহৃত হয়।

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
গ্লাইসিরিজি রেডিক্স। ... ... লিকরিসরূট।

(যষ্টিমধু)

চূর্ণ মাত্রা ৫—২০ গ্রেন।

ক্রিয়া। পোষক, স্নিগ্ধকারক, শিথিলকারক।
প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। একষ্ট্রাক্টম্ গ্লাইসিরিজি ... ... ৫—৩০ গ্রেন।
২। „ „ লিকুইডম্ ... $\frac{1}{2}$—১ ড্রাম।
৩। পলবিস্ গ্লাইসিরিজি কম্পাজিটম ... ॥০—১ ড্রাম।
আময়িক প্রয়োগ। বিবিধকাশ, মূত্রযন্ত্রস্থ বিবিধরোগে।

(৪র্থ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
গ্লাইসিরিনম। ... ... গ্লিসারিণ

মাত্রা ১০ মিঃ—২ ড্রাম।

ক্রিয়া। আদ্রকারক, স্নিগ্ধকারক।
প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। গ্লাইসিরিনম এসিডাই কার্ব্বলিসাই ...		বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।
২। „ „ গ্যালিসাই		
৩। „ „ ট্যানিসাই		
৪। „ „ এমিলাই		
৫। „ „ বোরেসিস		

৬। গ্লাইসরাইনম বেলাডোনি ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ)
৭। „ ওলিয়ম রেসিনাই ... ... ॥০—১ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। কডলিভার অয়েলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় এতদ্ভিন্ন বিবিধ চর্ম্মরোগ, উগ্রক্ষত, দন্তক্ষত, এবং কর্ণ কুহরের শুষ্কতাবশতঃ বধিরতা হইলে।

(৫ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ইসপাগুলি সেমিনা।	ইসপাগুলসিড্‌স্।

(ইসবগুল্)

মাত্রা ২ হইতে ৩ ড্রাম।

ক্রিয়া। ঈষৎ সঙ্কোচক এবং স্নিগ্ধকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। ডিকক্টম্ ইসপাগুলি ... ... ২—৪ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, সর্দ্দি, মূত্রযন্ত্রের বিকারে, অতিসার, উদরাময় প্রভৃতি রোগে।

(৬ষ্ঠ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
লিনাই সেমিনা।	লিন্সিড।

তিসি, মসিনা।

ক্রিয়া। স্নিগ্ধকারক।

প্রয়োগরূপ .. .. মাত্রা।
১। ইনফিউজম লিনাই ... ... (যথেচ্ছাক্রমে)
২। ওলিয়ম লিনাই ... ... } বাহ্য প্রয়ো-
৩। ক্যাটেপ্লাজম লিনাই ... ... } গার্থ।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ কাশ, মূত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের বিবিধ রোগে, উদরাময়, এবং অতিসার, রোগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উগ্রতা সংহারার্থ ইহার কাণ্ট। এতদ্ভিন্ন বিস্ফোটক এবং ক্ষতাদিতে ইহার পুলটিস ব্যবহৃত হয়।

(৭ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ওলিয়ম অলিভি। ... ... অলিভ অয়েল

(জল পাইয়ের তৈল।)

মাত্রা $\frac{১}{৪}$ হইতে ১ আউন্স।

ক্রিয়া। স্নিগ্ধকারক, আদ্রকারক, আবরক, অধিক মাত্রায় মৃদু বিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ চক্ষুপ্রদাহ, অপথালমিয়া টার্সাই কর্ণবেদনায়, ইকাইথসিস ও স্কেবীজ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উদরপ্রদাহ, রক্তাতিসার, সর্পদংশনে বিষনাশার্থ, দগ্ধস্থান এবং পিত্তাশ্মরি প্রভৃতি রোগে।

(৮ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ট্র্যাগেকান্থা। ... ... ট্র্যাগেকান্থ।

[আষ্ট্রাগেলস্ বৃক্ষের গঁদ।]

মাত্রা ২ হইতে ১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। স্নিগ্ধকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। পলবিস্ ট্র্যাগেকান্থি কম্পাজিটম ... ২০—৬০ গ্রেন
১। মিউসিলেগো ট্র্যাগেকান্থি ... ... ১—২ আউন্স

আময়িক প্রয়োগ। আরবী গঁদের ন্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

আবরক ঔষধ সকল যথা——

[ঔষধ সকলের নাম।]

১। মেলাজিরম, কলোডিয়ম ফ্লেক্সিবল, গটাপার্চ্চা, কলো-

ডিয়ম এপিস্পাষ্টিকস, কলোডিয়ম আইওডাই, পাইরক্সা-ইলিন, অ্যাডেপস্ প্রিপারেটস, কলোডিয়ম স্যালিসি-লিকম্, কলোডিয়ম কম আইডোফর্ম্ম, এডেপস বেঞ্জো-য়েটস্ সিরাক্লেবা, অঙ্গয়েণ্টম সিম্প্লেক্স, অঙ্গুয়েণ্টম, সিটেশিয়াই, সিভম্ প্রিপারেটম, অর্জেণ্টাই নাইট্রাস-ওলিয়ম অলিভি, ওলিয়ম অ্যামিগডেলি, ক্যাটাপ্লাজমা। ১৮

আবরক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কলোডিয়ম। ... ... কলোডিয়ম

[আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।]

ক্রিয়া। আবরক, সঙ্কোচক।

প্রয়োগরূপ।

১। কলোডিয়ম ফ্লেক্সিবল ... ...
২। ,, এপিস্পাষ্টিকস্ ... ...
৩। ,, স্যালিসিলিকম্ ... ...
৪। ,, আইওডাই ... ...
৫। ,, কম্ আইডোফর্ম্ম ... ...

} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। ইরিসিপেলাস, শয্যাক্ষত, দগ্ধ ও আহত স্থান, জলৌকা দংশন ও দন্তোৎ পাটনের পর রক্ত রোধার্থ। অস্ত্রাঘাতের— উভয় ওষ্ঠ একত্র রাখিবার নিমিত্ত, বসন্ত, কোনস্থান দগ্ধহইয়া বা ঝলসাইয়া গেলে-ফিশর অব্ দিএনাস, এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এডেপস্ প্রিপারেটস। ... ... প্রিপেয়ার্ড লার্ড]

[শূকরের বসা।]

ক্রিয়া। আবরক, স্নিগ্ধকারক।

১। এডেপস্ বেঞ্জোয়েটস ... ... [বাহ্য প্রয়োগার্থ।

আময়িক প্রয়োগ। স্কার্লেটিনা, হাম, বসন্ত, টাইফস্ এবং ইরিসিপেলাস রোগে মর্দ্দনার্থ, ও অধিকাংশ মলম প্রস্তুত করনার্থ ব্যবহৃত হয়।

[৩য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
সিরাফ্লেবা।	ইয়েলো অয়াক্স।

[পীতমোম।]

[মধুচক্র হইতে প্রস্তুত হয়।]

ক্রিয়া। আবরক।

প্রয়োগরূপ।

১। অঙ্গুয়েণ্টম্ সিপ্লেক্স ... ... [বাহ্য প্রয়োগার্থ]

বিবিধ মলম ও পলস্ত্রা প্রস্তুত করনার্থ ব্যবহৃত হয়।

[৪র্থ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
সিটেশিয়ম।	সিটেশিয়াই।

[তিমিরবসা।]

তিমির মৎসের মস্তকস্থিতবসা।

ক্রিয়া। আবরক, স্নিগ্ধকারক, শিথিলকারক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। অঙ্গুয়েণ্টম্ সিটেশিয়াই ...	(বাহ্য প্রয়োগার্থ।)

আময়িক প্রয়োগ। চার্টা এপিপ্যাষ্টিকা, প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

রজোনিঃসারক ঔষধ সকল যথা—

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। এলোজ বার্ব্বেডেনসিস	২—৩ গ্রেন
২। ,, সকট্রাইনা	

৩।	এমোনি ক্লোরাইডম্	৫ ২০ গ্রেন।
৪।	পাইল্যুলা এলোজ এট মর্হা ..	৫—১০ গ্রেন।
৫।	,, ,, এটআসাফোটিডা	
৬।	টিংচুরা সেবাইনি	$\frac{১}{২}$—২ ড্রাম।
৭।	,, আর্গটি	১০—৬০ মিনিম।
৮।	ওলিয়ম রিউটি	১—৫ মিনিম।
৯।	,, সেবাইনি	২—৫ মিনিম
১০।	একষ্ট্রাক্টম আর্গটি লিকুইডম্	১০—৬০ মিনিম।
১১।	ইনফিউজম্ আর্গটি	১—২ আউন্স।
১২।	বোরাকস্	১০—৫০ গ্রেন।
১৩।	আসাফোটিডি	৫—২০ গ্রেন।
১৪।	সেবাইনা কাকিউমিনা	৫—১০ গ্রেন।
১৫।	ফিরম রিড্যাক্টম্	১—৫ গ্রেন।
১৬।	আর্গটা	১০—৩০ গ্রেন।
১৭।	ডিকক্টম্ এলোজ কম্পজিটম	$\frac{১}{২}$—২ আউন্স।
১৮।	ইঞ্জেকশিয়ো আর্গটি হাইপোডার্ম্মিকা ২—৬ মিনিম। হাইপোডার্মিক ব্যবহার্য্য	

রজোনিঃসারক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
বোরাক্স।	বোরাক্স।

(সোহাগা।)

মাত্রা ১০—৫০ গ্রেন।

ক্রিয়া। রজোনিঃসারক, মূত্রকারক, অম্লনাশক, জরায়ু সঙ্কোচক, শৈত্যকারক, কফনিঃসারক, স্থানিক উগ্রতাসাধক।

প্রয়োগরূপ .. .. মাত্রা।
১। মেলবোরেসিস ... . } বাহ্য প্রয়োগার্থ
২। গ্লাইসরাইনম বোরাসিস ... } ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, লুপ্তরজ রোগ, প্রসব বিলম্ব হইলে, মুখমধ্যস্থ বিবিধ ক্ষতে, জরায়ু হইতে রক্তস্রাব, একজীমা, প্রুরাইগো, পিটিরায়েসিস, এবং মূত্রে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য ও পাথরি থাকিলে।

লাটিন ইংরাজী।
স্যাবিনি ক্যাকিউমিনা। স্যাবিন টপ্‌স্‌।

জুনিপরস স্যাবিনা নামক বৃক্ষের সরস এবং শুষ্ক শাখাগ্র।
ইউরোপ-খণ্ডে জন্মে।
মাত্রা ৪—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। রজোনিঃসারক, উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক, স্থানিক উগ্রতাসাধক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। ওলিয়ম্‌ সেবাইনি ... ... ২—৫ মিনিম।
২। টিংচ্যুরা সেবাইনি ... ... ৷৷০—২ ড্রাম।
৩। অঙ্গুয়েণ্টম সেবাইনি ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ)

আময়িক প্রয়োগ। শ্বেতপ্রদর, রজোধিক, গাউট, ক্লোরোসিস্‌, কৃমিরোগ, রক্তপ্রদর, কেরিজরোগ, গ্যাংগ্রিন, টিনিয়া কেপিটিস, পাঁচড়া, পুরাতন ও ঔপদংশিক ক্ষত, এবং বিষ্টারের ক্ষত সরস রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ওলিয়ম্‌ রিউটী। ... ... অইল অব্‌ রিউ।

রুটায়ো গ্রেবিয়োলেন্‌স্‌ নামক বৃক্ষের সরসপত্র এবং অপক্ক ফল চুয়াইলে ইহা প্রস্তুত হয়।
মাত্রা ১—৫ মিনিম।

ক্রিয়া। উত্তেজক, রজোনিঃসারক, আক্ষেপ নিবারক, বায়ু-নাশক। স্থানিক উগ্রতাসাধক এবং ফোস্কাকারক।

আময়িক প্রয়োগ। লুপ্তরজোরোগ, হিষ্টিরিয়া, শৈশবাবস্থায় আক্ষেপ এবং উদরাধ্মান আদি রোগ, এতদ্ভিন্ন জরায়ুঘটিত বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হয়।

(৪র্থ)

ল্যাটিন।		ইংরাজী।
আর্গটা	... ...	আর্গট।

সিকেলি সিরেয়েলি নামক ঔষধির বিকৃত শস্য।

মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। জরায়ুসঙ্কোচক, রজোনিঃসারক, রক্তরোধক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা আর্গটী	১০—৬০ মিনিম।
২। এক্‌ষ্ট্রাক্টম্‌ আর্গটী লিকুইডম্‌	১০—৬০ মিনিম।
৩। লাইকর্‌ আর্গটী	১০—৬০ মিনিম।
৪। ইনফিউজম আর্গটি	১—২ আউন্স।
৫। ইঞ্জেকশিও আর্গটী হাইপোডার্ম্মিকা	২—৬ মিনিম। হাইপোডার্ম্মিক ব্যবহার্য্য

আময়িক প্রয়োগ। প্রসববেদনার শক্তিকে সাহায্য করণার্থ, রক্তবমন, রক্তোৎকাশ, রক্তপ্রস্রাব, শ্বেতপ্রদর, অর্শ, গর্ভস্রাব করণার্থ এবং প্ল্যাসেন্টা, জরায়ুর মধ্যে হাইডেটিড্‌স্‌ বা পলিপস্‌ শ্লৈষ্মার্ব্বুদ জন্মিলে তাহা নির্গত করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দাহক, দুর্গন্ধহারক এবং পচন নিবারক ঔষধ সকলযথা—

। এসিডম্‌ কার্ব্বলিকম্‌, এসিডম্‌ ক্রোমিকম্‌, অ্যাসিডম্‌ অ্যাসিটিকম্‌, অ্যাসিডম্‌ আর্শেনিয়োসম, এসিডম্‌ নাইট্রি-

কম্, এসিডম্ সলফিউরিকম, এসিডম্ হাইড্রোক্লোরিকম্, হাইড্রার্জিরাই পক্লোরাইডম, হাইড্রার্জিরাই আইওডাইডম্ রুব্রম, হাইড্রার্জিরাই অক্সাইডম্ রুব্রম, এণ্টিমোনিয়াই ক্লোরাইডম্, পটাসা কষ্টিকা, পটাসি পরম্যাঙ্গ্যানাস, সোডা কষ্টিকা, অর্জেণ্টাই নাইট্রাস, জিনসাই ক্লোরাইডম্, জিনসাই সলফাস, অ্যালম এক্সিকেটম, কুপ্রাই সলফাস, লাইকর্ হাইড্রার্জিরাই নাইট্রেটিস অ্যাসিডাস্, ক্যালকস্ ক্লোরেটা, প্লম্বাইনাইট্রাস, লাইকর ক্লোরাই লাইকর সোডি ক্লোরেটী। (২৪)

দাহক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

এসিডম্ কার্বলিকম্। ... ... কার্বলিক এসিড্।

বিলাতি কয়লা হইতে প্রস্তুত আল্‌কাতরা চুয়াইলে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মাত্রা ১—৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। বায়ুনাশক, পচন নিবারক, উত্তেজক, দুর্গন্ধহারক। স্থানিক উগতাসাধক, দাহক, এবং ক্রিয়োজোটের ন্যায় বমন নিবারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। গ্লাইসরাইনম্ এসিডাই কার্বলিসাই
২। ,, ,, কমসেপনি
৩। ভেপর এসিডাই কার্বলিসাই ...
৪। সপোজিটোরিয়া এসিডাই কার্বলিসাই
৫। অঙ্গুয়েণ্টম এসিডাই কার্বলিসাই
} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। পচাক্ষত, মধুমেহ, দুষ্টক্ষত, কার্ব্বঙ্কেল, ক্যান্সারক্ষত, বমন নিবারনার্থ, অর্শ, পাঁচড়া, কুষ্ঠ, টিনিয়া কেপিটিস, রুপিয়া ও কেশকীট বিনাশার্থ এবং বিবিধ চর্ম্ম রোগে।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
পটাশা কষ্টিকা। কষ্টিক পটাশ।

(আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না।)

ক্রিয়া। বিশুদ্ধ দাহক।
আময়িক প্রয়োগ। ঔপদংশিক ও পচাক্ষত, বাঘি, এবং স্ক্রফিউলা জনিত স্ফোটকাদি ছেদনার্থ, হস্পিটেল গ্যাংগ্রিন, এবং ইস্যু সংস্থাপনার্থে ব্যবহার্য্য।

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।
পটাসি পরম্যান গেনাস। পরম্যান গেনেট অব্ পটাস।

মাত্রা ১—৩ গ্রেন।

ক্রিয়া। পচননিবারক, দাহক, পরিবর্ত্তক, দুর্গন্ধহারক।
প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। লাইকর্ পটাসি পরম্যান গেনেটিস ... } ২—৪ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। মধুমেহ রোগে আভ্যন্তরিক এবং বিবিধ পচাক্ষতাদিতে স্থানিক প্রয়োগার্থ লোসন, গার্গেল, ও ওয়াস রূপে ব্যবহৃত হয়।

[৪র্থ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
সোডা কষ্টিকা ... ... কষ্টিক সোডা।

(আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না।)

ক্রিয়া। কষ্টিক পটাশের ন্যায়। কিন্তু তত ক্ষীণ এবং জলশোষক নহে।
আময়িক প্রয়োগ। ইস্যুকরনার্থ ব্যবহৃত হয়।

উনবিংশ অধ্যায়।

ক্ষার বা অম্লনাশক ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম। মাত্রা।
১। এমোনি কার্ব্বনাস .. .. ৩—১০ গ্রেন।

২। স্পিরিটস্ এমোনি এরোমেটিকস ২০—৬০ মিনিম।
৩। পটাসি এসিটাস ... ... ১০—৬০ গ্রেন।
৪। „ কার্বনাস ... ... ১০—৩০ গ্রেন।
৫। „ বাইকার্বনাস ... ... ১০—৬০ গ্রেন।
৬। „ সাইট্রাস ... ... ২০—৬০ গ্রেন।
৭। „ টার্ট্রাস ... ... ১—৮ ড্রাম।
৮। „ „ এসিডা ... ... ২০—৬০ গ্রেন।
৯। লাইকর্ পটাসি ... ... ১০—৬০ মিনিম।
১০। „ ক্যালসিস ... ... $\frac{১}{২}$ – ২ আউন্স।
১১। „ সোডি ... ... ১০—৩০ মিনিম।
১২। সোডি কার্বনাস ... ... ১০—৩০ গ্রেন।
১৩। „ বাইকার্বনাস ... ... ১০—৬০ গ্রেন।
১৪। „ কার্বনাস এক্সিকেটা ... ৩—১০ গ্রেন।
১৫। „ সিট্রোটার্ট্রাস এফারভেসেন্স ১—৪ ড্রাম।
১৬। পলবিস এরোমেটিকস্ ... ... ৩—১০ গ্রেন।
১৭। লিথি কার্বনাস ... ... ৩—৬ গ্রেন।
১৮। „ সাইট্রাস্ ... ... ৫—১০ গ্রেন।
১৯। মিশ্চুরা ক্রিটি ... ... ১—২ আউন্স।
২০। ক্যালসিস কার্বনাস প্রেসিপিটেটা } ১০—৬০ গ্রেন।
২১। ম্যাগনিশিয়া কার্বনাস ... }
২২। পলবিস রিয়াই কম্পজিটম ... ২০—৬০ গ্রেন।
২৩। স্যাপো ... ... ৫—৩০ গ্রেন।
২৪। ক্রিটা প্রিপারেটা ... ... ১০—৬০ গ্রেন।

ক্ষার বা অম্লনাশক ঔষধদিগের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যালসিস কার্বনাস। ... ... কার্বনেট্ অব্ লাইম

মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। ধারক, অম্লনাশক, শুষ্ককারক।

প্রয়োগরূপ ... ...মাত্রা।

১। মিশ্চুয়া ক্রিটি ... ... ১—২ আউন্স।

২। পলবিস ক্রিটি এরোমেটিকস্ ... ১০—৬০ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। অম্লজনিত উদরাময় এবং বিবিধ চর্ম্ম রোগে।

(২য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কালকস্। ... ... লাইম।

(চুণ।)

ক্রিয়া। তীক্ষ্ণদাহক, ঔষধার্থ ইহার প্রয়োগরূপ ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। লাইকর্ ক্যালসিস .. ... $\frac{১}{২}$ ২। ৩আউন্স।

২। ,, ,, স্যাকারেটস ... ॥০—২ ড্রাম।

৩। লিনিমেণ্টম্ ক্যালসিস ... ... বাহ্য প্রয়োগার্থ।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, ধারক, শুষ্ককারক, দুর্গন্ধহারক, সঙ্কোচক, পচন নিবারক, পরিবর্ত্তক।

আময়িক প্রয়োগ। অম্লরোগ, অম্লজনিত বুকজ্বালা, উদরাময় এবং বমন নিবারনার্থ, প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য হইলে, বিবিধ ক্ষত, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রোগে।

(৩য়)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসি বাইকার্ব্বনাস। ... বাইকার্ব্বনেট অব্ পটাশ।

মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, অম্লনাশক, পরিবর্ত্তক।

আময়িক প্রয়োগ। যে সকল রোগে কার্ব্বনেট্ অব্ পটাস এবং লাইকর্ পটাশি ব্যবহৃত হয় তাহাতে ব্যবহার্য্য।

[৪র্থ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাশি কার্ব্বনাস ... ... কার্ব্বনেট অব্ পটাশ।

মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, পরিবর্ত্তক, কফনিঃসারক, অ্যান্টিলিথিক, অধিক মাত্রায় দাহক বিষ ক্রিয়া করে।

আময়িক প্রয়োগ। অম্ল ও শোথরোগ এবং লাইকর্ পটাশির ন্যায় অন্যান্য রোগে।

[৫ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

লাইকর্ পটাশি। ... ... সোল্যুসন অব্ পটাশ।

মাত্রা ১০—৬০ মিনিম।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, পরিবর্ত্তক, কফনিঃসারক, মূত্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ। উপদংশ, পুরাতন গাউট, অজীর্ণ, বুক, জ্বালা, অম্লোদ্গার, প্রস্রাবে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য হইলে, স্ক্রফিউলা, রেকাইটিস্, ইরিথিমা, প্লুরাইটিস, পেরিকার্ডাইটিস, অশ্মরীরোগ, কুষ্ঠ, হার্পিজ, একজীমা, সোরায়েসিস, ইম্পেটাইগো, রস ও স্রাবণ গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, স্কর্ভি এবং বিবিধ কাশরোগে।

(৬ষ্ঠ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

স্যাপো। ... ... সোপ।

(সাবান।)

মাত্রা ৫—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, স্নিগ্ধকারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। লিনিমেণ্টম স্যাপনিস্ ... ...
২। এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ স্যাপনিস্ ... ...
৩। „ সিরেটাই স্যাপোনিস
} বাহ্য প্রয়োগার্থ ব্যবহার্য্য।

আময়িক প্রয়োগ। বিবিধ দ্রাবকদ্বারা বিষাক্ত, অজীর্ণ, দ্রাবক বা ফস্ফরসদ্বারা কোন স্থান দগ্ধহইলে, এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে।

(৭ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সোডিবাইকার্ব্বনাস। ... ... বাইকার্ব্বনেট্ অবসোডা।

মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, মূত্রকারক, শোষক, পরিবর্ত্তক, কফ-নিঃসারক।

প্রয়োগরূপ .. ..মাত্রা।

১। সোডি সিট্রোটাট্রাস এফারভেসেন্স ... ১—৪ ড্রাম।
২। ট্রোচিসাই সোডিবাইকার্ব্বনেটিস ... ১—৬ চাক্তি।
৩। লাইকর্ সোডি এফারভেসেন্স (যথেচ্ছাক্রমে।)

আময়িক প্রয়োগ। বমন নিবারনার্থ, বিসুচিকা, বাতরোগ, পাকাশয় ও প্রস্রাবে অম্লাধিক্য হইলে এবং বিবিধ চর্ম্মরোগে।

(৮ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সোডি কার্ব্বনাস। ... ... কার্ব্বনেট অব্ সোডা।

(সাজিমাটী হইতে প্রস্তুত।)

মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। অম্লনাশক, পরিবর্ত্তক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। সোডি কার্ব্বনাস এক্সিকেটা ... ৩—১০ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। স্ক্রফিউলা, অজীর্ণ, পাকাশয়ের অম্লতায়।

বিংশ অধ্যায়।

বিরেচক, মৃদুবিরেচক ও অতিবিরেচক।

ঔষধ সকল যথা——

ঔষধ সকলের নাম।	মাত্রা।
১। এক্‌ষ্ট্রাক্টম এলোজ	
২। ,, ,, বার্ব্বেডেনসিস	
৩। ,, ,, সক্‌ট্রাইনা ...	৫—১০ গ্রেন। (১—৫)
৪। ,, কলোসিন্থিডিস্	
৫। ,, ,, কম্পজিটম্	
৬। ,, রিয়াই	১০—২০ গ্রেন।
৭। ওলিয়ম এমিগডেলি	১—২ আউন্স।
৮। ,, রেসিনি	$\frac{১}{২}$—২ আউন্স।
৯। ,, ক্রোটনিস	$\frac{১}{২}$—২ মিনিম।
১০। ,, ওলিভি	॥০—১ আউন্স।
১১। ইনফিউজম্ সেনি	১—২ আউন্স।
১২। ,, রিয়াই	১—৪ আউন্স।
১৩। টিংচ্যুরা জালাপি	$\frac{১}{২}$—২ ড্রাম।
১৪। ,, এলোজ	॥০—২ ড্রাম।
১৫। ,, সেনি	১—৪ ড্রাম। (১৫, ১৬)
১৬। ,, রিয়াই	

১৭। মিশ্চুয়া ক্ষেমনি	} ১—২ আউন্স।	
১৮। " সেনি কম্পজিটম		
১৯। এলোজ বার্ব্বেডেনসিস	} ৫—১০ গ্রেন।	
২০। " সকট্রাইনা		
২১। কম্ফেকশিয়ো স্কেমোনি	২০—৪০ গ্রেন।	
২২। " সেনি	১—২ ড্রাম।	
২৩। পাইল্যুলা এলোজ এটআসাফেটিডি		
২৪। " " " মহ্	} ৫—১০ গ্রেন।	
২৫। " ক্যালোমেলেনস কম্পজিটা		
২৬। " গ্যাম্বোজিয়া কম্পজিটা ...		
২৭। " রিয়াই কম্পজিটা	} ৪—১০ গ্রেন।	
২৮। " কলোসিস্থিডিস কম্পজিটা		
২৯। " " এট হাইয়োসায়েমাই		
৩০। " স্কেমোনি কম্পজিটা ...	৫—১৫ গ্রেন।	
৩১। পলবিস জালাপি	১০—৩০ গ্রেন।	
৩২। " " কম্পজিটম্ ...	২০—৬০ গ্রেন।	
৩৩। " স্কেমোনি কম্পজিটম ...	৫—২০ গ্রেন।	
৩৪। " রিয়াই	১০—৪০ গ্রেন।	
৩৫। " " কম্পজিটা ...	২০—৬০ গ্রেন।	
৩৬। ম্যাগনিসিয়া কার্ব্বনাস	১০—৬০ গ্রেন।	
৩৭। " সলফাস	১—৮ ড্রাম।	
৩৮। পডফিলাই রেজিনা	$\frac{১}{৪}$—১ গ্রেন।	
৩৯। পটাসি সলফাস্	১৫—৬০ গ্রেন।	
৪০। " টার্ট্রাস্	১—৪ ড্রাম।	
৪১। " " এসিডা	২০—৬০ গ্রেন।	
৪২। হাইড্রার্জিরাই সব্‌ক্লোরিডাই ...	১—১০ গ্রেন।	
৪৩। " কমক্রেটা	২—৫ গ্রেন।	
৪৪। সোডি টার্টারেটা	১—৪ ড্রাম।	

৪৫।	সোডি সলফাস্	$\frac{১}{২}$—১ আউন্স।
৪৬।	সোডিয়াই ক্লোরাইডম্ ...	$\frac{১}{২}$—১ আউন্স।
৪৭।	স্কেমোনি রেজিনা	৩—৮ গ্রেন।
৪৮।	" রেডিসিস্ পলবিস্ ...	৫—১০ গ্রেন।
৪৯।	সিরপ্স্ সেনি	১—৪ ড্রাম।
৫০।	" রিয়াই ...	১—৪ ড্রাম।
৫১।	" রামনাই ...	১—৪ ড্রাম।
৫২।	ভাইনম্ এলোজ	২—৪ ড্রাম।
৫৩।	" রিয়াই	১—২ ড্রাম।
৫৪।	ডিকক্টম্ এলোজ কম্পাজিটম্ ...	$\frac{১}{২}$—১ আউন্স।
৫৫।	গ্যাম্বোজিয়া	২—৫ গ্রেন।
৫৬।	ইলাটেরিয়ম	$\frac{১}{১৬}$—$\frac{১}{২}$ গ্রেন।
৫৭।	প্রুনম্	$\frac{১}{২}$—১ আউন্স।
৫৮।	ফেলবভিনম পিউরিফিকেটম্	৫—১০ গ্রেন।
৫৯।	সালফার প্রেসিপিটেটম্	$\frac{১}{২}$—১ ড্রাম।
৬০।	ট্যামারিণ্ড	২—৪ ড্রাম।
৬১।	ম্যানা	২—৪ আউন্স।
৬২।	জালাপা রেজিনা	৫—১০ গ্রেন।
৬৩।	একষ্ট্রাক্টম বেলি লিলুইডম্	১—২ ড্রাম।
৬৪।	কার্ব্বাইটিস্ সেমিনা	$\frac{১}{২}$—১ ড্রাম।

বিরেচক ঔষধ সকলের বিবরণ।

(১ম)

ল্যাটিন।		ইংরাজী।
এলো।	... ...	এলোজ।

(মুসর্ব্বর।)

বার্ব্বেডোজ এবং সকট্রা উপদ্বীপে জন্মে।

মাত্রা ৩—৫ গ্রেন।

ক্রিয়া। অল্প মাত্রায় বলকারক, আগ্নেয়, পিত্তনিঃসারক, অধিক মাত্রায় বিরেচক।

মুসর্ব্বর দুই প্রকার যথা——

১। এলোজ বার্ব্বেডেনসিস ... ... } ৫—১০ গ্রেন।
২। „ সকট্রাইনা ... ... }

এই দুই প্রকার এলোজ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে বার্ব্বেডেনসিস এলোজের——

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। এক্স্ট্রাক্টম্ এলোজ বার্ব্বেডেনসিস ...	২—৬ গ্রেন।
২। পাইল্যুলা এলোজ বার্ব্বেডেনসিস	৫—১০ গ্রেন।
৩। „ „ এটফেরি ...	৫—১০ গ্রেন।

(সকট্রাইনা এলোজ।)

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। ডিকক্টম্ এলোজ কম্পজিটম্ ...	‖০—২ আউন্স।
২। এক্স্ট্রাক্টম এলোজ সকট্রাইনা ...	২—৬ গ্রেন।
৩। পাইল্যুলা এলোজ সকট্রাইনা ...	৫—১০ গ্রেন।
৪। „ „ এট আসাফোটিডি	১০—২০ গ্রেন।
৫। „ „ „ মর্হি ...	৫—১০ গ্রেন।
৬। টিংচ্যুরা এলোজ	১—২ ড্রাম।
৭। ভাইনম এলোজ	১—২ ড্রাম।
৮। এনিমা এলোজ	[বাহ্য প্রয়োগার্থ]

আময়িক প্রয়োগ। অজীর্ণ, ক্ষুধামন্দ, রজোলোপ, কোষ্ঠবদ্ধ, সংন্যাস, অ্যামিনোরিয়া, আমবাত, থ্রেডওয়ারম, শিরোরোগ প্রভৃতি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
জালাপা	জালাপা

(এক্সোগোনিয়ম পর্গ্যানামক লতারকন্দ।)

মার্কিনখণ্ডে জন্মে।

চূর্ণ মাত্রা ১০—৩০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বিরেচক, কৃমিনাশক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। টিংচ্যুরা জালাপি	১—২ ড্রাম।
২। পলবিস জালাপি কম্পজিটম্	২০—৬০ গ্রেন।
৩। একষ্ট্রাক্টম জালাপি	৫—১০ গ্রেন।
৪। জালাপি রেজিনা	৪—৮ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, উদরি, কোষ্ঠবদ্ধ, মস্তিষ্কবিকার, এবং মহীলতার ন্যায় কৃমিরোগে।

(৩য়)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
পডফিলাই রেজিনা	রেজিন অব্ পডফিলম।

মাত্রা $\left\{ \begin{array}{l} \frac{১}{৬}—\frac{১}{৪} \text{ গ্রেন পরিবর্ত্তক।} \\ \frac{১}{৪}— \text{ ১ গ্রেন বিরেচক।} \end{array} \right.$

ক্রিয়া। পিত্তনিঃসারক, বিরেচক, শোষক, পরিবর্ত্তক, কচিৎ লালনিঃসারক ও রজোনিঃসারক, স্থানিক উগ্রতাসাধক।

আময়িক প্রয়োগ। যকৃতে রক্তাধিক্য, কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডু, উপদংশ ও জ্বরাদিরোগে।

(৪র্থ)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ফার্ব্বাইটিস সেমিনা	কালাডানাসীড।

(ফার্ব্বাইটীস নিলনামক লতারবীজ।)

চূর্ণমাত্রা $\frac{১}{২}$ হইতে ১ ড্রাম।

ক্রিয়া। বিরেচক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। একষ্ট্রাক্টম্ কালাডানি ... ... ৫—১০ গ্রেন।
২। টিংচ্যুরা কালাডানি ... ... ২—৪ ড্রাম।
৩। পলবিস কালাডানি কম্পজিটম ... ১০—৪০ গ্রেন।
৪। কালাডানি রেজিনা ... ... ৪—১০ গ্রেন।
আময়িক প্রয়োগ। জালাপের ন্যায়।

(৫ম)

লাটিন। ইংরাজী।
রিয়াই রেডিক্স। ... ... রুবর্ব্বরুট।

(রেউচিনি।)

(রিয়মনামক বৃক্ষের মূল।)

চীনদেশে জন্মে।

মাত্রা { ১ ৫ গ্রেন আগ্নেয়। ১০—৩০ গ্রেন বিরেচক।

ক্রিয়া। আগ্নেয়, বিরেচক, সঙ্কোচক, তিক্ত বলকারক।
প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। পলবিস রিয়াই কম্পজিটা ... ২০—৬০ গ্রেন।
২। সিরপস্ রিয়াই ... . ১—৪ ড্রাম।
৩। টিংচুরা রিয়াই { ১—২ ড্রাম আগ্নেয়, বলকারক, ৪ ড্রাম মাত্রায় বিরেচক।
৪। ভাইনম রিয়াই ... ... ১—২ ড্রাম।
৫। একষ্ট্রাক্টম্ রিয়াই ... ... ৫—২০ গ্রেন।
৬। ইনফিউজম্ রিয়াই ... ... ১—২ আউন্স।
৭। পাইলুলা রিয়াই কম্পজিটম্ ... ৫—১০ গ্রেন।
আময়িক প্রয়োগ। উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, অজীর্ণ, অম্বাত, স্ক্রুফিউলা, মেসেন্টিক্ গ্রন্থি বিবর্দ্ধণ, ইণ্ডোলেণ্ট—টিউমার, এবং পুরাতন ও দুষ্টক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

(৬ষ্ঠ)

লাটিন। ইংরাজী।
ওলিয়ম রেসিনি ... ... ক্যাষ্টর অইল।

(এরণ্ডতৈল।)

রিসিন্নস কমিউনিস নামক বৃক্ষের বীজের তৈল।

(মাত্রা $\frac{১}{২}$—২ আউন্স।)

ক্রিয়া। বিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ। অতিসার, উদরাময়, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শ, সীসশূল, ষ্ট্রিকচার, শূলরোগ, অশ্মরীরোগ, মূত্র-গ্রন্থি ও মূত্রাশয় প্রদাহ, অন্ত্র এবং অন্ত্রাবরন প্রদাহ রোগে।

(৭ম)

লাটিন।	ইংরাজী।
সেনা।	সেনা।

(সোনামুখী।)

চূর্ণমাত্রা $\frac{১}{২}$—২ ড্রাম।

ক্রিয়া। বিরেচক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। ইনফিউজম্ সেনি	১—২ আউন্স।
২। কনফেকশিয়ো সেনি	১—২ ড্রাম।
৩। সিরপস্ সেনি	১—৪ ড্রাম।
৪। টেংচ্যুরা সেনি	১—৪ ড্রাম।
৫। মিশ্চুরা সেনি কম্পাজিটা	১—২ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, কৃমিরোগ, অজীর্ণ, কোষ্ঠ-বদ্ধ, মস্তিষ্কেরক্তাধিক্য হইলে, জ্বর এবং প্রাদাহিকরোগে।

(৮ম)

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ম্যাগ্নেসি সলফাস।	সলফেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া।

মাত্রা ১—৮ ড্রাম।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, বিরেচক, শৈত্যকারক, এবং প্রদাহ নাশক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। এনিমা ম্যাগ্নেসি সলফেটিস ... (বাহ্য প্রয়োগার্থ।)

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর ও প্রাদাহিক রোগ, সিসদ্বারা বিষাক্ত, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং পোর্টেলসিস্টেমের কঞ্জেশ্চন হইলে।

(৯ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসি সলফাস। ... ... সলফেট অব্ পটাস।

মাত্রা ১৫—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। শৈত্যকারক, বিরেচক, ল্যাক্টিফিউজ (দুগ্ধরোধক,) ডিয়বষ্ট্রুয়েণ্ট।

পাইলুলা কলসিন্থিডিস কম্পজিটা, পলবিস ইপিকাকুয়ানি কম্পজিটস, পাইল্যুলা কলসিন্থিডিস এট হাইওসায়েসাই প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

(১০ম)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসি টার্ট্রাসএসিডা। ... এসিডটার্ট্রেট অব্ পটাস।

মাত্রা ২০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। বিরেচক, মূত্রকারক, শৈত্যকারক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, শোথ, ও প্রাদাহিক রোগে।

(১১শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

পটাসিটার্ট্রাস ... ... টার্ট্রেট্ অব্ পটাস।

মাত্রা { ১—২ ড্রাম মূত্রকারক।
২—৪ ড্রাম বিরেচক।

ক্রিয়া। মূত্রকারক, বিরেচক, শৈত্যকারক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বররোগ, মেনিয়া, হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস রোগে।

(১২শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সোডি সলফাস ... ... সলফেট্ অব্ সোডা

(ক্ষারলবণ।)

মাত্রা $\frac{১}{২}$—১ আউন্স।

ক্রিয়া। বিরেচক, মূত্রকারক, শৈত্যকারক।

আময়িক প্রয়োগ। জ্বর, ও প্রাদাহিক রোগ, কোষ্টবদ্ধ, এবং পিত্তশূল, প্রভৃতিতে।

(১৩শ)

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সোডি ফস্ফাস। ... ... ফস্ফেট অব্ সোডা।

মাত্রা { ২—৮ ড্রাম বিরেচক।
২০—৪০ গ্রেন মূত্রকারক, পরিবর্ত্তক।

ক্রিয়া। বিরেচক, মূত্রকারক, পরিবর্ত্তক, লিথনট্রিপটিক (অশ্মরী নাশক।)

আময়িক প্রয়োগ। জ্বররোগ, বিসূচিকারোগ, মূত্রে অম্লাধিক্য বা ফস্ফেটেরভাগ কমহইলে, রেকাইটিস, মলিসাস অনিয়ম, এবং ইউরিক অ্যাসিড দ্রবকরনার্থ।

[১৪শ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

সোডা টার্টারেটা ... ... টার্টারেটেড্ সোডা।

মাত্রা { ১—৪ ড্রাম বিরেচক।
৩০—৬০ গ্রেন মূত্রকারক।

ক্রিয়া। বিরেচক, শৈত্যকারক, মূত্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ। টার্টারেট অব্ পটাসের ন্যায় জ্বর ও প্রদাহাদিরোগে, কোষ্ঠবদ্ধ, পাণ্ডুরোগ, এবং অশ্মরী রোগ প্রভৃতিতে।

অতিবিরেচক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ক্যাম্বোজিয়া। ... ... গ্যাম্বোজ।

গার্সিনিয়া মোরেলা নামক বৃক্ষেরগঁদ এবং ধূনাযুক্ত রস।

চীন, ব্রহ্মরাজ্য, ভারতবর্ষ, এবং সিংহলদ্বীপে জন্মে।

মাত্রা ১——৪ গ্রেন।

ক্রিয়া। অতিবিরেচক, কৃমিনাশক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। পাইলুলা ক্যাম্বোজি কম্পাজিটা ··· ৫—১০ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, উদরি, কঠিন কোষ্ঠবদ্ধ, এবং ফিতার ন্যায়কৃমি রোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

কলোসিন্থিডিস পর্লপা। ... ... কলোসিন্থপল্প।

[ইন্দ্রবারুণী।]

সাইট্রুলগ কলোসিন্থিস নামক বৃক্ষের ফলের শস্য।

মাত্রা ২——১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। অতিবিরেচক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করে।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। একষ্ট্রাক্টম কলসিন্থিডিস কম্পজিটম }
২। পাইল্যুলা কলোসিন্থিডিস কম্পাজিটা } ৫—১০ গ্রেন।
৩। ,, ,, এট হাইওসায়েসাই }

আময়িক প্রয়োগ। কোষ্ঠবদ্ধ, উদরি, শোথ, অন্ত্রাবদ্ধ-রোগ, সংন্যাস এবং শিরোরোগ প্রভৃতিতে।

[৩য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ইলেটেরিয়ম ... ... ইলেটেরিয়ম।

একবোলিয়ম অফিসিনেরম বৃক্ষের ফলের রসের গাদ।

মাত্রা $\frac{১}{১৬}$ হইতে $\frac{১}{২}$ গ্রেন।

ক্রিয়া। অতিবিরেচক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।

১। পলবিস ইলাটেরিয়াই কম্পজিটা $\frac{১}{২}$ —৫ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, উদরি, কোষ্ঠবদ্ধ, শিরঃপীড়া, এবং সংন্যাস রোগে।

[৪র্থ]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

ওলিয়ম ক্রোটনিস্ ... ... ক্রোটন অইল।

[জয়পালের তৈল।]

ক্রোটন টিগলিয়ম বৃক্ষের বীজের তৈল।

মাত্রা $\frac{১}{২}$ হইতে ২ মিনিম।

ক্রিয়া। অতিবিরেচক, প্রত্যুগ্রতাসাধক, অধিকমাত্রায় প্রাদাহিক বিষক্রিয়া করে।

প্রয়োগরূপ।

১। লিনিমেণ্টম্ ক্রোটনিস্ ... [বাহ্য প্রয়োগার্থ।]

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, সংন্যাস, কোষ্ঠবদ্ধ, ধনুষ্টঙ্কার, উদরি, কাশরোগ, উন্মাদরোগ, পুরাতনবাত, ও পুরাতন সন্ধিরোগ, বক্ষ গহ্বরস্থ ব্যাধি এবং আক্ষেপ জনকরোগে।

[৫ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।

স্কেমোনিয়ম। ... ... স্কেমোনি

কনবল্‌বিউলস্‌ স্ক্যামোনিয়া নামক বৃক্ষের
মূলহইতে প্রাপ্তগঁদ এবং ধুনাযুক্তরস।
মাত্রা ৫—১০ গ্রেন।

ক্রিয়া। অতিবিরেচক।

প্রয়োগরূপ ... ... মাত্রা।
১। মিশ্চ্যুরা স্ক্যামোনিয়াই ... ... ॥০—২ আউন্স।
২। কনফেক্‌শিও স্ক্যামোনিয়াই ... ৩—১০ গ্রেন।
৩। পলবিস্‌ স্ক্যামোনিয়াই কম্পজিটা ১০—২০ গ্রেন।
৪। স্কেমোনি রেজিনা ... ... ৩—৮ গ্রেন।
৫। পাইল্যুলা স্কেমোনি কম্পজিটা ... ৫—১৫ গ্রেন।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ, মাস্তিস্কীয়রোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, উদরি, এবং কৃমিরোগে।

মৃদু বিরেচক ঔষধ সকলের বিবরণ।

[১ম]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
বেলা। ... ... বেল।

[বিল্ব]

ক্রিয়া। সঙ্কোচক, মৃদুবিরেচক, পোষক।

প্রয়োগরূপ ... . মাত্রা।
১। এক্‌ষ্ট্রাক্টমবেলি লিকুইডম্‌ ... .. ১—২ ড্রাম।

আময়িক প্রয়োগ। অতিসার, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধ, এবং অজীর্ণরোগে।

[২য়]

ল্যাটিন। ইংরাজী।
ম্যানা। ... ... ম্যানা।

[সীরখস্ত।]

ফ্রাক্সাইন্স রোটন্ডি ফোলিয়া বৃক্ষের ঘণীভূতরস।
মাত্রা ১—২ গ্রেন।

ক্রিয়া। পোষক, মৃদুবিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ। সদ্যপ্রসূত শিশুদিগের বিরেচনার্থ, এবং শৈশবাবস্থায়, দৌর্ব্বল্যাবস্থায়, ও গর্ভাবস্থায় বিরেচন জন্য ব্যবহৃত হয়।

[৩য়]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ট্যামারিণ্ডস	ট্যামারিণ্ড।

[তেঁতুল]

মাত্রা ২—৮ ড্রাম।

ক্রিয়া। শৈত্যকারক, মৃদুবিরেচক, পোষক।

আময়িক প্রয়োগ। অতিসার, জ্বর, পিউট্রিড্ ফিবার এবং পীত্তাধিক্য হইলে।

(৪র্থ]

ল্যাটিন।	ইংরাজী।
ম্যাগ্নেসি কার্ব্বনাস	কার্ব্বনেট অব্ ম্যাগ্নিসিয়া।

মাত্রা ১০—৬০ গ্রেন।

ক্রিয়া। মৃদুবিরেচক, অম্লনাশক।

প্রয়োগরূপ	মাত্রা।
১। লাইকর ম্যাগনিসিয়া কার্ব্বনেটিস্ ...	১—২ আউন্স।
২। ,, ,, সাইট্রেটীস্ ...	৫—১০ আউন্স।

আময়িক প্রয়োগ। অম্লজনিত বকজ্বালা ও বমন, গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণার্থ, প্রস্রাবে অম্লাধিক্য, বাত, গাউট দাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে, শৈশবাবস্থায় বিরেচনার্থ, এবং এক্জীমা প্রভৃতি চর্ম্মরোগে।

একবিংশ অধ্যায়।

(কোষ্ঠকারক ঔষধ সকল)

এমপ্লাষ্ট্রম ক্যান্থারিডিস, এমপ্লাষ্ট্রম সিনেপিস, এসিডম্ কাম্বরিডিস্, এসিডম্ এসিটিকম্ গ্লাসিয়েল, লাইকর্ এমোনি কসিয়ম্।

(জলনিঃসারক ঔষধ সকল)

মেজিরিয়ম, পাইপর নাইগ্রম, পাইরিথ্রাই রেডিক্স, ট্যাবেসাই

কালিয়া, জিঞ্জার, ক্যাপসিকম্ ফ্রুট, আর্মোরেসি রেডিক্স, সিনে-পিস, পটাসিয়াই আইওডাইডম্, হাইড্রার্জাইরম।

স্পর্শহারক ঔষধ সকল।

ইথর্, ক্লোরফর্ম্ম,, ওপিয়ম, বেলেডোনা, অ্যাকোনাইট, রেক্টিফায়েড স্পিরিট

পর্য্যায় নিবারক ঔষধ সকল।

আর্সেনিক্, কুইনাইন্, সিঙ্কোনা, ষ্ট্রিকনিয়া, বেবিরীয়া, স্যালিসিনম, বঙ্গুসেসিনা

(কামোদ্দীপক ঔষধ সকল)

নক্সভমিকা, ষ্ট্রীকনিয়া, ক্যান্থারিডিস, মস্কস, ক্যাষ্টোরিয়ম, ক্যানেবিস ইণ্ডিকা, ওলিয়ম টেবেবিস্থিনি, ওপিয়ম, ওয়াইন, অ্যাসাফোটিডা, অ্যারোমেটিক, ফস্ফরস, কেশরঘটিত ঔষধ।

(কামনাশক ঔষধ সকল)

ব্রোমাইড অব্ পটাসিয়ম, ডিজিটেলিন, ক্যাম্ফর, ভেমেজক, প্রভৃতি।

(অশ্মরী নাশক ঔষধ সকল)

অ্যাসিডম্ ফস্ফরিকম, এসিডম্ বেঞ্জোইকম্ অ্যামোনি বেঞ্জোয়াস, পটাসি অ্যাসিটাস, পটাসি কার্ব্বনাস, পটাসি বাইকার্ব্বনাস, পটাস সাইট্রাস, লাইকর্ পটাসি, লাইকর্ সোডি, লাইকর্ ক্যাল্সিস, লিথি কার্ব্বনাস, লিথি সাইট্রাস, সোডি ফস্ফস, সোডি বাইকার্ব্বনাস, সোডি সিট্রোটার্ট্রাস এফারভেসেন্স, লাইকর লিথি এফারভেসেন্স।

(আক্ষেপ নিবারক ঔষধ সকল)

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, ক্যাষ্টোরিয়ম, ক্লোরোফর্ম্ম, কোনিয়াই ফ্রুক্টস, ওপিয়ম, আর্জেন্টাই অক্সাইডম, অর্জেন্টাই নাইট্রাস, অ্যামোনি লাইকর্, অ্যামোনি কার্ব্বনাস, অ্যামোনায়েকম, অ্যাসাফিটিডি, ইথর সলফিউরিকস, জিনসাই ভেলিরিয়েনাস, জিনসাই সলফাস, বেবিরাই ক্লোরাইডম্, মস্কস, ষ্ট্র্যামোয়াই, হাইওসায়েমাই, মর্ফিয়া, ভেলিরিয়েনি রেডিক্স, ওলিয়ম ক্যাজুপটি,

ওলিয়ম ক্যারিওফাইলম্, ওলিয়ম টেরেবিন্থিনি, ওলিয়ম ম্নিডা ওলিয়ম মেন্থাপিপরিটি, ল্যাভেণ্ডিউলি, প্রভৃতি ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

কোন্২ ঔষধের সহিত কোন্২ ঔষধ প্রয়োগ নিষেধ, অর্থাৎ অসম্মিলন ।

১ । (কাইনো)

অসম্মিলন ।

ক্ষার, দ্রাবক, সল্‌ফেট্ অব্ আয়রণ, নাইট্রেট্ অব্ সিলভার টার্‌টার এমেটিক, করেশিব সবলিমেট ইত্যাদির সহিত প্রয়োগ নিষেধ ।

২ । (পেল্‌ক্যাটিকিউ ।)

অসম্মিলন । মর্ফিয়া, অ্যাকোয়া ক্যালসিস, নাইটর্, ক্রট কিরি, অগুলাল, ইপিকাকুয়ানা, এবং ধাতব লবণ ইত্যাদি সহিত প্রয়োগ করিবে না ।

৩ । (র‍্যাটানিরুট ।)

অসম্মিলন । একোয়া ক্যালসিস, দ্রাবক, লৌহ ঘটিত লবণ শুগার অব্‌লেড, আইওডিন, এবং জেলেটিন সংযুক্ত দ্রব সকলে সহিত নিষিদ্ধ ।

৪ । (বেয়ার বেরিলিভস্ ।)

অসম্মিলন ।

লৌহ ও সীসধাতু ঘটিত লবণ, নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌ভার, টার্টা এমেটিক, ডিকক্‌সন্ সিনকোনা, প্রভৃতি ।

৫ । (সুগার অবলেড ।)

অসম্মিলন ।

এমোনি কার্ব্বনাস, সির্কাম্ল ভিন্ন সমুদয় দ্রাবক ও অ লবনাম্ব, ষ্ট্রিক্‌নিয়া, গঁদ সংযুক্ত ফান্ট, লাইকর্ এমোনি এসিটে টিস, কার্ব্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নিসিয়া, আইওডাইড্ অব্ পটাশিয় প্রভৃতি ।

৬। (ক্যাস্কারিলি কর্টেক্স।)

অসম্মিলন।

লৌহ, দস্তা, সীস; রৌপ্য, রসাঞ্জন ঘটিত লবণের সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

৭। (সিঙ্কোনা বার্ক।)

অসম্মিলন।

টার্টার এমেটিক, লৌহ, সীস, ও রৌপ্য ঘটিত ঔষধাদি, লাইকর্ আর্সেনিকেলিস প্রভৃতি।

৮। (মিউরিয়াটিক অ্যাসিড।)

অসম্মিলন।

ক্ষার, ম্যাগ্নিসিয়া, লবণ দ্রাবক সংযুক্ত সমুদায় লবণ ভিন্ন সমুদায় লবণ।

৯। (নাইট্রিক অ্যাসিড)

অসম্মিলন।

ক্ষার, ও ক্ষারকার্ব্বনেট্, এবং এসিটেট্, ধাতব অক্সাইড্, হিরাকস, অঙ্গার, শর্করা, সুরা এবং বায়ি তৈল ইত্যাদি।

১০। (সলফিউরিক অ্যাসিড।)

অসম্মিলন।

ক্ষার ও ক্ষারকার্ব্বনেট, ধাতুঘটিত সমস্ত অক্সাইড, সীসশর্করা, বেরাইটা, ক্লোরাইড্ অব্ ক্যালসিয়ম প্রভৃতি।

১১। (নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার।)

অসম্মিলন।

নাইট্রিক অ্যাসিড ভিন্ন সমুদায় দ্রাবক, অম্ল ও তৎসংযুক্ত লবণ, ক্ষার ও ক্ষারকার্ব্বনেট্, পরিশ্রুত জলভিন্ন অন্যজল, ক্লোরিণ এবং তৎসংযুক্ত লবণ, উদ্ভিজ্জ সঙ্কোচক, অণ্ডলাল, ও দুগ্ধ ইত্যাদির সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

১২। (সলফেট্ অব্ কপার।)

অসম্মিলন।

ক্ষার ও ক্ষারকার্ব্বনেট্, গন্ধক দ্রাবকভিন্ন সমুদায় দ্রাবক ও অম্ল, সীস, রৌপ্য, পারদ, ও ক্লোরিণ সংযুক্ত লবণ, উদ্ভিজ্জ ফান্ট ও কাথ বা অরিষ্টের সহিত নিষিদ্ধ।

১৩। (ফেরিআইওডাইড।)

অসম্মিলন।

ক্ষার, অম্ল, অধিকাংশ ধাতু ঘটিত লবণ, উদ্ভিজ্জ কষা দ্রব্য ও শ্বেতসার ইত্যাদি।

১৪। (ফেরিসল্ফাস।)

অসম্মিলন।

ক্ষার ও ক্ষারকার্ব্বনেট্, গন্ধক দ্রাবক ভিন্ন সমুদায় দ্রাবক, অধিকাংশ ধাতবলবণ, ট্যানিন ও গ্যালিক অ্যাসিড এবং তৎসংযুক্ত দ্রব্যাদির সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

১৫। (লাইকর্ ফেরি পর্ক্লোরাইড ফর্সিয়র।)

অসম্মিলন।

ক্ষার ও ক্ষারকার্ব্বনেট্, চর্ণেরজল, সীস এবং রৌপ্য ঘটিত লবণ, গঁদ, ট্যানিন ও গ্যালিক অ্যাসিড ইত্যাদির সহিত প্রয়োগ করিবেনা।

১৬। (সলফেট্ অব্ জিঙ্ক)

অসম্মিলন।

ক্ষার ও ক্ষারকার্ব্বনেট্, সীসশর্করা, নাইট্রেট্ অব্ সিলভার, এবং উদ্ভিজ্জ সঙ্কোচকদিগের সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

১৭। [অক্সাইড্ অব্ জিঙ্ক।]

অসম্মিলন।

অম্ল, অম্লাধিক লবণ, এবং ক্ষার সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

১৮। (ক্লবস্)

অসম্মিলন।

লৌহ, দস্তা, সীস, রৌপ্য, রসাঞ্জন ধাতু ঘটিত লবণ ইত্যাদির সহিত নিষেধ।

১৯। (কার্ব্বনেট্ অব্ এমোনিয়া।)

অসম্মিলন।

দ্রাবক, এমোনিয়া ভিন্ন ক্ষার, টার্ট্রেট্ ভিন্ন সমুদায় লৌহ ঘটিত লবণ, সীস শর্করা, কর্ট্কার ক্যালোমেল এবং রসকর্পূর ইত্যাদি।

২০। [লাইকর্ এমোনি ফর্সিয়র।]

অসম্মিলন।

দ্রাবক, লবণ, অম্ল, চুণ, বেরাইটা ভিন্ন ক্ষার।

২১। [বেলাডোনা।]

অসম্মিলন।

ক্ষার, লাইকর পটাশি, এবং উদ্ভিজ্জ সঙ্কোচক সহযোগে অবিধেয়।

২২। [সাইট্রিক এসিড।]

অসম্মিলন।

ক্ষার, ক্ষারকার্ব্বনেট্, সলফেট্ টার্ট্রেট্ এবং এসিটেট্ ইত্যাদির সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

২৩। [টার্টারিক অ্যাসিড।]

অসম্মিলন।

ক্ষার, কার্ব্বনেট, দ্রাবক, চুণ. সীস, এবং রৌপ্য ঘটিত লবণ প্রভৃতি।

২৪। [টার্টারেটেড্ এণ্টিমোনি।]

অসম্মিলন।

অম্ল, ক্ষার, ক্ষারকার্ব্বনেট্, হাইড্রোসল্ফিউরিক্ অ্যাসিড, সংযুক্ত লবণ, সীসধাতু ঘটিত লবণ, ট্যানিন এবং গ্যালিক অ্যাসিড সংযুক্ত উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

২৫। (ডিজিটেলিস।)

অসম্মিলন।

লৌহ এবং সীস ঘটিত লবণ, এবং ট্যানিনযুক্ত উদ্ভিজ্জাদির সহিত ব্যবহার নিষিদ্ধ।

২৬। (ব্রোমাইড্ অব্ পটাশিয়ম)

অসম্মিলন।

ক্ষার, অম্ল এবং বিবিধ ধাতবলবণ সহযোগে অবিধেয়।

২৭। (ক্লোরাইড্ অব্ ক্যালসিয়ম)

অসম্মিলন।

লবণদ্রাবক ভিন্ন সমুদায় দ্রাবক, এমোনিয়া ভিন্ন সমুদায় ক্ষার, এবং ক্ষার কার্ব্বনেট সহিত প্রয়োগ করিবে না।

২৮। (মিউরিয়েট অব্ অ্যামোনিয়া)

অসম্মিলন।

ক্ষার, অম্ল, সীস, ও রৌপ্য ঘটিত ঔষধাদির সহিত প্রয়োগ অবিধেয়।

২৯। [ক্যালোমেল]

অসম্মিলন।

ক্ষার, ক্ষার কার্ব্বনেট্ লৌহ, অম্ল, সীস ও তাম্রআদি ধাতুঘটিত লবণ, ক্লোরিণ, হাইড্রো সলফিউরিক অ্যাসিড যুক্ত ঔষধাদির সহিত অবিধেয়।

৩০। [করোসিব্ সব্লিমেট]

অসম্মিলন।

ক্ষার ও ক্ষার কার্ব্বনেট, লবণদ্রাবক ভিন্ন সমুদায় দ্রাবক, টার্টার এমেটিক, নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার, সুগারঅব্লেড্, আইওডিন সংযুক্ত ঔষধ, উদ্ভিজ্জ সঙ্কোচক, এবং অণ্ডলাল ইত্যাদির সহিত প্রয়োগ নিষেধ।

৩১। [আইওডাইড্ অব্ পটাশিয়ম্]

অসম্মিলন।

অম্ল এবং ধাতু ঘটিত লবণ, ইত্যাদির সহিত অবিধেয়।

৩২। (ম্যাগ্নিসিয়া।

অসম্মিলন।

অম্লাধিক লবণ, ফট্কিরি, ধাতু ঘটিত লবণ, এবং নিসাদল ইত্যাদি সহিত নিষেধ।

৩৩। (সেনা)

অসম্মিলন।

দ্রাবক, ক্ষারকার্ব্বনেট্, চুণের জল, সীস, রৌপ্য এবং তাম্র ঘটি লবণ, রসকর্পূর, টার্টার এমেটিক, এবং পীত সিঙ্কোনার সহি অবিধেয়।

৩৪। (ম্যাগ্নিসিয়া সল্ফাস্)

অসম্মিলন।

গন্ধকদ্রাবক ভিন্ন সমুদায় দ্রাবক, ক্ষার ও ক্ষার কার্ব্বনেট্, চুণে জল, ক্লোরাইড্ অব্ ক্যালসিয়ম, সীস শর্করা, ইত্যাদি সহযো নিষিদ্ধ।

৩৫। (এসিড্ টার্টেট্ অব্ পটাশ)

অসম্মিলন।

দ্রাবক, অম্লাধিক লবন, ক্ষার ও ক্ষার কার্ব্বনেট্, সীস, রৌপ্য এ তাম্রঘটিত লবণ ইত্যাদির সহিত নিষিদ্ধ।

৩৬। [ফস্ফেট্ অব্ সোডা]

অসম্মিলন।

দ্রাবক, ধাতব এবং ক্ষারলবণ ইত্যাদি।

৩৭। [লাইকর্ এমোনিয়া এসিটেটিস্]

অসম্মিলন।

ক্ষার, ক্ষারকার্ব্বনেট্, অম্ল, ফটকিরি, চুণের জল, সীসশর্করা, এবং হিরাকস সহযোগে প্রয়োগ অবিধেয়।

৩৮। [গম্ এরকেসিয়া]

অসম্মিলন।

তীব্র, ধাতবঅম্ল, সুরাবীর্য্য, ইথর, সবএসিটেট্ অব্ লেড্, টিংফেরি, স্ফেস্কুই, ক্লোরাইড্ ও অন্যান্য অরিষ্ট প্রভৃতি।

৩৯। [লাইকর্ পটাসি]

অসম্মিলন।

অম্ল, অম্লাধিক লবণ, রসকর্পূর, ক্যালোমেল, ধুতরা, হেনবেন, এবং বেলাডোনা প্রভৃতি সহযোগে প্রয়োগ করিবে না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

প্রস্তুত করণ।

১।

(গল্ অয়াইন্টমেন্ট ;)

মাজুফল চূর্ণ ... ৮০ গ্রেন।
রেপ্লোয়েটেড্ লার্ড ১ আউন্স।

উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মিলাইয়া লইবে।

২য়।

[আইওডিন অয়াইন্টমেন্ট]

আইওডিন পিণ্ডর ... ৩২ গ্রেন।
পটাস আইওডাইড ৩২ গ্রেন।
প্রুফ স্পিরিট্ ... ১ ড্রাম।
প্রিপেয়ার্ড লার্ড ... ২ আউন্স।

আইওডিন ও পটাস আইওডাইড্ প্রথমে প্রুফ স্পিরিটের সহিত ঘর্ষন করিয়া শেষে লার্ড মিশাইবে।

৩য়।

[একোনাইট অয়াইন্টমেন্ট।]

একোনাইট চূর্ণ ... ৮ গ্রেন।
স্পিরিট্ রেক্টিফায়েড্ ॥০ ড্রাম।
প্রিপেয়ার্ড লার্ড ১ আউন্স।

একোনাইট্কে স্পিরিটে মিশাইয়া লার্ড সংযোগ করিবে।

৪র্থ।

(রেজিন অয়াইণ্টমেন্ট।)

রেজিন ... ... ৪ আউন্স।
ইয়েলো ওয়াক্স ... ২ আউন্স।
সিম্পল অয়াইন্টমেন্ট ৮ আং।

একত্র মৃদু সন্তাপে গলাইয়া ফ্লানেলযন্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া শীতল হওন-পর্য্যন্ত অনবরত আবর্ত্তন করিবে।

৫ম।

(সালফার অয়েণ্টমেণ্ট।)

সালফার ... ... ৪ ড্রাম।
বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ২ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত কর।

৬ষ্ঠ।

(বেলাডোনা অয়েন্টমেণ্ট।)

একষ্ট্রাক্ট বেলাডোনা ৮০ গ্রেন।
প্রিপেয়ার্ড লার্ড ১ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

৭ম।

(বোরাসিক অয়েন্টমেন্ট।)

এসিড বোরাসিক ... ৮০ গ্রেন।
বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ১ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

৮ম।

স্যাবাইন অয়েন্টমেন্ট।

স্যাবাইন পাউডার ২ আউন্স।
ইয়েলো অয়াক্স ... ৬ ড্রাম।
প্রিপেয়ার্ড লার্ড... ৪ আউন্স।

বসাওমোম গলাইয়া তাহাতে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সেবাইন ভিজাইয়া পরে ছাঁকিয়া লইবে।

৯ম।

বিনি ও ডাইড অব মর্কুরি অয়াইন্টমেন্ট।

হাইড্রার্জ বিনিওডাইড ১৬ গ্রেন
বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ১ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

১০ম।

(জিঙ্ক অযেন্টমেণ্ট।)

জিনসাই অক্সাইড ৮০ গ্রেন।
লার্ড .... ১ আউন্স।

একত্র মিশাইয়া লইবে।

১১শ।

(এসিড নাইট্রিক ডাইলিউট।)

এসিড নাইট্রিক ষ্ট্রং ১ আউন্স।
পরিশ্রুত জল ... ৫ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

১২শ।

এসিড সলফিউরিক ডাইলিউট।

এসিড সলফিউরিক ষ্ট্রং ১ আং।
পরিশ্রুত জল ১৩ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

১৩শ।

(এসিড অ্যাসিটিক ডাইলিউট।)

এসিটিক অ্যাসিড ১ আউন্স।
পরিশ্রুত জল ... ৭ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

১৪শ।

(এসিড মিউরিয়াটিক ডাইলিউট)

মিউরিয়াটিক অ্যাসিড ১ আং।

পরিশ্রুত জল ... ৩ আউন্স।
মিশ্রিত করিয়া লইবে।

১৫শ।

এসিড্ নাইট্রোমিউরিয়াটিক ডাইলিউট।
এসিড্ নাইট্রিক্ষ্ট্রং ৩ আউন্স।
এসিড্ মিউরিয়াটিক্ষ্ট্রং ৪ আং।
পরিশ্রুত জল ... ২৫ আউন্স।
মিশ্রিত করিয়া ২৪ ঘন্টার পর ব্যবহার্য্য।

১৬শ।

[টিং আইওডিন কম্পাউণ্ড।]

আইওডিন ...... ১ ড্রাম।
পটাস আইওডাইড্ ৷৷০ ড্রাম।
স্পিরিট রেকটিফায়েড্ ৫ আং।
ভিজাইয়া লও।

১৭শ।

লিনিমেন্ট ক্যাম্ফর।

ক্যাম্ফর ... ... ২ ড্রাম।
অলিব্ অয়েল ... ... ১ আং
দ্রব করিয়া লইবে।

১৮শ।

[লিনিমেন্ট ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড।]

ক্যাম্ফর ... ... ১০ ড্রাম।
লাভেণ্ডার অয়েল ... ৷০ ড্রাম।
লাইকর্ এমনষ্ট্রং ২৷০ আউন্স।
স্পিরিট রেকটিফায়েড ৭৷৷০ আং।
কর্পূর ও ল্যাভেণ্ডার্ অয়েল সুরাতে দ্রব করিয়া ক্রমশ মিলাইবে।

১৯শ।

(লিনিমেন্ট ওপিয়াই।)

টিং ওপিয়ম ...... ১ আউন্স।
লিনিমেণ্ট স্যাপনিস্ ১ আউন্স।
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২০শ।

(লিনিমেন্ট অ্যামোনিয়া।)

লাইকর্ অ্যামোনিয়া ১ আউন্স।
জলপাইয়ের তৈল ৩ আউন্স।
একত্র অালোড়ন দ্বারা মিশাইবে।

২১শ।

লিনিমেন্ট ক্লোরফর্ম।)

ক্লোরফর্ম্ম পিওর ... ১ আউন্স।
লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফর ১ আউন্স।
মিশাইয়া লও।

২২শ।

[লিনিমেন্ট আইওডিন।]

আইওডিন ... ... ৫ ড্রাম।
পটাস আইওডাইড্ ২ ড্রাম।
ক্যাম্ফর .... ১ ড্রাম।
স্পিরিট্ রেকটিফায়েড্ ৫ আং।
একত্র মিলাইয়া লইবে।

২৩শ

(স্পিরিট ক্যাজুপটি।)

ক্যাজুপট অয়েল ... ১ আউন্স।
রেকটিফায়েড্ স্পিরিট ৪৯ আং।
মিশাইয়া লও।

২৪শ।

(স্পিরিট্ ক্যাম্ফর।)

ক্যাম্ফর ... ... ১ আউন্স।

স্পিরিট রেকটিফায়েড ৯ আং।
দ্রব করিয়া লও।

২৫শ।

(স্পিরিট ক্লোরোফর্ম।)

ক্লোরফর্ম ... ... ১ আউন্স।
রেকটিফায়েড স্পিরিট ১৯ আং।
দ্রব করিয়া লও

২৬শ।

(স্পিরিট পিপরমিন্ট।)

অয়াইল মেন্থপীপ ১ আউন্স।
স্পিরিট রেকটিফ য়েড ৪৯ আং।
দ্রব করিয়া লইবে।

২৭শ।

(চক মিকশ্চর।)

প্রিপেয়ার্ড চক ...... ২ ড্রাম।
গমএকেসিয়া ...... ২ ড্রাম।
সিরপ ... ... ৪ ড্রাম।
একোয়া সিনেমম ৭॥০ আউন্স।
একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২৮শ।

(ডিকক্সন লিনসীড।)

লিনসীড ... ... ১ আউন্স।
লিকরিশরুট ... ... ৪ ড্রাম।
পরিশ্রুত জল ... ১।০ পাইন্ট।
১০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া শীতল হইলে কাপড়দ্বারা ছাঁকিবে।

২৯শ।

ডিকক্সন সিনকোনা।

সিনকোনা বার্কচূর্ণ ১ আউন্স।
জল .... ১৬ আউন্স।
১০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে।

৩০শ।

(ডিকক্সন সারসা।)

জেমেকাসারসা প্যারিলা ২॥০ আং
হট ওয়াটর ১॥০ পাইন্ট।
আবৃতপাত্র মধ্যে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া পরে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে শেষ এক পাইণ্ট।

৩১শ।

(ইনফিউজম কলম্বা।)

ক্যালম্বি রেডিক্স ...... ২ ড্রাম।
জল ... ... ৫ আউন্স।
এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩২শ।

(ইনফিউজম সেনেগা।)

সেনেগা রূট ... ১ আউন্স।
স্ফুটিত জল ... ১ পাইন্ট।
এক ঘন্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৩শ।

(ইনফিউজম সেনা।)

সোনামুখী .. ১ আউন্স।
শুণ্টি ... ... ॥০ ড্রাম।
স্ফুটিত জল ... ১০ আউন্স।
আবৃত পাত্র মধ্যে এক ঘন্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৪শ।

(ইন ফিউজম লিনসীড।)

তিসি ... ... ১৬০ গ্রেন

যষ্টিমধু কুট্টিত ...... ১ ড্রাম
স্ফুটিত জল ... ১০ আউন্স।
আবৃত পাত্র মধ্যে ৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৫শ।

(ইনফিউজম্ বুকু।)

বকু ফোলিয়া ... ৪ ড্রাম।
স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১০ আং।
এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৬শ।

(ইনফিউজম্ চিরেটা।)

চিরতা কুট্টিত ...... ১ ড্রাম।
জল .... ৫ আউন্স।
অৰ্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৭শ।

(ইনফিউজম্ ডিজিটেলিস।)

ডিজিটেলিস ফোলিও ॥০ ড্রাম।
স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১০ আং।
অৰ্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৮শ।

(ইনফিউজম্ ম্যাটিকোলিভস্)

ম্যাটিসি ফোলিও ॥০ আউন্স।
স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১০ আং।
অৰ্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৩৯শ।

ইনফিউজম্ ক্যাটিকিউ।

ক্যাটিকিউ চূর্ণ ... ২ ড্রাম।
সিনেমম্ পাউডর ॥০ ড্রাম।
স্ফুটিত জল ... ১০ আউন্স।
অৰ্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৪০শ।

(ডোভর্স পৌডর্।)

পল্ভ্ ইপিক্যাক ... ৬ গ্রেন।
সল্‌ফেট্ অব্ পটাশ্ ৪৮ গ্রেন।
পল্ভ্ ওপিয়াই ... ৬ গ্রেন।
একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে।

৪১শ।

(পল্ভ্ কাইনো কম্পাউণ্ড।)

কাইনো চূর্ণ ... ৩৷৶০ আং।
অহিফেন চূর্ণ ... ২ ড্রাম।
দারুচিনি চূর্ণ ... ১ আং।
একত্রে উত্তমরূপে মিশাইবে।

৪২শ।

(সেডলিজ পাউডর্।)

সোডিপটাশিও টার্ট্রাস ২ ড্রাম।
সোডিবাই কার্ব্ব ৪০ গ্রেন।
দুই আউন্স জলে দ্রব করিয়া তাহার সহিত ৩০ গ্রেন সাইট্রিক বা টার্টারিক অ্যাসিড মিলাইবে ফুটিয়া উঠিলে খাইবে।

৪৩শ।

[লাইকর্ অ্যামোনিয়া এসিটেটিস্]

এসিড্ অ্যাসিটিক ... ৫ আউন্স।
এমোনি কার্ব্বনাস (যথাপ্রয়োজন)
প্রথমে অ্যাসিডের সহিত অ্যা-

মোনিয়া মিশ্রিত কর, যে পর্য্যন্ত সমক্ষারাম্ল না হয় পরে এক ভাগে পাঁচ ভাগ হিসাবে ২৫ আউন্স জল মিশ্রিত কর।

৪৪শ।

(একোয়া ক্লোরফর্ম্ম)

ক্লোরোফর্ম্ম ... ... ॥০ ড্রাম।
পরিশ্রুত জল ... ১২ আউন্স।

একত্র করিয়া এক পাইন্ট বোতলে উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া আলোড়ন করিবে যে পর্য্যন্ত ক্লোরোফর্ম্ম সম্পূর্ণ দ্রব না হয়।

৪৫শ।

(একোয়া ক্যাম্ফর)

ক্যাম্ফর ... ... ॥০ আউন্স।
পরিশ্রুত জল ... ১ গ্যালন।

কর্পূরকে এক খণ্ড বস্ত্রে বাঁধিয়া ভিজাইবে প্রয়োজন মতে জল ঢালিয়া লইবে।

৪৬শ।

(ইনফিউজম আর্গোটিনা)

আর্গট চূর্ণ ... ... ২ ড্রাম।
স্ফুটিত পরিশ্রুত জল ১০ আউন্স

অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত আবৃত পাত্র মধ্যে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

৪৭শ।

(ইনফিউজম্ কোয়াসিয়া]

কোয়াসিয়া উড্ ... ১ ড্রাম।
জল ... .. ১ আউন্স।

আবৃত পাত্র মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে

৪৮শ।

(এগ্ মিক্‌শ্চর)

ব্র্যাণ্ডি ... ... ৪ আং।
সিনেমন্ ওয়াটর ... ৪ আং
মুরগী অণ্ডের কুসুম ... ২ টি
সুগার ... ... ৪ ড্রাম

একত্র উত্তম রূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ॥০-১॥ আং

৪৯শ।

(ব্ল্যাক ওয়াস)

ক্যালোমেল ... ... ৩ গ্রেন
লাইম ওয়াটর ... ১ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন দ্বারা মিশাইবে।

৫০শ।

[ইয়েলো ওয়াস]

করোসিব সব্লিমেট ১৮ গ্রেন।
লাইম্ ওয়াটর ... ১০ আউন্স।

মিশ্রিত করিয়া লইবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

নিম্ন লিখিত ঔষধদিগের দ্বারায় বিষাক্ত হইলে বিষনাশার্থ যে যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিবরণ।

[Antidotes.]

(১ম)

হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।

বিষঘ্ন। এমেটীক, বিষনাশার্থ কার্ব্বনেট্ অব্ পটাশ, টিংফেরি পর্ক্লোরাইড্, এতদ্ভিন্ন এমোনিয়া ও ক্লোরিন সেবন করাইবে ও বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া আঘ্রাণ করাইবে।

(২য়)

বেলাডোনা।

বিষঘ্ন। বিরেচক ও বমনকারক ঔষধ। বিষনাশার্থ উদ্ভিজ্জ অম্ল, মাজুফলের ক্বাথ, গ্রীন, চা, লাইকর্ পটাশি, লাইকর্ সোডি, একোয়া ক্যালসিস, এতদ্ভিন্ন মস্তক মুণ্ডণ করিয়া শৈত্যপ্রয়োগ, অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক।

(৩য়)

ওপিয়ম।

বিষঘ্ন। বমনকারক ঔষধ, ষ্টম্যাকপাম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত, মস্তকে ক্রমাগত শীতল জলধারা, অবসন্নাবস্থায় অ্যামোনিয়া, ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি উত্তেজক। বক্ষ, উদরে, অধশাখায় সর্ষপেরপটি, পৃষ্ঠবংশে ইলেক্‌ট্রিসিটি এভিন্ন বেলাডোনা, ষ্ট্র্যামোনিয়ম, ব্রোমাইড্ প্রভৃতি আভ্যন্তরিক।

[৪র্থ]

টার্টার এমেটিক।

বিষঘ্ন। দুগ্ধ ও জল-পানদ্বারা বমন উত্তেজিত করিবে। ডিকক্‌সন ওকবার্ক, ওপিয়ম, গ্যালিক এবং ট্যানিক অ্যাসিড্, টিংগলস টিং ও ডিঃ সিনকনা আভ্যন্তরিক।

(৫ম)

ফস্ফরস।

বিষঘ্ন। মিউসিলেজ ও ডিম্বের শ্বেতাংশযুক্ত পানীয় অধিক পরিমাণে পান করাইয়া বমন উত্তেজিত করিবে, পূর্ণমাত্রায় ম্যাগ্নিসিয়া তৈলব্যবহার নিষিদ্ধ।

(৬ষ্ঠ)

আইওডিন।

বিষঘ্ন। বমনকারক ঔষধ, এরারুট, ষ্টার্চ্চ, অন্নমণ্ড। যতক্ষন আই-ওডাইড্ ষ্টার্চবৎ বমন নাহয় সে পর্য্যন্ত ষ্টার্চসেবা, এমোনিয়া, পটাশ, সোডা ও তাহাদের কার্ব্বনেট্ ভিনিগার ও জল, বার্লি ওয়াটর্, লেবুররস, বিবিধ প্রকার তৈলপান। নাইট্রেট্, সল-ফেট্, ও এসিড টার্ট্রেট্ অব্ পটাশ, এতদ্ভিন্ন স্নিগ্ধপানীয়।

(৭ম)

আর্সেনিক্।

বিষঘ্ন। বমনকারকঔষধ, ষ্টম্যাকপম্প, মিউসিলেজ ও ডিমের শ্বেতাংশযুক্ত পানীয় দ্বারা বমন। দুগ্ধ, ঘৃত, কাঁচাডিম্ব, চুণেরজল, অলিভ অয়েল, ক্যাষ্টরঅয়েল, জান্তব অঙ্গার, ক্যালসাইণ্ড— ম্যাগ্নিসিয়া, ফেরিঅক্সাইডম্ হাইড্রেটম্, উত্তেজক, ওপিয়ম, কোনায়ম, হেন-বেন ইত্যাদি।

(৮ম)

করোসিব্ সব্লিমেট্।

বিষঘ্ন। বমন উত্তেজিত করিবে, য়্যালবুমেন ও গ্লুটেন, ডিম্বের শ্বে-তাংশ, ময়দা, দুগ্ধ, স্নিগ্ধপানীয়, বরফ, য়্যালম ও মহ গার্গল্, ট্যানিন, বোরাক্স ও ক্লোরিনেট্ সোডা গার্গল, ওপিয়েটম, ক্লোরেট্ অব পটাশ, আইওডাইড্ অব্ পটাশিয়ম ইত্যাদি।

(৯ম)

নাইট্রেট অব্ সিলভার।

বিষঘ্ন। লবণ, বমন না হইতে থাকিলে বমনকারক ঔষধ।

(১০ম)

নক্সভমিকা, ষ্ট্রিক্নিয়া, ব্রুসিয়া।

বিষঘ্ন। ষ্টম্যাকপম্প, বিরেচক পীচ্কারি, অলিভ অয়েল্, এনিমেল চারকোল, ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রান দ্বারা আক্ষেপ নিবারণ।

(১১শ)

অ্যাকোনাইট।

বিষঘ্ন। বমনকারক ও বিরেচক, বিষনাশার্থ জান্তব অঙ্গার, ট্রংকফি, অ্যামোনিয়া, ব্র্যাণ্ডি, শাখাদ্বয় মর্দ্দন, কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস।

(১২শ)

ষ্ট্র্যামোনিয়ম।

বিষঘ্ন। বমনকারক, বিরেচক ক্যাষ্টরঅয়েল, রগের উপর জলৌকা বসাইবে।

(১৩শ)

ডিজিটেলিস।

বিষঘ্ন। বমনকারক, বিরেচক ক্যাষ্টরঅয়েল, ট্যানিন ঘটিত টিং, ইনফিঃ, ডিঃওকবার্ক, ট্যানিক অ্যাসিড্ ও জল, ষ্ট্রং কফি, ব্রাণ্ডি।

(১৪শ)

সল্ফেট্ অব্ কপার।

বিষঘ্ন। উষ্ণজলপান দ্বারা বমন উত্তেজিত করিবে, বিষনাশার্থ ডিম্বের শ্বেতাংশ, দুগ্ধ, মিউসিলেজযুক্ত পানীয়।

১৫শ

ক্লোরোফর্ম্ম।

বিষঘ্ন। এমিল নাইট্রাস, অক্সিজেন, গ্যালবানিজম্, কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া, শীতল জলাভিঘাত।

[১৬শ]

মিনারেল অ্যাসিড্।

বিষঘ্ন। স্নিগ্ধপানীয় দ্বারা দ্রাবকের তেজহ্রাস। বিষনাশার্থ ক্ষার, যথা— ম্যাগ্নিসিয়া, খড়ি, চুণ, সোডা, অভাবে সাজিমাটী, নারিকেল বা কদলিপত্র ভস্ম, প্রদাহ নিবারণার্থ ওপিয়ম, উদর প্রদেশে পুলটিস বা জলৌকা, অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক।

[১৭শ]

হেম্প।

বিষঘ্ন। উষ্ণজল, ব্রাণ্ডি, লেবুররস ও ভিনিগার; অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক ও গ্রীবাদেশে ব্লিষ্টর।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

কোন্ কোন্ ঔষধে কত পরিমাণে প্রধান ঔষধ আছে। (Strength of the medicine.)

ঔষধ সকলের নাম	প্রধান দ্রব্য	প্রধান দ্রব্যের পরিমাণ,
টিংচর্ ওপিয়ম্	ওপিয়ম	১৪ $\frac{১}{২}$ মিঃ এক গ্রেন।
লিনিমেন্টম্ ওপিয়াই	ঐ	$\frac{১}{২}$ ড্রামে ১ এক গ্রেন।
ভাইনম্ ওপিয়াই	ঐ	২২ মিনিমে ১ গ্রেন।
এমপ্ল্যাষ্ট্রম্ ওপিয়াই	ঐ	১০ গ্রেনে ১ এক গ্রেন।
ডোভার্শ পাউডর্	ঐ	১০ গ্রেনে ১ এক গ্রেন।
পল্ভ্ কাইনো কম্পাউণ্ড	ঐ	২০ গ্রেনে ১ এক গ্রেন।
পল্ভ ক্রেটাএরোমেট কমওপিও	ঐ	৪০ গ্রেনে ১ এক গ্রেন।
টিংচর্ ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড	ঐ	৪ ড্রামে ১ এক গ্রেন।
কন্ফেকশিয়ো ওপিয়াই	ঐ	৪০ গ্রেনে ১ এক গ্রেন।
ট্রোচিসাই ওপিয়াই	ঐ	১০ চাক্তিতে ১ এক গ্রেন।
এনিমা ওপিয়াই	ঐ	১ এক আউন্সে এক গ্রেন।
এক্ষ্ট্রাক্টম্ ওপিয়াই লিকুইডম্	ঐ	২২ মিনিমে ১ এক গ্রেন।
পাইল্যুলা স্যাপনিস কম্পজিটা	ঐ	৬ গ্রেনে ১ এক গ্রেন।
পাইল্যুলা ইপিকাকুয়ানি কম্সিলা	ঐ	২৩ গ্রনে এক গ্রেন।

পলভ ওপিয়াই কম্পাউণ্ড	ওপিয়ম	১০ গ্রেনে এক গ্রেন।
একষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	ঐ	$\frac{১}{২}$ গ্রেনে ১ গ্রেনের সমান
লাইকর আর্সেনিকেলিস	আর্সেনিক	১ ড্রামে $\frac{১}{২}$ গ্রেন।
,, ষ্ট্রিকনিয়া	ষ্ট্রিকনিয়া	ঐ
,, মর্ফিয়া	মর্ফিয়া	ঐ
,, এট্রোপিয়া	এট্রোপিয়া	ঐ
ভাইনম ইপিকাকুয়ানা	ইপিক্যাক	২২ মিনিমে এক গ্রেন।
টিংচর বেলাডোনা	বেলাডোনা-পত্র	ঐ
লাইকর হাইড্রার্জ পর্ক্লোরাইড	রসকর্পূর	১ ড্রামে $\frac{১}{৮}$ গ্রেন।
টিংচর নক্সভমিকা	কুঁচিলা	২২ মিনিমে ২ গ্রেন।
ট্রোচিসাই মর্ফিয়া	মর্ফিয়া	১ চাক্তিতে $\frac{১}{৩৬}$ গ্রেন।
সপোজিটোরিয়া মর্ফি	ঐ	১ সপোজিটোরিতে $\frac{১}{২}$ গ্রেন
টিংচর একোনাইট	একোনাইট-মূল	১৮ মিনিমে ২ গ্রেন।
ভাইনম কলচিসাই	কলচিকম	১১ মিনিমে ২ গ্রেন।
টিংচর কোনায়ম	কোনায়ম	১৮ মিনিমে ২ গ্রেন।
টিংচর ক্যান্থারিডিস	ক্যান্থারিডিস	৪৪ মিনিমে $\frac{১}{২}$ গ্রেন।
ভাইনম এণ্টিমনি	টার্টার-এমেটিক	২ ড্রামে ॥০ গ্রেন।
হাইড্রার্জ কমক্রেটা	মার্কুরি	৩ গ্রেনে এক গ্রেন।
সিরপফেরি আইওডাইড	ফেরি	১ ড্রামে ৪$\frac{১}{২}$ গ্রেন।
টিংচ্যুরা কোয়াইনি	কুইনাইন	১ ড্রামে ১ এক গ্রেন।
ভাইনম কোয়াইনি	ঐ	১ আং ১ এক গ্রেন।
লাইকর বিসমথ	বিসমথ-অক্সাইড	১ এক ড্রামে ৩ গ্রেন।
ডনভন সোল্যুসন	আর্সেনিক	১ এক ড্রামে $\frac{১}{১২}$ গ্রেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিম্ন লিখিত ঔষধগুলি বিষ।

(Poison)

হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড, বেলাডোনা, আর্সেনিক, অ্যাকোনাইট, ষ্ট্রিকনিয়া, হাইওসিয়েমাই, মর্ফিয়া, ওলিয়ম ক্রোটনিস, টার্টার-এমেটিক, কার্ব্বলিক অ্যাসিড, আইডোফর্ম্ম, ক্যান্থারাইডিস, মর্কুরি, ষ্ট্রামোনিয়ম, আইওডিন, কার্ব্বনিক অ্যাসিড, ক্যালেবারবীন, কলচিকম, নক্সভমিকা, কোনায়ম, ইণ্ডিয়ানহেম্প, এট্রোপিয়া, ওপিয়ম, ক্রিয়োজোট, পডফাইলম, কুপ্রাই সলফাস, আর্জ্জেণ্টাই নাইট্রাস, প্লম্বাই অ্যাসিটাস, কষ্টিক পটাশ, কলোডিয়ম, ইলাটেরিয়ম, নার্কোটিনা, পটাশি আইওডাইডস, অ্যালকোহল, পটাশি পরম্যানগ্যানাস, অক্‌জ্যালিক অ্যাসিড, আর্গোটিনা, আর্ণিসি রেডিক্স, কলোসিন্থিডিস, পলপা, জিঙ্কম, ক্যাম্ফর, ডিজিটেলিস, ক্লোরেল হাইড্রাস, ক্রোটন ক্লোরেল হাইড্রাস, ক্লোরোফর্ম্ম, ফস্‌ফরিক অ্যাসিড, ফেরোসায়েনাইড অব পটাশ, বিটার আমণ্ডাস এবং নির্জ্জলাবস্থায় দ্রাবক সমূহ বিষ ক্রিয়া করে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[মাত্রানির্ণায়ক কোষ্টক।]

পূর্ণ বয়স্কদের জন্য—	৬০ গ্রেন বা মিনিম,		১ হইলে।
১৪ বৎসর বয়স্কের পক্ষে	৩০	বা	১/২
৭ ,, ,, ,,	২০	,,	১/৩
৫ ,, ,, ,,	১৫	,,	১/৪
৩ ,, ,, ,,	১০	,,	১/৬
১ ,, ,, ,,	৬	,,	১/১০
৬ মাস ,, ,,	৩	,,	১/২০
৩ ,, ,, ,,	২	,,	১/৩০

পশ্চাল্লিখিত কোষ্টক অনুসারে মাত্রার তারতম্য করিবে। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মাত্রা কিছু হ্রাস করা কর্ত্তব্য এবং ৬৫ বৎসরের পর অবধি ক্রমশ মাত্রা হ্রাস হইতে থাকিবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

(Prescription)

ব্যবস্থাপত্র।

পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে লিখিত হইল বয়ক্রম অনুসারে মাত্রার তারতম্য করিবে।

(Feaver mixture.)

[ফিবর মিক্শ্চর।]

R.

লাইকর্ এমোনিয়া এসিটেটিস	৬ ড্রাম।
স্পিরিট ইথর নাইট্রিক	২ ড্রাম।
পটাসি নাইট্রাস	১ ড্রাম।
,, সাইট্রাস	১ ড্রাম।
সিরপ অব্ লেমন	৬ ড্রাম।
একোয়া মেস্থপীপ	৪ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশির গায়ে ৬টি দাগ করিবে এক এক দাগ ২।২ ঘন্টা অন্তর জ্বরকালীন সেব্য।

[২য় প্রকার।]

R.

ম্যাগ্নিসিয়া সল্ফাস্	৬ ড্রাম।
নাইট্রিক ইথর	১।৹ ড্রাম।
পটাসি নাইট্রাস	১ ড্রাম।
লাইকর্ অ্যামোনিয়া এসিটেটিস	১ আউন্স।
ভাইনম্ এন্টিমোনিয়েলিস	১ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফর	৫ আউন্স।

একত্র মিশাইয়া শিশির গায়ে ৬ টি দাগ করিবে ১।১ দাগ ২।৩ ঘন্টান্তর জ্বর সত্ত্বে কোষ্ট বদ্ধ থাকিলে সেব্য যদি বমন থাকে তবে ভাইনম্ অ্যান্টিমোনিয়েল দিবেনা।

(৩য় প্রকার।)

R.

টিংচর ডিজিটেলিস ... ... ৩০ মিনিম।
ভাইনম ইপিকাকুয়ানা ... ... ৬০ মিনিম।
লাইকর অ্যামোনিয়া এসিটেটিস ... ... ১ আউন্স।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম ... ... ১ ড্রাম।
,, এমোনিয়া এরোমেটিক ... ... ১½ ড্রাম।
স্পিরিট ইথর নাইট্রিক ... . ১৷৹ ড্রাম।
একোয়া এনিসি ... ... ৫ আউন্স।

একত্রিত করিয়া ৬ টি দাগ করিবে ১।১ দাগ ২।৩ ঘণ্টান্তর জ্বর, কফ, কাশি এবং পার্শ্ববেদনায় ব্যবহার্য্য।

[৪র্থ প্রকার।]

R.

এসিড সাইট্রিক .. .. ১ ড্রাম।
লাইকর অ্যামোনিয়া এসিটেটিস .. ... ৬ ড্রাম।
পটাসি নাইট্রাস ... ... ১ ড্রাম।
,, সাইট্রাস .... ১ ড্রাম।
সিরপ অর‍্যানসাই .. .. ৬ ড্রাম।
একোয়া পিওর ... ... ৪ আউন্স।

একত্র করিয়া শিশির গায়ে ৬ টি দাগ কর।

সোডি বাইকার্ব্বনাস ... ...১৷৹ ড্রাম।

ইহাতে ৬ টি পুরিয়া তৈয়ার কর— ১।১ টি পুরিয়া ৪র্থ প্রকার মিকশ্চারের ১।১ দাগ লইয়া একত্র মিশ্রিত করিলে ফুটিয়া উঠিবার সময় ২।৩ ঘণ্টান্তর রোগীকে সেবন করাইবে। জ্বরকালীন পিপাসা ও বমন রোগে প্রয়োজ্য।

R.

(Quinine mixture.)

(কুইনাইন মিকশ্চর।)

কুইনাইন সল্ফ .... ১২ গ্রেন।
এসিড্ সলফিউরিক ডাইলিউট...... ... .. ২০ মিনিম।
টিংচর কার্ডেমম্ কম্পাউণ্ড ... ... ১ ড্রাম।
একোয়া পিওর ... ... ৩ আউন্স।

একত্র মিশাইয়া ৪ মাত্রা করিবে ১।১ মাত্রা জ্বর মগ্নকালে ১।২ ঘণ্টান্তর সেবন।

(Tonic—mixture.)
(টনিক মিক্‌শ্চর।)

R.

এসিড্ নাইট্রোমিউরিয়াটিক ডাইলিউট ... ... ১ ড্রাম।
কুইনাইন সল্‌ফাস্ ... ... ১২ গ্রেন।
ফেরিয়েট অ্যামোনিয়া সাইট্রাস ...... ১ ড্রাম।
টিংচর্ জিঞ্জিবারিস .... ৪ ড্রাম।
,, কলম্বা ... ... ৪ ড্রাম।
ইনফিউজম্ কোয়াসিয়া ... ... ৮ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া শিশিরগায়ে ১২টি দাগকর এক এক দাগ দৌর্ব্বল্য ও নিরক্তাবস্থায় প্রত্যহ তিনবার সেবন।

[দ্বিতীয় প্রকার।]

R.

এসিড্ নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক ডিল ... ... ২ ড্রাম।
টিংচর্ কলম্বা ... ... ৪ ড্রাম।
,, জেনসান কম্পাউণ্ড ... ... ৪ ড্রাম।
স্পিরিট ইথর ক্লোরিক ... ... ২ ড্রাম।
টিংচর নক্সভমিকা ... ...।০ ড্রাম।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট ট্যারেক সেকম্ ... ... ২ ড্রাম।
ফেরিয়েট কুইনাইন সাইট্রাস ... ... ১ ড্রাম।
ইনফিউজম্ ক্যালম্বী ... ... ৮ আউন্স।

একত্র করিয়া ১২টি দাগ কাট ১। ১ দাগ দৌর্ব্বল্য, নিরক্তাবস্থায়, অজীর্ণ এবং যকৃত রোগে প্রত্যহ তিনবার আহারের পর সেব্য।

(Spleen—mixture.)
(প্লীন মিক্‌শ্চর।)

R.

এসিড্ সলফিউরিক ডিল ... ... ২ ড্রাম।
কুইনাইন ডাইসাল্প ... ... ১২ গ্রেন।
ফেরি সলফাস্ ... ... ১২ গ্রেন।
ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌ফাস্ ... ... ১ আউন্স।

টিং কলম্বা ... ... ২ ড্রাম।
ইনফিউজম্‌ ক্যালম্বী .... ৮ আউন্স।
টিং জিঞ্জিবারিস .... ২ ড্রাম।
একত্র করিয়া ১২ দাগ করিবে ১। ১ দাগ পীড়া রোগে প্রয়োজ্য।
পেটেরপীড়া থাকিলে ম্যাগ্নিসিয়া সল্‌ফাস্‌ দিবেনা।

[Stimulant mixture.]
(ষ্টিমিউলাণ্ট মিক্‌শ্চর।)

R.

স্পিরিট অ্যামোনিয়া এরোমেটিক ... ... ২ ড্রাম।
" ইথর ক্লোরিক .... ২ ড্রাম।
টিং মস্ক ... ... ১ ড্রাম।
ভাইনম্‌ গ্যালিসাই .... ৬ ড্রাম।
টিংচর্‌ সিনকোনা কম্পাউণ্ড ... ... ২ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফর ... ... ৫ আউন্স।
একত্র করিয়া ৬টি দাগ কাট ১। ১ দাগ নাড়ি ত্যাগ, হিমাঙ্গ প্রভৃতি হইলে উত্তেজন জন্য অবস্থানুসারে $\frac{১}{২}$ বা এক ও দুই ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য্য।

(২য় প্রকার।)

R.

সলফিউরিক ইথর .... ২ ড্রাম।
ভাইনম্‌ গ্যালিসাই নং ১ .... ২ আউন্স।
স্পিরিট্‌ ক্লোরোফর্ম .... ২ ড্রাম।
" অ্যামোনিয়া আরোমেটিক ... ... ২ ড্রাম।
অয়াইল মেন্থপীপ ... ... ৮ মিনিম।
কর্পূরের জল ... ... ৬ আউন্স।
একত্র করিয়া ৮টি দাগকাট ১। ১ দাগ উত্তেজনার্থ ব্যবহার্য্য।

Cholera mixture.
[কলেরা মিক্‌শ্চর।]

R.

ক্লোরোডাইন .... ১ ড্রাম।
লাইকর বিসমথ এটএমন সাইট্রাস ... ... ১ ড্রাম।

সিরপ্‌ অব্‌ লেমন ... . ৪ ড্রাম।
একোয়া ক্যাম্ফর ... . ৩ আউন্স।
একত্র করিয়া ৪টি দাগ দাও ১।১ দাগ বিসূচিকা ও ডায়েরিয়া রোগে প্রয়োজন মতে ১।২।৩ ঘণ্টান্তর ব্যবহার্য্য।

[অন্য প্রকার।]

R.

এসিড্‌ অ্যাসিটিক ফর্ট ... ... ৩০ মিনিম।
প্লম্বাই অ্যাসিটাস ... ... ১২ গ্রেন।
টিং ওপিয়ম্‌ ... ... ১ ড্রাম।
অ্যাকোয়া মেস্থপীপ .... ৫ আউন্স।
একত্র মিশ্রিত কর। এবং শিশির গায়ে ৬টি দাগ দাও ১।১ দাগ বিসূচিকায় [বিশেষ কৃমিজনিত হইলে] ২।২ বার দাস্ত হইবার পর সেবন।

Gonorrhoea mixture.

(গনোরিয়া মিক্‌শ্চর।)

R.

অয়াইল কোপেবা .... ২ ড্রাম।
,, কিউবেব ... ... ৪০ মিনিম।
লাইকর্‌ পটাশি .... ৮০ মিনিম।
নাইট্রিক ইথর .... ২ ড্রাম।
টিং হাইওসায়েমস্‌ .... ৮০ মিনিম।
সুগর (চিনি) .... ৪ ড্রাম।
ইনফিউজন্‌ বকু ....৬ আউন্স।
একত্র মিশাইবে। এবং শিশিরগায়ে ৮টি দাগ কাট ১।১ দাগ প্রমেহ রোগে প্রত্যহ তিনবার সেবন।

Spleen powder.

(স্প্লীন পাউডর্‌।)

ফেরি সলফাস .... ১২ গ্রেন।
পল্‌ভ রিয়াই .... ২৪ গ্রেন।
,, কলম্বা .... ২৪ গ্রেন।
,, জিঞ্জিবারিস .... ২৪ গ্রেন।

পটাশি বাইট্রাস	......	......	২৪ গ্রেন।
কুইনাইন ডাইসল্‌ফাস	......	......	১২ গ্রেন।
পল্‌ভ জালাপ	....	....	২৪ গ্রেন।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টি পুরিয়া তৈয়ার কর, ১। ১ পুরিয়া প্লীহারোগে প্রত্যহ তিনবার সেবন ৷ পেটেরপীড়া থাকিলে জালাপ ও পটাশ বাইটার্ট দিবে না।

Fever powder.
(ফিবার পাউডর্।)

R.

পল্‌ভ এন্টিমোনি কম্পাউণ্ড	....	....	১২ গ্রেন।
পটাশি নাইট্রাস	....	....	৩০ গ্রেন।
পল্‌ভ ইপিক্যাক	......	......	৩ গ্রেন।
হাইড্রার্জ সব্‌ ক্লোরাইড্‌	......	......	৬ গ্রেন।
সোডি বাইকার্ব্বনাস	....	......	৩০ গ্রেন।
অয়াইল মেস্থপীপ	....	....	৬ মিনিম।

একত্র উত্তমরূপে মিশাইয়া ৬টি পুরিয়া তৈয়ার কর, ১। ১ পুরিয়া জ্বর সত্ত্বে কোষ্টবদ্ধ থাকিলে ২। ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন। রোগীর কোষ্ট পরিষ্কার থাকিলে হাইড্রার্জ সব্‌ ক্লোরাইড্‌ দিবেনা।

(২য় প্রকার।)

R.

জেমেস পাউডর্	... ...	... ...	১০ গ্রেন।
পটাশি ক্লোরাস	... ...	... ...	২০ গ্রেন।
সোডি বাইকার্ব্ব	... ...	...	৪০ গ্রেন।
পল্‌ভ জিঞ্জার্	....	....	৪ গ্রেন।
,, রিয়াই	......	....	২০ গ্রেন।

একত্রে ৪ পুরিয়া ১। ১ পুরিয়া জ্বরসত্ত্বে কোষ্টবদ্ধে ২। ৩ ঘণ্টান্তর প্রয়োজ্য।

(Dysentry—Powder.)
(ডিসেণ্ট্রী পাউডর্।)

R.

পল্‌ভ ক্রেটা এরোমেট কম্‌ওপিও	...	......	১ ড্রাম।

বিসমথ সব্ নাইট্রাস	....	৩০ গ্রেন।
এসিড্ গ্যালিক	... ...	২৪ গ্রেন।
পল্ভ ইপিক্যাক	....	১২ গ্রেন।

একত্রে ৬ টি পুরিয়া তৈয়ার কর ১। ১ পুরিয়া উদরাময় এবং অতিসার রোগে প্রয়োজনমতে ৩। ৪ ঘন্টান্তর সেবন।

[Cathartic—Pill.]

(ক্যাথার্টিক পীল।)

R.

ব্লু পীল	....	৫ গ্রেন।
এক্ট্রাক্ট কলসিন্থেস্থ কম্পাউণ্ড	....	৫ গ্রেন।

একত্রে ২টি বটিকা প্রস্তুত করিবে বিরেচন জন্য ১। ১টি রাত্রে শয়ন কালে সেবন।

(Cough—Pill.)

(কফনিঃসারক বটীকা।)

R.

এন্টিমোনি পটাসিও টার্ট্রাস	....	১ গ্রেন।
পল্ভ সিলি	....	১২ গ্রেন।
,, ইপিক্যাক	....	১২ গ্রেন।
ক্যাম্ফর	....	১২ গ্রেন।
এক্ট্রাক্ট হাইওসিয়েমাই	....	২৪ গ্রেন।

একত্র করিয়া ১২টি বটিকা তৈয়ার কর ১। ১বটিকা ৩। ৪ ঘণ্টান্তর সেবন। যদি বমন থাকে তবে ইপিকাকুয়ানা কম মাত্রায় দিবে।

(Calomel and opium Pill.)

(ক্যালোমেল এণ্ড ওপিয়ম পীল।)

R.

ক্যালোমেল	....	১২ গ্রেন।
ওপিয়ম	... ...	২ গ্রেন।
ক্যাম্ফর	... ...	৮ গ্রেন।

একত্রে ৪ বটিকা ১। ১ বটিকা পেরিটোনাইটিস, কলেরা, এবং কলিক-পেন প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য।

(Stimulant and antispasmodics Pill.)

(উত্তেজক ও আক্ষেপ নিবারক বটীকা।)

R.

এক্ট্রাক্ট বেলাডোনা	... ...	৫ গ্রেন।

জিনসাই সলফেটিস	... ...	৩০ গ্রেন।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌সান	... ...	৯০ গ্রেন।

একত্রে ২০টি বটিকা প্রস্তুত কর ১। ১ বটিকা দিবসে তিনবার, মৃগী হাঁপানিকাশি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

(Tonic and antiperiodic Pill.)

[বলকারক ও পর্য্যায়নিবারক বটীকা।]

R.

কুইনাইন সলফাস্‌	... ...	১৮ গ্রেন।
এক্‌ষ্ট্রাক্ট নক্সভমিকা	... .	৩ গ্রেন।
,, জেনসান	... ...	৩৬ গ্রেন।

একত্র করিয়া ১২টি বটিকা তৈয়ার কর ১। ১ বটিকা প্রত্যহ দুইবার জ্বর ও দুর্ব্বলতায় কোষ্টবদ্ধ থাকিলে ব্যবহার্য্য।

(Astringent—Lotion.)

(সঙ্কোচক ধৌত।)

R.

সুগর্‌ অব্‌ লেড্‌	... ...	২৪ গ্রেন।
সলফেট্‌ অব্‌ জিঙ্ক	... ...	২৪ গ্রেন।
একোয়া পিওর	... ...	১২ আউন্স।

একত্র মিশাইবে এবং শ্বেতপ্রদর ও প্রমেহ রোগে দিবসে ৩। ৪ বার মূত্রপথে পীচ্‌কারি লইবে।

Purgative—anema.

(বিরেচক পীচ্‌কারি।)

R.

ক্যাষ্টর অয়াইল	... ...	১। ২ আউন্স।
গরম জল	... ...	১ পাইন্ট।

কোষ্ট পরিষ্কার জন্য গুহ্যপথে পীচ্‌কারি ব্যবহার্য্য

(Cough—mixture.)

(কফনিঃসারক মিশ্র।)

R.

এমোনি কার্ব্বনাস	....	৩০ গ্রেন।
স্পিরিট ইথারিস	... ...	২ ড্রাম।
টিংসিজি	....	১।০ ড্রাম।

টিং ক্যাম্ফর কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম।
টিং ল্যাভেণ্ডার	২ ড্রাম।
ইনফিউজম্ সেনিগি	৫ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিবে এবং শিশিতে ৬টি দাগ কাটিবে ১। ১ দাগ ২। ৩ ঘণ্টান্তর বিবিধ কাশ রোগে ব্যবহার্য্য।

(Alteratives—mixture.)

[পরিবর্ত্তক মিশ্র।]

R.

পটাসি আইওডাইড	১৮ গ্রেন।
লাইকর্ পটাসি	২ ড্রাম।
ভাইনম কল্‌চিসাই	২ ড্রাম।
ইনফিউজম্ হেমীডেসমস্	৬ আউন্স।

একত্রে ৬টি দাগকর ১। ১ দাগ বাতরোগে প্রত্যহ তিনবার সেবন।

(Chloral—mixture)

[নিদ্রাকারক মিশ্র।]

R.

ক্লোরেল হাইড্রেট	৩০ গ্রেন।
সিরপ্‌রোজ	৪ ড্রাম।
অ্যাকোয়া	২ আউন্স।

একত্রিত করিয়া ২টি দাগ কাটিবে ১। ১ দাগ ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর বিবিধ আক্ষেপ ও বেদনাজনক রোগে প্রযোজ্য।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

পীড়া সমূহের ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা নাম।

অ্যাবর্সন,	Abrtion,	গর্ভস্রাব।
অ্যাবশেষ	Abscess,	স্ফোটক।

অ্যাজমা	Asthma,	শ্বাসকাশ, হাঁপানি।
অ্যাসিডিটি,	Acidity,	অম্ল রোগ।
অ্যাগিউ,	Ague,	কম্প-জ্বর
অ্যাপথি,	Aphthee,	মুখ মধ্যস্থ ক্ষত বিশেষ।
অ্যাপোপ্লেক্সি,	Apoplexy,	সংন্যাস রোগ।
বিউবো,	Bubo,	বাঘি।
ব্রঙ্কাইটীস,	Bronchitis,	বায়ুনলীভুজ প্রদাহ।
ব্রঙ্কোসিল,	Bronchocele,	গলগণ্ড।
বেডস্বোর,	Bed sore.	শয্যা ক্ষত।
বল্ডনেস.	Baldness,	টাক রোগ।
ক্যান্সর,	Cancer,	কর্কটীকা।
কলেরা;	Cholera,	বিসুচিকা।
কন্টিনিউড ফিবার,	Continued fever,	এক জ্বর।
চিকেন পক্স,	Chicken pox,	পান্ বসন্ত।
কন্ভল্সন্,	Convulsion.	খেঁচনি, আক্ষেপ।
কোরিয়া,	Chorea,	কাঁপনিরোগ, তাণ্ডব।
ক্যাটর্,	Catarrh,	সর্দ্দি।
কলিক,	Colic,	উদর শুল।
কনষ্টিপেশন,	Constipation,	কোষ্ট বদ্ধ।
কাইলস ইউরণ	Chyles urine,	দুগ্ধবৎ মুত্র।
কার্ব্বঙ্কল,	Carbuncle,	পৃষ্ঠ ব্রোণ।
ক্যাটারাক্ট,	Cataract,	ছানি।
ডায়েবিটীস,	Diabetis,	বহুমুত্র।
ডায়েরিয়া	Diarrhoea,	উদরাময়।
ডেবিলিটি,	Debility,	দুর্ব্বলতা
ড্রপসী,	Dropsy;	উদরি, শোথ।
ডিসেণ্ট্রি,	Dysentry,	গ্রহিণী।
ডিস্পেপশিয়া,	Dyspepsia,	অজীর্ণ।
একজিমা,	Eczema,	পামা।
এপিলেপ্সী	Epilepsy,	মৃগী।
ফেণ্টিং	Fainting,	মূর্চ্ছ
গনোরিয়া	Gonorrhoea,	প্রমেহ।
গলষ্টোন,	Gallstone,	পিত্তশিলা।

গ্যাংগ্রিণ,	Gangrene.	পচাক্ষত।
গ্যাষ্ট্রাইটীস,	Gastritis,	তরুণ পাকাশয় প্রদাহ
গাউট,	Gout,	গেঁটে বাত।
হেমরেজ,	Hoemorrhage;	রক্তস্রাব।
হুপীংকফ,	Hooping cough.	হুপ শব্দক কাশি।
হেডাক,	Head ache,	শিরঃপীড়া।
হিষ্টিরিয়া,	Hysteria.	গুল্মবায়ু রোগ।
হিমপটীসিস,	Hoemoptysis.	রক্তোৎকাশ।
হিমাটীমিসিস,	Hoematemesis.	রক্তবমন।
হিমরয়েডস,	Haemarrhoids.	অর্শ।
হিমাচিউরিয়া,	Haematuria,	রক্ত প্রস্রাব।
হেমিপ্লেজিয়া	Hemiplegia.	অৰ্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত।
হার্ণিয়া,	Hernia.	অন্ত্র বৃদ্ধি।
হাইড্রোসীল.	Hydrocile	জল দোষের পীড়া।
হিকফ	Hiccough,	হিক্কা
হেকটীক ফিবার,	Hectic fever,	পূয়যুক্ত জ্বর
হাইড্রোফোবিয়া.	Hydrophobia.	জলাতঙ্ক।
ইনফ্লামেসন,	Inflammation,	প্রদাহ।
ইম্পোটেন্স,	Impotence,	ধ্বজভঙ্গ।
ইম্পেটাইগো,	Impetigo;	চৰ্ম্ম চল।
জনডিস,	Jaundice	কামল, ন্যাবা।
লেপ্রসী,	Leprosy.	মহাকুষ্ঠ।
লুকোরিয়া,	Leucorrhea.	শ্বেতপ্রদর।
লিভার,	Liver,	যকৃত।
মেনরোজিয়া,	Mennorrhogia,	রক্তপ্রদর।
মিজলস,	Measles,	হাম।
মাইয়্যালজিয়া,	Myalgia,	পেশিশূল।
মেনিয়া,	Mania,	উন্মাদ।
নিউর‍্যালজিয়া,	Neuralgia,	স্নায়ুশূল।
নেফ্রাইটিস,	Nephritis,	মূত্র গ্রন্থি প্রদাহ

ওটাালজিয়া,	Otalgia,	কর্ণশূল।
অপথ্যালমিয়া,	Opthalmia,	চক্ষুপ্রদাহ।
অর্কাইটিশ,	Orchaitis,	অণ্ডপ্রদাহ, এক শিরা
প্লেগ,	Plague,	মড়ক।
প্যারালিসিস,	Paralysis,	পক্ষাঘাত।
নিউমোনিয়া,	Pneumonia,	ফুসফুস প্রদাহ।
থাইসিস,	Phthisis,	যক্ষ্মা, ক্ষয়কাশ।
পাইরোসিস,	Pyrosis,	মুখদিয়া জল উঠা।
প্লুরিসিস,	Pluritis,	ফুসফুসাবরক ঝিল্লি প্রদাহ
পিউর্পিরাল ফিভার,	Puerparal feaver,	সুতিকা জ্বর।
পিরিটোনাইটিস,	Peritonitis,	অন্ত্রাবরণ প্রদাহ।
রিউমেটিজম,	Rheumatism,	বাত।
রিল্যাপসিং ফিবার,	Relapsing fever,	পৌনঃপুনিক জ্বর
রেমিটেন্ট ফিবার,	Remittent fever,	সল্পবিরাম জ্বর।
স্ক্রফিউলা,	Scrofula,	গণ্ডমালা।
স্মলপক্স,	Smallpox,	বসন্ত।
স্কার্লেট ফিবার,	Scarlet fever,	আরক্ত জ্বর।
সিফিলিস,	Syphilis,	উপদংশ।
স্কেবীজ,	Scabies,	পাঁচড়া।
স্প্লীন,	Spleen,	প্লীহা।
সাইনস,	Sinus,	নালী।
টাইফস ফিবার,	Typhus fever,	সন্নিপাত জ্বর।
টেটেনস,	Tetanus,	ধনুষ্টঙ্কার।
টুথ্যাক,	Tooth ache,	দন্তশূল।
অলসার,	Ulcer,	ক্ষতবিশেষ
আর্টিকেরিয়া,	Urticaria,	আম্বাত।
ভার্টিগো,	Vertigo,	শিরঘূর্ণন।
ভমিটিং,	Vomitting,	বমন।
ওয়ার্টস,	Warts,	আঁচিল।
ইয়েলোফিবার,	Yellow fever,	পীতজ্বর।

সম্পূর্ণ।

INDEX.

(সুচিপত্র) পৃষ্ঠা।

অশুদ্ধ সংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা।	লাইন।
পরিষ্ক্‌প্ত	পরিষ্কৃত	৩।	৬
১২ আউন্স অথবা ৫৭৬০ গ্রেন।	১৬ আউন্স অথবা ৭০০০ গ্রেন।	৩।	২০
হৃত্তবর্দ্ধন	হৃদবর্দ্ধন	১৩।	১
পম্বাই কার্বনাস ...	প্লম্বাই কার্ব্বনাশ	১৩।	২৫
চক্ষ	চর্ম্ম	১৪।	৫
৬০ মিনিম ...	৪০ মিনিম ...	৩৭।	১২
শ্বাসকৃচ্ছ্‌ ...	শ্বাসকৃচ্ছ ...	৫৫।	১৯
কিস্তু	কিন্তু	৬২।	২০
কুষ্ট	কুষ্ঠ	৭৬।	১৮
পরির্ত্তক	পরিবর্ত্তক ...	৮১।	১৭
কুষ্ট	কুষ্ঠ	৮১	২২
ঐ	ঐ	৮৩।	৭
চণেরজল ...	চূণেরজল ...	১৩৬।	১২
এতদ্ভিম্ন ...	এতদ্ভিন্ন ...	৬৯।	১০
টাগেকাস্থা ...	ট্রাগেকান্থা ...	১০৮।	১৪
বার্বনেট অব এমোনিয়া	কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	১৩৬।	২৬
মূচ্ছ্‌	মূর্চ্ছা	১৬০।	৩১